

醫
通
卷九

張氏醫通卷之九

長洲石頑張

璐路玉父纂述

男

登誕先
仲飛疇
叅訂

瘡瘍

癰疽

癰疽一科自有專擅其術者以是手輯醫通獨畧此門然有兼患內證瘍醫不能措指者因取靈素金匱明之新甫等數條列之本門諸凡治例未遑遍述庶免瘡環同類之誚云

靈樞云大血脈營衛周流不休上應星宿下應經數

寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛
氣歸之不得復反故癰腫寒氣化爲熱熱勝則肉腐
肉腐則爲膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓
消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相
榮經脈敗漏熏於五藏藏傷則死矣癰發於喉中名
曰猛疽猛疽不治化爲膿膿不瀉寒咽半日死其化
爲膿者瀉則合豕膏冷食三日而已發於頸名曰天
疽其癰大以赤黑不急治則熱氣下入淵液前傷任
脈內熏肝肺十餘日而死矣陽留大發消腦留項名
曰腦爛其色不樂項痛如刺以鍼煩心者死發於房
及牖名曰疵癰其狀赤黑急治之此令人汗出至足

不害五藏癰發四五曰逆焮之發於液下亦堅者名
曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之塗以豕膏六
日已勿裹之其癰堅而不潰者爲馬刀挾癰急治之
發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下
八腹不治七日死發於膺名曰肝疽色青其狀如穀
實詠敦常苦寒熱急治之去其寒熱半歲死死後出
膿發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀
大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆劉蔞薤草
根各一升各一升也以水一斗六升煮之竭爲取
三升則強厚衣坐於盆上令汗出至足已發於股脛
名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿傳骨不急治三十

日死發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死發於股陰名曰赤疽不急治六十日死在兩股內不治十日當死發於膝名曰疵癰其狀大癰色不變寒熱如堅石勿石之者死須其柔乃石之者生諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰者三十日死發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急治之不治害人也發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變數石其輸而止其寒熱不死發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治百日死發於足傍者名曰厲癰其狀不大初如小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死發於足指名脫癰脫一名其

狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則死矣
營氣稽留於經脈之中則血泣而不行不行則衛氣
從之而不通壅遏而不得行發熱大熱不止熱勝則
肉腐肉腐則爲腫然不能陷骨髓不爲焦枯五藏不
爲傷故命曰癰熱氣深甚下陷肌膚筋骨枯內連五
藏血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽
者上之皮夭以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以
澤此其候也口病有形而不痛者陽之類也無形而
痛者陰之類也無形而痛者其陽完而陰傷之也急
治其陰無攻其陽有形而不痛者其陰完而陽傷之
也急治其陽無攻其陰陰陽俱動乍有形乍無形如

以心煩命曰陰勝其陽此爲不表不裏其形不久○
身有五部伏兔一腓一腓者膈也背三五藏之俞四
項五此五部有癰疽者死○喜怒不測飲食不節陰
氣不足陽氣有餘營氣不行乃發爲癰陰陽不相通
兩熱相持乃化爲膿○其白眼青黑眼小是一逆也
內藥而嘔是二逆也腹痛渴甚是三逆也肩項中不
便是四逆也青嘶色脫是五逆也除此五者爲順矣
素問曰高粱之變足生大丁受如持虛○汗出見溼
乃生痲痺○營氣不從逆於肉理乃生癰腫○氣傷
病形傷腫先痛而後腫者氣傷形也先腫而後痛者
形傷氣也

金匱云諸浮數脈應當發熱而反洒淅惡寒若有痲
虛當發其癰師曰諸癰腫欲知有膿無膿以手掩腫
上熱者爲有膿不熱者爲無膿

發熱而脈見浮數證脈相應也脈見浮數而反洒
淅惡寒是火鬱不得發越若有痛處而飲食如常
必發癰腫之候腫熱未甚尤可消散腫熱已劇癰
膿已成後世用溼紙貼腫上候其癰腫之頭亦不
出乎此意

浸淫瘡從口流向四支者可治從四支流來人口者
不可治

浸淫瘡黃連粉主之

方缺

病機機要云癰癰者結核是也或任耳後或在耳前
或在耳下連及頤頤或在頸下連缺盆皆謂癰癰或
在胸之側或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之此
本膏粱丹毒火熱之變因虛勞氣鬱所致止宜補形
氣調經脈其瘡當自消蓋不待汗之下之而已也其
不詳脈證經絡受病之異者下之先犯病禁經禁故
致失手且有兼痰兼氣兼血兼陰虛等證者病本不
同治當求責口瘡瘍者火之屬須分內外以治其本
內之外者其脈沉實發熱煩躁外無焮赤痛深於肉
其邪氣深矣故疏通臟腑以絕其源外之內者其脈
數焮腫在外形證外顯恐氣極而犯內故先托裏也

內外之中者外無熇惡之氣內亦藏府宜通如其在
經當和營衛也用此三法之後雖未愈心無變證亦
可使邪氣峻減而易愈

外科精要云熱發於皮膚之間浮腫根小至大不過
二三寸者爲瘡六府積熱騰出於肌肉之間其發暴
盛腫皮肉光軟板脚廣大爲癰五藏風毒積熱攻煩
肉骨風毒猛暴初生一如倍蜚形自焦枯觸之應者
乃疽也夫五善七惡者動息自寧飲食知味一善也
便利調勻二善也膿稠腫消不臭一善也神采精明
語声清爽四善也體氣平和五善也煩躁時嗽腹痛
渴甚或泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄腫煩

元甚膿色敗臭痛不可近者二惡也喘粗短氣恍惚
嗜臥三惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤腫子上
視者四惡也肩皆不便四肢沉重五惡也飲食不下
服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗唇鼻青面目
四肢浮腫七惡也五善見三則瘥七惡見四則危然
則病有源同七惡者乃皮緊急而知善也病有源同
五善者乃皮緩虛而知惡也是豈凡醫所知哉
凡人初見發背欲結未結赤熱腫痛先以溼紙覆其
上立視候之其紙先乾處卽是結癰頭也取大蒜切
成片如三錢厚薄安於頭上用大艾炷灸之三炷卽
換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方佳最

要早覺早灸爲上一日二日十灸十活三日四日六
七活五六日三四活過七日則不可灸矣若有十數
頭作一處生者卽用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚
艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上初發赤腫一片
中間有一片黃粟米頭子使用獨蒜切去兩頭取中
間切三錢厚正安瘡上著艾灸十四壯多至四十九
壯此謂癰疽初發宜灸之也然諸瘡患久成漏者常
有膿水不絕其膿不臭肉無生肉尤宜用附子浸透
切作大片厚三二分於瘡著艾灸之仍服內托之藥
隔二三日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有
膿水惡物漸漬根深者郭氏用白麩硫黃大蒜三物

一處撫爛看瘡大小捻作餅子厚約三分安瘡上用
艾灸二十一壯一灸一易灸後四五日方用挺子維
入瘡內反肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服
應病之劑調理卽瘥矣蓋不止宜灸於瘡之始發也
惟發於頭腦者皆不可灸頭爲諸陽之會灸之反助
其火毒耳

腫瘍口辟立齋曰腫瘍者以瘡瘍未潰而言也經云
形傷則氣傷腫又云營氣不從逆於肉裏乃生癰腫
皆因營氣厚味七情陰火或炙燥甘美積毒氣血不
和所致當分其經絡所屬五臟相勝興元稟虧損預
爲審用攻補調和之劑

漫色之赤白與痛有微甚毒有表裏若腫高燉痛便利調和邪在表也宜表散之腫硬痛深大便秘濇邪在內也宜下之外無拘急內則便利調和者邪在經絡也宜調營衛腫欬大痛或麻木不痛邪氣凝滯也外用隔蒜灸內服活命飲或歸薈飲尤効無問何部分但赤腫者必消若煩躁飲冷赤痛發熱二便不通者火熱內熾也用四味清涼飲或活命飲加大黃尤善若微腫微痛或不痛陽氣虛弱也參薈內托散微黯微赤或不赤或惡寒而不作膿或膿熟而不潰者陽氣虛寒也並用千金托裏散如此則未成者自能消已成者自能潰尤當別其屬陰屬陽或半陰半陽

而治之若泥於腫瘍禁用辛熱之說不分受證之因
兼證之經槩行敗毒泛擾諸經誅伐無過以致不能
起發或不能潰腐收斂變證莫能枚舉癰疽論云腫
瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主但見腫痛於之脈
證虛弱便與兼補氣血無虧可保終吉若腫瘍之際
治失其法必致潰瘍之變證此推內經之微旨而生
平之微驗者尤當觸類而長思奚庸贅

潰瘍○潰瘍者以瘡瘍膿潰而言也膿潰而腫消痛
止者爲順若膿潰腫痛或發寒熱者氣血虛也十全
大補湯膿潰欲嘔少食脾胃虛弱也六君子加炮薑
于足並冷者脾氣虛寒也六君子加薑桂不應急加

附子膿潰而仍痛或二便秘清者熱毒未解也清熱
消毒湯熱退而渴不退津液不足也八珍加黃耆麥
冬山茱萸熱止而小便頻數腎虛也加減八味丸料
若熱不止或腫痛反甚虛熱內作也保元湯加清心
涼血之劑或熱退而肌肉不生者氣血俱虛也十全
大補湯瘡色天白或陷下不斂寒氣所襲也五味異
功散佐以豆豉餅膿血過多煩躁不安乃亡陽也急
用獨參湯尤當審其腫之軟硬飲食冷熱與膿之稠
稀多少肉之赤色青黯及瘡口之收斂遲速而投托
裏消毒諸補之劑庶無變證癰疽論云潰瘍內外皆
虛宜以托裏補接爲主蓋潰瘍之變證由於腫瘍之

際治失其宜虧損元氣所治者可不慎歟

作痛不止○瘡瘍作痛當審邪之所在證之所因如

寒熱而痛邪在表也人參敗毒散便秘而痛邪在裏

也清熱消毒湯加白蜜腫炊而痛血凝滯也活命飲

作膿而痛者托裏消毒散排膿脹而痛者鍼之膿潰

而痛者補之氣虛而痛四君子加歸蓍血虛而痛四

物湯加參耆大抵形傷痛氣傷腫不知此數者徒以

乳香沒藥爲止痛之方則非所以爲法矣仍審五藏

相勝相兼之證而治之後倣此

作嘔不止○丹溪云腫瘍時嘔當作毒氣攻心治之

瘡瘍時嘔當作陰虛補之此論其常耳如腫赤欲痛