

傷寒論類方

六經脈證

傷寒附法

韓園醫學六種
卷四

六經脈證

欲讀傷寒論。必先識六經之本證。然後
論中所稱太陽陽明等病。其源流變態。
形色脈象。當一一備記。了然於心。然後
其症之分併疑似。及用藥加減異同之
故。可以曉然。不致眩惑貽誤。故備錄於

左。

太陽病。脈浮。頭項強痛。而惡寒。

尺寸俱浮者。太陽受病也。其脈上連風府。故頭項痛。腰脊強。

發熱汗出。惡風。脈緩者。名曰中風。

惡寒。體痛。嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷

寒。

發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發

於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六

日愈。以陽數七。陰數六也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡

寒。脈浮而緊。

惡寒未離太陽也。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。
尺寸俱長者。陽明受病也。其脈俠鼻絡。
於目。故身熱。目疼。鼻乾。不得臥。

陽明外證。身熱。汗自出。不惡寒。反惡熱。
也。

陽明脈大。

以上皆陽
明之經病

有○太○陽○陽○明○有○正○陽○陽○明○有○少○陽○陽○明○

太○陽○陽○明○者○脾○約○是○也○

少○陽○陽○明○者○發○汗○利○小○便○已○胃○中○燥○煩○

實○大○便○難○是○也○

陽○明○之○爲○病○胃○家○實○也○

此乃正陽陽明

陽○明○居○中○土○也○萬○物○所○歸○無○所○復○傳○始○

雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。

少陽之爲病。口苦。舌乾。目眩也。

尺寸俱弦者。少陽受病也。其脈循脇絡於耳。故胸脇痛而耳聾。

少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胸中滿而

煩者。不可吐下。吐下則悸而驚。

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽。

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目

合則汗內熱已極

傷寒六七日無大熱外熱輕則其人煩

躁者此為陽去入陰也

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人

反能食而不嘔。此爲三陰不受邪也。

太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。

尺寸俱沈細者。太陰受病也。其脈布胃中。絡於噎。故腹滿而噎乾。

傷寒脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。

自利不渴者屬太陰。以藏有寒故也。當

溫之。宜服四逆輩。

少陰自利而渴寒在下焦也。此自利不渴。

寒在中

焦也。

少陰之為病脈微細但欲寐也。

衛氣行於陽則

寤行於

陰則寐。

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日。

自利而渴者屬少陰。

尺寸俱沈者少陰受病也。以其脈貫腎絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。

厥陰之爲病。消渴氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐衄。下利不止。

尺寸俱微緩者厥陰受病也。以其脈循

陰器絡於肝故煩滿而囊縮

厥陰中風脈微浮爲欲愈不浮爲未愈

別症變症

附刺法

傷寒本症之外有別症有變症別症者

其病與傷寒相類而實非傷寒是也變

症者傷寒本不當有此症或因遷延時

日或因雜藥誤投其病變態百出是也
其症不備則必驚疑淆惑而無所措手
故備錄之庶不致臨症徬徨

藏結 冷結 除中 伏氣

晚發 痙 溼 風溼

溼温 温毒 暍 陰毒

陽毒

温病

熱病

兩感

風温

温疫

脚氣

多眠

狐惑

百合

藏厥

見烏梅丸條

尸厥

見刺法

藏結

藏結如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸

脈浮關脈小細沈緊。名曰藏結。舌上白胎滑者難治。

藏結無陽症。其人反靜。舌上胎滑者不

可攻也。

病脇下有痞。連在臍旁。痛引少腹。入陰

經者。此名藏結死。

藏結與胸結皆下後邪氣乘虛入裏所致。熱多與陽明相結爲結胸。寒多與陰相結爲藏結。故所現脈症皆爲陰象。舌上胎滑則上焦亦寒。全無陽象。故曰難治。曰不可攻。然猶有治法。至素有痞疾。則中氣已傷。連及臍旁。少腹并入陰經。則上下俱病。陰極陽竭。不死何待。

冷結

病者手足厥冷。言我不結胸。小腹滿。按

之痛者此冷結在膀胱關元也

除中

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其

熱脈遲爲寒今與黃芩湯復除其熱腹

中應冷當不能食今反能食此名除中

必死