

精校外科大成

出版

上海錦章書局

太醫院祁廣生輯註

外科大成

上海錦章書局出版

新秤藥量表

本書所載用藥量均爲老秤。現在藥店均用新秤，但以市新秤合老秤一兩，應升爲一兩一錢七分。三厘。因老秤八錢五分二厘半即市秤一兩。恐閱者誤會，故將新老比較表附列如下：

老秤	新秤
五 分	合五分八厘強可用六分
一 錢	合一錢一分七厘強可用一錢二分
一錢五分	合一錢七分五厘強可用一錢八分
二 錢	合二錢三分四厘強可用二錢四分
二錢五分	合二錢九分三厘強可用三錢
三 錢	合三錢五分一厘強可用三錢五分
四 錢	合四錢六分九厘強可用四錢七分
五 錢	合五錢八分六厘強可用六錢
六 錢	合七錢零三厘強可用七錢
七 錢	合八錢二分強可用八錢二分
八 錢	合九錢三分八厘強可用九錢五分
九 錢	合一兩零五分五厘強可用一兩零五分
一 兩	合一兩一錢七分三厘可用一兩二錢
一兩以上	照前類推

外科大成目錄

卷之一

總論部

癰疽原委症治脈法經絡總不外乎此

癰疽之脈

癰疽之原

癰疽之別

癰疽陽症歌

癰疽陰症歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善歌

癰疽七惡歌

癰疽生死元法

察形色順逆法

內消內托法

虛實症治法

經絡大略

補鴻華品

砭法

炙法

取穴炙法

烙法

桑柴烘法

神燈照法

牛膠蒸法

蠟筒拔法

症治次第

虛實治法

順逆看法

標本治法

論汗

論下

論嘔

論寒熱

論飲食

論藥

論瘡

論舌

膿瘍治法

膿瘍附餘類方

膿瘍散治類方

膿瘍洗滌類方

膿瘍膏藥類方

臉膜

陰症變陽

陽症變陰

膿瘍主治方

膿瘍主治方

腫瘍附餘類方

生肌類方

清瘍外治附餘

家傳西聖膏方

調理須知

去腐類方

雜忌須知

試百病生死法

卷之二

分治部

癰疽之原委症治首卷已詳今之分部位者蓋為別經絡認穴火定名色耳其症治不外乎首卷之提綱然間有稍異於總治者有耑治本症之方而即以此方各附於本症條下則閱卷了然庶無遺漏紊亂矣

頭部

經絡

百會疽

王頭發

透腦疽

額疽一名赤疽

太陽疽專疽

鬚疽

天疽

銳毒

交

正

卜

大

成

目

錄

耳後疽

耳根毒

耳發

玉枕疽

腦後發

腦鍊

面部其頭面小疵及眼耳鼻口
齒古咽喉等症另有分門

顴瘡

顴疽

顴疔

面發毒

面遊風

痄腮

煩瘡

瘧毒

骨槽風

發頤

時毒

鳳旨疽

龍泉疽

虎鬚毒

一發承榮疽

頸項部

腦疽俗名項中疽
一名對口

臥蚕疽

天柱疽

偏腦疽

魚尾疽

百脈疽

鎖喉疽

結喉疽

氣癰

夾喉瘡

疽共八條

瘻癰計二十名

石疽

尖榮症

背部

經絡

上發背壯癰牌

中發背一名對心發

蓮子發

蜂窩發附半身
肉癰

上搭手右串

中搭手

串疽

陰陽二炁疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰肉癰

夏月暑瘡

瘡疽

產後癰疽

痰注發

背部總論

經絡之所統

始末不應生死訣

腫消症治法

外治次第法

甘疽醫案

腰部

腎俞法

下搭手一名連臂發

濕流注

石疽附癰血

鰭腰火丹俗名蛇車瘡

胸部

缺盆疽

瘡疽

膿中疽

升疽

蜂窩疽

乳癰

胃疽

脾發

乳漏

乳結核

乳勞

乳岩

下乳回乳法

腹部

幽癰

肚癰
胃疽及手足

衝

臍癰

小腹疽

腹皮癰

發肚
足肚

緩疽

腹胸總論

附小兒臍症

腋部

經絡

腋癰
夾癰

米疽
附失瘻

點疔

腋氣

肋部

肋疽

腸疽
敗疽

淵疽

內發丹毒

下部後

額口疽

一
觀疽

坐馬癰

臂癰

上馬癰

下馬癰

附風癰

附瘡俗名坐

懸癰

湧泉疽

穿襦發

跨馬癰

膿毒

痔瘡
附越真子
扁科的本

漏瘡
附餘漏

截腸症

下部前

便癰

即便毒一名
破名魚口

橘疽

疳瘡
一名蛇精瘡

陰瘡

婦人陰瘡

陰挺

陰草

陰腫
一名肛人瘡
一各疽

陰蝕

陰脫

陰癰

瘻癰
附卵子
瘻暗疔

臂瘻風

臂瘻風瘡

肩部

經絡

肩疽

肩癰

過肩疽
一名乾疽
一名疔疽

太陰疽
後疽

蜂窩疽

肩疽

石榴疽

樂疽

大陰疽
一名肩疽

脛部

經絡

膿癰包
一名毒癰

膠疽

骨疽

疖

臂癰

魚肚發

石榴疽

肘癰

疖

臂部

腕癰

先疽

穿骨疽

骨蝶疽

疖

校正外科大成

二

臂癰

手部

經絡

合谷疔一名虎口疔了火
又名拍蟹毒

蛇眼疔

代指

蛇背疔

僵蠅蛭

蛇腹疔一名魚肚疔

股陰疽

陰疽

股陽疽

玄疽

附骨疽

狐理刺

鵝掌風

鵝頭疔一名蛇毒

調疽

泥鰌疽

鵝掌風

病蝦

手心毒一名掌毒

手發背

手心毒掌毒

手發背

手心毒掌毒

分治部

此係頭面小疵及眼耳口鼻喉舌等部位因其症治多歧不可紊亂於大毒之內故另立之以便檢閱

頭部

頭痛頭風

油風

白屑風

禿瘡

蝴蝶癩

一名歸根頭

髮際瘡

癰瘡

面部

黃水瘡

眉癥

肺風酒刺

黧黑斑

雀斑

黑子癩也

鼻鷄瘡

半鬚子瘡

眼胞內板瘡粟瘡

眼部

眼胞菌毒

眼丹

針眼

眼胞疾核

風火雲翳等眼目有專科姑不錄

脾齒瘡

漏睛

大小眼皆出膿出血

耳部

經絡

耳底瘡

黑疔

耳瘻

耳痔附耳挺耳草

耳鍼瘡又名鴟胎瘡

耳痒

耳聾

凍耳成瘡

耳癩

耳聾

蟲入耳

鼻部

經絡

鼻渊一名鵝頭脣漏
又名控脣砂

鼻瓶

鼻聾

酒敵臭

鼻痔

鼻瘻

鼻衄

脣部

經絡

反唇疔鎖口疔

脣疽

脣風

口部

經絡

口瘡

口瘻

舌部

紫舌脹

痰包

舌劙

重舌附瘻氣
舌疔

弄舌舒舌

牙齒部

經絡

牙癰附多骨

牙痛附風

牙齦

揩齒疳

咽喉部

走馬牙疳

牙疔

內癰

內癰總論附肚癰

陽疮毒

心滿

弄舌喉風

緊喉

慢喉

喉瘻附喉風喉瘻

啞瘻喉風

不部位

大毒

喉瘻

喉瘻

不分部位

者蓋為隨處可生不按穴次也故另分之

內癰

內癰總論附肚癰

陽疮毒

心滿

肺癰

肺癰

心癰

腎癰

胃癰

脾癰

疗瘻症治總訣

共計四十七名

多骨疽

一名刺骨疽

小腸癰

附馬瘻

瘻瘤

各有五附

結核

楊梅瘻

倒於梅毒

石癰石疽

癰發

瘰疽

附脫音体

卷之四

不分部位

小疵

無名腫毒

丹毒

赤白遊風

癰珍

諸痒

諸痛

大麻風

癰風

癰瘍風

白駿風

紫白癰風

諸瘻總論

翻花瘻

諸瘻

座瘻

佛瘻

瘻瘻

諸瘻

火赤瘻

寒瘻

魚脊瘻

骨瘻瘻

紅絲瘻

血瘻

跌撲損傷

金瘻

杖傷

夾傷

破傷風

類破傷風

發癰

湯火傷

凍瘡

小兒部

竹刀刺入肉

人咬傷

風火傷

蟲獸傷

骨哽喉針鍼及供吞

胎毒

熱毒瘡瘍

垂瘡附重齒古重脣

胎風

胎赤

胎瘤

脾瘡脾哭

陰腫一名脫食

脫肛

肚門作痒

遺毒

葡萄疫

痘風瘡

痘復使膿

煉取諸藥法

封罐口法

煉玄明粉法

取紅鉛法

煉金頂砒法

昇打靈藥固確法

取蟾酥法

取金汁法

製大附子法

製寒食麵法

製炒諸藥法

針灸人神歌訣

五戒

後跋

標正外科大成目錄終

外科大成目錄終

總論部

脈源

眞稽炎農御世而醫之名始立夫醫者濟世之統名也名雖一而寔有內外科之異也科之分有內外蓋因人之疾有內外故也因其疾以命醫神而明之則因內可以推外由外可以測內稍微之理豈易言哉胡為乎今之重於內者精其內而瘡科或有所遺耑於外者精其外而方脈或有未諳斯二者誠未合乎中庸之道不幾失先正之薪傳乎故惟仁者之心深長周密思欲兼之而無遺內遺外之憾者必先以脈為首務也靈樞經云見其色知其病命曰明按其脈知其病命曰神嗟嗟神其難言也夫誠以病在臟腑不能以告人而脈告之脈不能以接人而指接之則是脈也者乃天真委和之氣非圖可狀非言可傳維空人之會心而已獨不見王叔和之脈經乎王忠俊彼越肯乎譽賴湖之脈學戴同父之刊誤等書乎寓之於自悟之於心措之於指運之於意於是乎病之淺深不彰明較著也哉是以診脈之道不易精也因其不易精而竟忽之其誤天下也多矣爰採脈學歌訣辨脈之形象並透外科腫瘍脈法辨症之順逆顧之卷首聊補學者上達之功云爾

脈歌

浮浮如木在水中浮浮大中空乃是芤拍拍而浮是洪脈來時雖盛去悠悠 浮脈輕平似捻葱虛來遲大豁然空浮而柔細為濡

脈散似楊花無定踪 脰瘍為虛為風清瘍為虛宜補

沉沉幫筋骨自調匀伏則維筋着骨尋沉細如綿真弱脈弦長實大是牢形 脰瘍為邪氣深清瘍為遺毒在內

遲遲來一息至惟二陽不勝陰氣血寒但把浮沉分表裡消陰須益火之源 脉來三至號為遲小駛於遲作緩持遲細而難知是濇

浮而遲大以虛推 脰瘍為寒為虛清瘍亦為寒為虛

數數脈息間常六至陰微陽盛必狂煩浮沈表裡分虛實惟有兒童作吉看 數比平人多一至緊來如數是彈繩數而時止名為促

數見關中動脈形 數脈為陽熱可知只將君相火來醫寒宜涼瀉虛宜補肺病秋深却畏之 脰瘍為熱數而淡者欲膿清瘍為

病進數甚者難醫

滑滑脈如珠替替然往來流利却還前莫將滑數為同類數脈惟看至數間 脰瘍為熱為痰清瘍為熱為虛為邪氣未退

濬細進短濶往來難散止依稀應指間如雨沾沙容易散病參食葉慢而艱 參伍不調名曰濬輕刀刮竹短而難微似杪芒微要甚浮沉不別有無間 腫瘍為氣實氣滯滑瘍為血虛為脈病相應

虛舉之遲大按之髮脈狀無涯類谷空莫把孔虛為一例芤未浮大是憇忽 腫瘍宜內托滑瘍宜大補

實浮沉皆得大而長應指無虛愬愬強熱溫三焦成壯火通腸發汗始安康 實脈浮沉有力強緊來彈索轉無常須知牢脈帮筋骨

實大微弦更帶長 腫瘍為邪氣太盛滑瘍為邪氣不退

長過於本位脈名長弦則非然但滿張弦脈與長爭較遠良工尺度自能量 腫瘍為有餘宜內消滑瘍為氣治則易愈

短兩頭縮縮名為短濶短遲細且難短濶而浮春秋喜見三春為賊有邪干 腫瘍為元氣不足滑瘍為火虛宜大補

洪脈來洪盛去還衰滿指湧湧應夏時若在春秋冬月分升陽散火莫狐疑 洪脈來時拍拍然古文來盛似波瀾欲知實脈參差處

舉按弦長愬愬堅 腫瘍為熱盛宜宣熱拔毒壯實者下之滑瘍為邪感藥之不退者難愈

微微脈輕微晽晽平按之欲絕有如無微為陽弱細陰弱細比於微畧較肥 腫瘍為虛服藥漸充者佳滑瘍亦為虛若微而引者為

病脈相應

緊舉如轉索切如繩脈象因之得緊名總是寒邪來作寇內為腹痛外為疼 腫瘍脈浮緊發熱惡寒或有痛處是為癰疽滑瘍主氣

沉滯焉有外寒

緩緩脈阿附四至通柳梢裏颶輕風欲從脈裡求神氣只在從容和緩中 腫瘍為虛滑瘍為有胃氣為脈病相應

芤中空旁實乃為芤浮大而遲虛脈呼芤更帶弦名曰革血亡芤革血虛虛 腫瘍為血虛滑瘍為脈病相應

弦加數則危矣

革革脈形如按鼓皮芤弦相合脈寒虛女人半產並崩漏男子營虛或夢遺

牢牢長實大脈牢堅牢位常居沈伏間革脈芤弦自浮起革虛牢實要詳看 腫瘍為邪盛滑瘍為邪氣不退

濡弱來無力按之柔柔細而柔作弱持微則浮微如欲絕細來沈細近於微 故以楊花散慢飛去來無定至難齊產為生兆胎為墮久病逢之不必醫

散脈無拘散漫然濡米浮細水申綿浮而遲大為虛脈

芤芤脈中空有兩邊 腫瘍為氣虛不收滑瘍獨見者死

細細來蘿蘿細如絲應指沉沉無絕期春夏少年俱不到秋冬老弱却相宜 細為氣聚血少有此症者逆

伏 伏脈推筋着骨尋指間繞動隱然深傷寒欲汗陽將解厥逆臍疼症屬陰 膽瘻為陰中伏陽邪滑瘻為陽伏陰中為內蝕為流注

浸淫難治宜溫補

動 動脈搖搖數在闊無頭無尾豆形圓其原本是陰陽搏虛者搖兮勝者安

動主痛陽動汗之陰動溫之

促 促脈數而時一止此為陽極欲亡陰三焦鬱火炎炎盛進必無生退可生

腫瘻為熱為病進滑瘻為熱不退漸進者死

結 結脈緩而時一止獨陰偏勝欲亡陽浮為氣滯沉為積汗下分明在主張

腫瘻為氣結滑瘻為氣不調則危

代 動而中止不能還復動因而作代看病者得之猶可療平人却與壽相關 數而時止名為促緩止須將結脈呼止不能回方是代

結生代死自殊途 兩動一止三四日三四動止應六七五六一止七八朝次第推之自無失

腫瘻俱不利

脈數不時見當生惡瘻 脈數身無熱內有癰膿 脈數應當發熱而反惡寒若有痛處當發癰

脈數而浮膿腫在外宜先托裡忍

邪入內脈沉而實宜先疎通以絶其源脈不浮不沉無内外症知其在經宜和營衛 脈數發熱而痛者發於陽脈不數不發熱而痛者發於陰

癰疽無脈者氣閉也宜行氣其脈自見

者發於陰 癰脈宜洪大而數若沉緊者死疽脈宜沉而實若浮洪而散者死

癰疽之源

人身之氣與天地同流人身之經絡與晝夜同度可或六淫之感七情之傷飲食不時房勞不節致使陰陽乖錯營衛繩結而成癰者

總不出此二因故以二因首例

外因運氣癰疽有四

一火熱助心為瘻瘍經曰少陰所至為瘻瘍又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從其則瘻瘍又云少陰司天之政初之氣寒乃始陽氣轉

炎暑將起中外瘻瘍又云少陽所至為瘻瘍又云少陽司天之政風熱參布太陰橫流寒乃時至民病寒中外發瘻瘍初之氣候乃太溫

其病膚腠中瘻二之氣火反鬱其病熱鬱於上瘻發於中三之氣炎暑至民病膚瘻又云太陽司天之政初之氣候乃太溫肌腠瘻瘍此

皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝甚則瘻瘍又云少陰之復病肺疹癰疽瘻瘍又云火太過曰

赫羲其病瘻疽血流又云火鬱之發民病瘻瘍癰腫此是邪變病之甚也

二曰寒邪傷心為瘻瘍經曰太陽司天寒淫所勝血變於中發為瘻瘍病本於心又云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰

疽注下又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘻瘍是也

三曰燥邪傷肝為瘻瘍經曰木不及曰委和上商與正商同其病火發癰腫瘻瘍邪傷肝也又云陽明司天燥淫所勝民病瘻瘍癰病本於肝是也

四曰濕邪瘻瘍經曰太陰司天濕氣變物甚則身後癰又云太陰之勝火氣內鬱瘻瘍於中流散於外是也

右四條天行時氣也此由外感故曰外因然外來之因則肌肉血脉筋骨受之其見症多寒熱交作筋骨疼痛及濕瘡流注風濕風溫時毒等類治宜發之如蒼朮復煎散紺珠丹之類經云汗之則瘡已使榮衛通行邪氣不得干於內也又云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大悞又云此寒氣之種八風之變四時之病以其勝者治之此亦外因也

內因

經云氣宿於經絡與血俱滯而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後成癰者為由七情內鬱而成或兼竭力房勞陰虛所致又云形樂志苦病生於內此由內傷故曰內因然內傷之因則五藏受之其見症瘡多堅硬根蒂深固二便不調飲食少進外軟內堅平陷無膿表實裡虛毒多難治宜托裡以培其本禁用驅熱拔毒汗下之劑書云纔得腫痛養之脈症但有虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉經云肺乘肝則為癰又云腎移寒於肝肝腫少氣肝移寒於肝癰腫筋掣此藏腑之變亦屬內因也藏腑之變乃八風之變皆寒癰例也其形堅硬如石或皮不變色或捻之不痛治宜溫補以回其陽如參附著木之類是也

不內外因

經云膏梁之變足生大疔又曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫榮氣胃氣也益飲食入胃先輸於脾而朝於肺腑百脈次及於皮毛先行陽道下歸臟腑而氣口成寸矣夫膏梁之變者則榮氣太過不能走空竅而行皮毛反行陰道逆於腠理而生癰腫此肌肉實滯而然也飲食之虧者則榮氣不及不能走空竅而充皮毛短而不盈凝於腠理而生癰腫此肌肉虛滯而然也或兼房勞不節者則腎水虧損腎水虧損則反從濕化而上行其瘡多生於胸背晝言太疔者癰之最重者也此不屬內外兩因故曰不內外因然不內外因則脾腎二經受之外無六經之形症內無便溺之阻隔治宜審症脈之虛實辨形色之順逆知所從用以補瀉如榮氣太過者治宜大瀉以奪氣壅如貴金丸排膿散之類

榮氣不及者治宜大補以滋氣少如異功散十全大補湯之類真陰虧損者治宜托裡補虛如神效托裡散內固黃耆湯之類禁用五穀等藥復損其陰

癰疽之別

癰發於六腑為表為陽為熱為實其發迅暴如燎原之火故熱痛高腫侵長膚大皮薄光軟以澤多有林眼或作便閉發渴發逆以拒之由正氣內固不能下陷是以五藏終不傷也疽之發於五藏為裡為陰為冷為虛其發停蓄如陶室之火內消骨髓故無熱無腫無痛形如瘡癰色淡而堅甚則如牛頭之皮見七惡逆症者死七惡逆症見後陽中之陰者似熱非熱雖腫而虛亦而不燥痛而不脹浮而復消外感而內腐其人多肥肉聚而內虛也陰中之

陽者似令非冷不腫而實赤微而燥痛而有膿外不盛而內煩悶其人多瘦肉緩而內實也

陽症變而為陰者草醫涼劑之過也陰症變而為陽者大方熱藥之驗也然陽變為陰猶可返於陽也其症多生陰變為陽為不久復歸於陰矣其症多死陽症有熱則氣血行而生肌陰症無熱則氣血滯而不斂故云有熱無熱為死生之訣觀此則知癰疽有陰陽表裡虛實之分而無大小之別也但恐猶有未悉者再續陰陽善惡生死順逆等歌內消內托虛實等治使一見了然庶無舛誤

癰疽陽症歌

癰疽不論上中下惟在陰陽二症推發背雖有止與偏要取高低兩樣看純陽初起必焮腫更兼身熱有微寒項如尖字高突起腫似鈎弓根有盤七日之間多焮痛二七之期膿漸漫動息自寧食知味二便調勻無瀉乾腫消膿清精神炎脫腐生新氣血完五善自然臻並至七惡全無半點干痛便隨膿減腫退自肌寬新肉已生紅艷艷腐皮自斂白漫漫一身多夾快五藏盡和歡此屬純陽俱易治百人百可保全安

癰疽陰症歌

純陽初起不知瘡粟米之形疣瘩僅不紅不腫不知痛少熱少焮少限防七朝之後身體僵硬瘡根平大喜淡湯頂不高兮根不活色不光兮腐不擗陷軟無膿空結聚脈浮散大細飛颶飲食不餐身戰戰嘔湯止許意忙忙瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膜多臭穢身難便舉動慄惶韻不長瘡形成紫黑面色變青黃精神昏濁多廝睡言語無人自發揚口乾多舌強瘻喘定身亡此屬純陰俱不治百人百可到泉鄉

癰疽半陰半陽症歌

陰陽之症兩相交生死同兼事可招微熱微寒微赤腫半昏半炎半平高脈來雖數多無力飲食雖食便不消腫而不潰因脾弱潰而不腫為膿既大使多沸小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡未全述口渴喜茶腸腹痛面浮脣缺足心高心煩不穩睡神亂怕音集投方應病方為妙陰轉為陽始可調心真達化爾命堅守達之任是神仙手半死餘生定莫逃

癰疽五善歌

心善精神爽言清舌潤鮮瘡既不渴睡醒得安然肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康脾善唇滋潤參憚蘭麝香凡食俱有味膿厚更肥黃肺善聲音響無瘻韻更長肌膚多滑潤大便自尋常腎善誠為要水深火自降口和兼不渴小水得稀長

癰疽七惡歌

一惡神昏憤心煩舌上乾瘡形多紫黑言語自呴喃二惡腰身強目睛邪視人瘡頭流血水黃博是肝述三惡形消瘦膿清臭穢生瘡升多軟陷脾敗不知寒四惡皮膚槁聲嘶韻不長瘻多兼喘急鼻動肺將亡五惡成消渴隨飲即隨乾形容多慘黑囊縮腎家端六惡身浮

重脇鳴嘔饑頻大腸多滑泄藏腑並將傾七惡瘡倒陷形如剝鱗同四肢多冷逆汚水自流通

善屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食則勿藥亦愈惡屬臟症多因元氣虛弱或汗下失宜胃氣受傷或寒涼刺伐以致邪氣愈實也法當純補胃氣多有可生者宜於清陽主治諸方內對症施治此外更有清後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸瘧脉不寧牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒戰咬牙手撒身熱脈洪大按之如無或身熱惡衣欲投水中其脈浮大按之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變之惡症也手足逆冷肚腹疼痛泄瀉腸鳴飲食不入呃逆嘔吐此陽氣虛寒氣所乘之惡症也有汗而不惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張頸項勁強此氣血虛極變症之惡症也俱急用參耆歸木附子以救之間有得生者不可因其症惡遂棄而不治

癰疽生死法

初生如粟裡可容谷外面如麻裡大如瓜外面如錢裡可容拳起勢大終無害未老先白頭無膿軟陷休瘡從疣瘡起有膿生方許腫潰氣昂昂不治自安康根高頂入高八十壽還饑焮腫易腐爛任大終無恙瘡高熱燥疼雖苦必然生瘡軟無神氣應補方為益肉腫瘡不腫必竟生疑恐膿穢不進食泄瀉黃泉客瘡色猪肝紫無膿必定死綿潰不膿爛內怕葡萄散仰卧不知疼陰症命難生腐盡有敗氣笑裡終生祟根散瘡平塌神仙無治法久病目露神必竟命難存面忽似塗脂十日後分離敗中有紅肉雖重生門路新肉如板片不食終須變手足皮枯槁血敗生難保唇白眼無神腹脹瀉將傾醣氣不消氣雖重多生意眼眶黑氣濃癰疽怕此蓬房中杳韻韻是病終為禍瘡熟身微熱輕病何須說生死此中求片言一可決

察形色順逆

凡閱人之病必先視其形色而後與脈病相參誠識於始以決其終百無一失矣曷言之陰病見陽色肥樶紅厭陽病見陰色指甲呈青此二者俱死又身熱脈細唇吻反青目珠直視者死面白如塗脂色似土黃油膩黑氣塗抹者死唇舌乾焦鼻生烟煤眼神透盞者死形容憔悴精神昏短身形縮小者死喘粗氣短眞姦睛露語言譖妄者死循衣摸床遺尿失禁撒空者死頭低有軟眼視無神吸吸短氣者死皮破無血肉綻爛斑麻木不知痛痒者死齒黃色如煮豆唇白反裡無紋耳黑枯焦不聽人中縮而坦平口張氣出無回閑真扇相隨呼吸行出汗如珠不散疾若膠而凝堅自血紅如肺色指甲營而滯青神昏神浮神亂神離縕衣生滿面黑氣忝天庭逢之都沒命法在此詳邪在經也則和解之

內消內托

內消 消者減也於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之劑必分之以虛實如脈症俱實者汗利之脈症俱虛者滋補之次分部位佐以引經消毒之藥使氣血各得其常則可內消也再如熱渴便閉邪在裡也則疎導之寒熱燥痛邪在表也則發散之無表裡症邪在經也則和解之