



水聖散

治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少杵爲細末乾

貼患處

泄腸散

治小兒久痢大腸頭脫出不收

訶子

炮

赤石脂

龍骨

各等分

右爲末臘茶少許和藥搽腸頭上絹帛搽入又治痢米湯調  
又方治脫肛五倍子焙爲末入茶依前方用

勝雪膏

治隨腸番花鼠妳等痔熱痛不可忍或已成瘡者並

皆治之

片腦

風化硝

石仲各半字用好酒少許研成膏子塗之隨手輒愈

治大人小兒脫肛不收方連翹不以多少洗淨爲細末先以鹽

水洗後用藥末時時乾傳脫肛上立差

蓖麻膏

治暴患脫肛

蓖麻子 一兩

石件并爛爲膏捻作餅子兩指寬大貼臍上如陰證脫肛加生附子末葱蒜同研作膏依前法貼之

朱氏家傳治小兒脫肛方

右用磁母石以石研爲末麪糊爲丸如菜豆大熟水下五七丸後以磨刀水洗脫肛處立效

脫肛用東北方陳壁泥土湯泡先洗下後熏上

保生信效

治久病腸風痔漏腸出不收至有出數寸者苦楚

良極小兒久瀉利亦名此疾

石先用五倍子四兩以水五升煎湯一兩沸投入朴硝四兩  
通手淋洗至水冷卽止若覺熱痛卽津唾調熊膽塗之痛卽  
止當漸收甚者不過淋洗三五次收盡竊詳此藥朴硝能軟  
五倍子能收二物相須以爲用或更以乾蜘蛛末摻之乘熱  
以軟帛搥入尤妙

參蜚蛛者與  
葛氏方同

九驚衛生療小兒脫肛方

香附子

荊芥穗

各等分

石同爲粗末每用三匙水一大碗煎十數沸淋漉

苦參湯 治脫肛并痔

枳殼

黃連

大黃

甘草

荊芥

石參

赤芍藥

黃芩

各等分

石判散每用五錢以車煎子茅草同煎熏洗

小兒脫肛瀉血秋深不痊灸龜尾一壯炷如小麥大脊端窮骨也  
小兒脫肛者灸臍中三壯  
小兒脫肛久不瘥及風癰中風角弓反張多哭言語不擇廢無時節盛卽吐沫者取百會一穴灸七壯在鼻直入髮際五寸頂中央旋毛巾可容豆炷如小麥大

### 肝痒

小兒肝痒或嗜甘肥大腸濕熱壅滯或濕青生虫而蝕肛間若因濕熱壅滯用四味肥兒丸疳大便秘結者用清涼飲裏重蝕肛門先用化蟲丸後用四味肥兒丸外以雄黃散納肛內若因病不食虫無所養而食臟食肛者其齒齲無色舌上盡白四

服倦怠其上唇內有瘡唾血如粟心內懊憹此虫在上食腐若  
下唇內有瘡此虫在下蝕肛門若蝕肛透肉者不治諸虫惟上  
半月頭向上可用藥追之望後頭向下令患者聞煎食香味虫  
頭卽向上矣後用藥追之 一見嗜膏粱甘味患疥瘡余謂當  
禁其厚味急用清胃之藥以治其積熱不從乃用敷藥以治其  
外更肛門作痒發熱瘡益甚肌體骨立飲食少思遂用九味蘆  
薈丸疳五味異功散疳加柴胡升麻尋愈 一見肛門作痒耳  
前後結小核如貫珠隱于肌肉之間小便不調面色青此稟母  
之肝火爲患用九味蘆薈丸爲主佐以五味異功加山施柴胡  
又以加味逍遙散熱加漏蘆與母服而愈 一兒十三歲肛門  
作痒或脫肛或大便血遍身生瘡發熱作渴腹大青筋用大蘆

奮凡五味異功散其瘡漸愈佐以補中益氣湯熱渴漸止肛門  
悉愈又用異功散爲主佐以補中益氣湯加吳茱萸所製黃  
連湯之而血愈 一兒十五歲兩目白翳遍身似疥非疥肛門  
作痒晡熱口乾形體骨立余以爲肝疳之證也用六味地黃丸  
而痊後陰莖作痒小便澄白服蟠葱散肛門腫痛服大黃等藥  
肛門脫出作痒不可忍雜用降火之藥不應下唇内生小自瘡  
余以爲虫蝕肛門用九味蘆薈丸而愈 一小兒肛門作痒誤  
以爲痔服槐角丸等藥肢體消瘦鼻下濕爛而唇内生瘡此虫  
食下部也先用化蟲丸二服乃用五味異功散四劑却用大蘇  
黃湯辨四味肥兒丸而痊 一兒七歲飲食過多卽作瀉面青  
黃色服峻利剋劑余謂當節飲食健脾胃爲善不信後牙齦赤

爛肛門作痒服清熱之劑腹痛膨脹復請欲用前劑余曰此元氣虧損虛火上炎也仍不信後腮間黑腐余曰此脾氣太虛肉死而不知痛也明矣後雖信余已不救矣若初用五味異功散健脾胃爲主佐以大蘆薈丸四味肥兒丸清脾濕熱豈有不治之理哉後之患者審之 一小兒肛門作痒屬大腸經風熱用槐角丸而愈 一小兒肛門連陰囊痒出水淋瀝屬肝經濕熱也用龍膽瀉肝湯九味蘆薈丸治之並愈 一小兒嗜甘肥肛門作痒發熱作渴雜用清熱之劑腹脹少食鼻下生瘡余謂脾胃濕熱生虫也不信後下唇内生瘡先用四味肥兒丸諸證漸愈又用大蘆薈湯治之而痊

化蠱丸

治諸疳生虫不時啼哭嘔吐清水肚腹脹痛唇口紫

黑腸頭濕蘼

蕪荑

青黛

蘆薈

蝦蟆燒灰

川芎

白芷

胡黃連

各等分

右各另爲末猪膽浸糕丸如麻子大每服一二十丸食後并

臨臥杏仁湯下

雄黃散 治走馬疳並痘毒疳重蝕肛門

雄黃

銅綠各二錢

右爲末摻瘡上

腎

錢腎主虛

無實也惟瘡疹腎實則黑陷

兒本虛怯由胎氣

不成則神不足目中白睛多其顱則解凶開面色眊白此皆難

養縱長不過八八之數若恣色慾不及四旬而亡或有因病而

致腎虛者非也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜下而身縮

也腎者陰也腎虛則畏明皆宜補腎心氣熱則上竄宜導赤散地黃丸主之

腎氣虛則下竄直地黃丸是也腎病見夏水勝火腎勝心也當治腎輕者腎

病退重者悸動當搖潔腎主寒自病則足脛寒而逆人之五

臟惟腎無實小兒瘡疹變黑陷則是腎實水尅退心火心乘

腎微邪內熱不惡寒桂枝湯主之肺乘腎虛邪喘嗽皮澁寒

百部丸主之肝乘腎實邪拘急氣搖身寒理中丸主之脾

乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之劉五行之中惟有腎

之一臟母盛而子反受邪何則肺屬金射于皮毛所主者氣腎

屬水主于骨髓所藏者精氣之輕浮能上而不能下精之沉重  
能下而不能上此物性之自然今肺之盛蓋熱之作也熱上蒸  
于肺則不能下生于腎而腎受邪矣急服涼藥解之使肺氣清  
和而後可此腎病必先求之于肺若肺臟安和而腎忽然受病  
者不過脾之濕相刑于腎而生疾所以有解肺熱去脾邪兩藥  
若脾肺兩臟俱和而腎自生疾亦察其本臟而治之

**薛下竄**

等證足不喜覆者蓋腰以下皆腎所主乃心氣下行于腎部也  
法用地黃丸壯腎水以制心火若因脾肺虛而不能生腎水者  
用補中益氣湯六味地黃丸以滋化源其瘡疹黑陷乃腎虛而  
邪氣實也尤當用地黃丸

地黃丸

錢氏

熟乾地黄八錢 山茱萸肉 乾山藥各四錢 澤瀉

牡丹皮 白茯苓去皮各三錢

右爲末煉蜜和丸如桐子大三歲已下一二至三九空心溫水化下

垣或問錢氏地黄丸補腎又曰補肝何也曰然手厥陰心主包絡足厥陰肝經俱治在下焦經云不足者滋其化原故肝腎之病同一治法此地黄丸補二經之意也此海藏云若加五味爲腎氣丸此滋肺之源以生腎水  
薛前丸治腎肝血虛燥熱作渴小便淋秘痰氣上壅或風客淫氣瘰癧結核或四肢發搐眼目瞶動或咳嗽吐血頭目眩暈或咽喉燥痛口舌瘡裂或自汗盜汗便血諸血或稟賦不

足肢體瘦弱解顱失音或畏明下竄五遲五軟腎疳肝疳或  
早近女色精血虧耗五臟齊損凡屬腎肝諸虛不足之證宜  
用此以滋化源其功不可盡述

海腎實須澤瀉瀉之腎本無實不可瀉錢氏止有補腎地黃丸  
無瀉腎之藥治脉洪而實錢氏地黃丸加生地黃去山茱萸  
是也此治左手本部脉實若右尺洪實以鳳髓丹瀉之

鳳髓丹方見雜

病遺精門

### 解顱頤陷頤填總論

萬全方云小兒有解顱候有頤不合候有頤陷候此三者大同  
而小異也解顱者謂小兒年長頤應合而不合頭顱開解也腎  
主骨髓而腦爲髓海腎氣不成則髓海不足故骨縱開解也其

顛不合與顛陷雖因臟腑有熱熱氣上衝致顛或不合或陷然亦本于腎氣不足也

薛腎主骨骨氣實則腦髓充而顛早合骨脉盛而齒早生腎氣怯則腦髓虛而顛不合此由父母精血不足宜用地黃丸補之若在乳下當兼補其母更以軟帛緊束其首使其易合皆虛火上衝當調補脾腎爲善顛填顛陷亦因所稟腎氣不足及乳哺失宜脾胃虧損所致夫脾主肌肉氣逆上衝而爲填脹元氣下陷而爲顛陷也並用補中益氣湯地黃丸及用狗頭骨炙黃爲末以雞子清調敷顛門亦有瀉利氣血虛脾胃不能上充者亦用前法若手足並冷前湯加薑桂末應虛寒甚也急加附子緩則多致不救

張煥嬰兒解顛顛不合顛填顛陷下不平皆由腎經虛熱宜用

封頤散方

蛇蛻皮

一兩燒灰細研

防風

川大黃

濕紙裹煨存性

白芨

各半兩

右件研為細末入青黛半兩同研勻每用半錢以獾猪膽汁調勻用一紙頤子攤之四邊回合各留少白紙用淡生醋麪糊貼頤上不佳以溫水潤動一伏時換

解頤

頤不合

初虞世云父精不足則解頤眼多白

**錢**解頤生下而頤不合

腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多眊白色瘦者多愁少

喜也餘見腎虛

**湯**

解頤者頤大頭縫不合如開解故曰解頤

此由腎氣不成故也

云云見前總論

凡得此者不過千日其間亦有數

歲者乃廢人也人之無腦髓如木無根古人雖有良方我所以

不錄者勞而無功也亦不可束手待斃宜依錢氏補腎萬一有

可生之理

錢氏補腎如地黃丸加鹿茸之類是也

曾凡得此候不及千日之內間

有數歲者偶有他疾攻激遂成廢人若氣色精明能飲食者多

服調元散補腎地黃丸旬月內頗見效者次第調理或有可治

若投藥後如故亦難療矣

田解顱治法宜用生地散

丹小

兒解顱乃是母氣血虛與血多耳用四君子四物有熱加酒炒

黃連生甘草煎服外以縣束緊用白斂末傳之

錢氏地黃丸

見前并鶴節條

天南星散

治顱開不合鼻塞不通天南星大者微泡去皮爲

細末米醋塗調緋帛上貼顱上炙手頻熨之立効

調元散 主稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹大如腫致

語遲行遲手足如筒神色昏慢齒生遲服之效

乾山藥

錢五

人參

去芦

茯神

去皮木

白茯苓

去皮

白朮

白芍藥

當歸

酒洗

熟地黃

酒洗

黃芪

蜜水炙各二錢半

川芎

甘草

炙二味各三錢

石菖蒲

二錢

右碎每服二錢水一盞薑二片東一枚煎七分無時溫服如

嬰兒幼嫩與乳母同服

張渙玉乳丹

治嬰兒頭應合而不合頭縫開解

鍾乳粉

依古法制煉者

栝子仁

別研

熟乾地黃

依法蒸焙者

當歸

洗焙乾各半兩

防風

剉

補骨脂

淨揀微炒各一分