

增補醫方一盤珠卷之五

金川邑庠生洪金鼎玉友氏纂

洛陽秦莊

怪病方脩覽

一頂上生瘡如櫻。莖大有五色。瘡破則頂皮斷。逐日飲牛乳自愈。牛乳黃牛者佳。

一寒熱不止。經旬後。四肢堅如石。以物擊之。似鐘磬聲。日漸瘦。用吳茱萸青木香等分。煎湯飲。效。次即愈。

一大腸頭出數寸。痛苦。直俟乾自脫落。又出名截腸病。若腸盡必不治。用蒜油洗。以瓦器盛之。飲大麻子汁。數升愈。

一鼻中腥臭。水流。以碗盛之。有銹色米飯大。走躍不注。以手捉之。即化為水。此肉壞矣。注意。長雖為自愈。

一腹上麻痺不仁。多煮葱白食之即愈。

一兩足心凹如腫。上面生黑色痘瘡。硬如釘子。履地不得。脛骨如碎。髓漸流出。身發寒戰。惟思飲酒。此是肝腎氣冷熱相吞。用炮烏頭末敷之。煎韭子服之即愈。

一腹脹經久。忽瀉數日。晝夜不止。服藥不驗。乃爲氣脫。用益智仁濃煎湯服立效。

一四肢節脫。但有皮連。不能舉動。名曰筋解。用酒浸黃蘗三兩。經一宿取出。焙乾爲末。每服二錢。酒調服盡效。

一玉莖硬不痿。精流無歇。時時出針狀。控之則脆。乃爲腎滿。漏病用韭子故芷各一兩爲末。每服三錢。愈。

一咽喉間生肉。重七疊。漸七腫起。不痛。方有瘻子臭氣。

自出用臭橘葉煎湯常服效

又方用醋搗生牛乳汁鵝毛醋攪入喉中每日數次效

一腹中如鉄石臍下水出旋變作虫行之狀遶身匝啄痒痛難

忍撥掃不盡用濃煎蒼朮浴之

又以蒼朮末入射香少許調服

一眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝膽經爲疾用

車仁川羌活
玄明粉青柑子各一两爲末每服二錢效

大腸虫出不止止之復生行坐不得用鶴虱五錢爲末水調

服數次卽愈

一眼睛垂出至鼻痛不可忍或時時大便下血名曰肝脹用羌

活煎汁數盃效

一腹中有物作聲隨人語言用薑汁一盞分作五服 又名應

聲虫多服雷丸自愈

一有飲油四五斤方始快意常得吃則安不吃則病此是髮入胃腕血氣裹了化爲虫也用雄黃五錢爲末水調吃卽出如虫活出置油中煎少時連油置之長流水中

一人卧于床四肢不能動只進飲食好大言說謂之失說物望病治之之法如說食猪肉應之曰便與你吃猪肉一頓病者聞之則喜遂置肉與病人見之臨要吃却不與食此乃失他物望也當自睡時涎出便愈不必服藥

一十指節斷壞惟有筋連虫出如燈心長數尺遍身綠毛捲名曰血餘用茯苓胡連煎湯飲之

一眼珠忽黑見物依礁毛髮直如鉄條不語如醉名曰血潰病

用五靈芝爲末酒調吃效

一 遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出謂之氣奔以

人參青鹽細辛略一作二服水二碗煎吃效

一 因着及大甚炙訖火茄便脫落瘡內鮮肉片子飛如蝶行騰

空而去痛忍不見血肉俱熱用大黃朴硝各半水調吃

一 臨臥渾身虱出約有一二升血肉俱壞每宿漸多痒痛不可

言狀但飲鹽醋湯十數盞即安

一 面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無濃血但痛痒不常飲

食減少久則透脛名曰寒瘡多吃魚雞韭葱自愈

一 脇破腸出臭穢急以香油摸腸以手送入煎人參枸杞湯淋

之皮自合矣吃羊腎粥十日即愈

一口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋過十日漸上至肩胸與肉相連堅如鐵石煎濯瀉湯日飲三盞連服五日即安

一遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食名曰血擁病若不速治潰如膿出用赤皮葱熨灰淋洗吃豆豉湯數盞自安

一眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經月不愈者用蒜三兩取汁酒調下即愈

一毛孔節次血出若血不出皮膨脹如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此各脉溢病飲生姜水一二盞即安

一口內生肉穢臭穢難堪用水調生射香一錢服之三日安

一渾身出燎炮如棠梨每個破出水內有石一_{如指}元_{甲大}炮復生

抽盡肌肉不可治急用荆山稜莪米_{各五錢}酒調吃效

一頭面發熱有光彩他人手近之如火燒用蒜口半兩酒調吃下吐之如虫狀遂安

一人自覺自形作二人並卧不別不假不語問亦無對乃是離魂病用辰砂人參茯神濃煎湯服之真者氣爽假者化也

一忽然氣上喘不能語口中涎流吐唾齒皆搖動悶絕復甦如

是名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參水煎三盞熱吃安

一男子自幼喜飲酒丁後和飲一二斗酒呼呌不絕全不飲食

日就羸弱令其父用手帕縛其手足勿令搖動但扶生辣酒一

饌就于其口邊打開其氣冲入口中病者必欲取飲堅執不與

之食須與忽虫物一塊直下饌中即用紙封饌口取烈火燒

滾待酒乾謂其物一塊如猪肝一樣約三兩重周圍有

小孔如針眼不可救計棄之于江飲食復舊雖有酒不能食也

一夜間飲水誤吞水蛭入腹經停月餘必生下小蛭能食人肝

血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治必至于此用

田中乾泥一小塊小死魚三四個將猪油溶開攪勻用地豆

去壳研爛丸如菉豆大用田中冷三九至五九十九須更快

水蛭一時皆瀉出却以四物湯加黃芪煎服生血養氣

一婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直過小腹痛不可忍

危亡須臾名曰乳懸將川芎各斤半剉碎于瓦石器內用水

濃煎不拘時候多少溫服餘一半剉作大塊用香爐漫火燒爛放在

病人面前桌子下要烟氣在上不絕令病人低頭伏桌子上

將口鼻及病乳常吸烟氣直候用此一料如前法煎服及燒

烟重吸必定見效如未收全功用冷水磨草麻子一粒于頂心塗片時卽洗安

一婦人臨產服催生藥六日未曾離經用力大過以膏過膜有傷產後水道中垂出肉線一條約二三尺長先食硃散數劑仍用老姜三片洗淨不去皮研爛用清油二兩拌勻入鍋內炒熟以油乾焦爲度先用熟絹一段五尺長摺定令穩婆輕輕乘起肉線使屈曲作一團納在水中用絹袋兜油薑稍溫敷在肉線上漸冷又炒熱使之常有姜氣俟肉線或一日一宿盡入腹中卽安再服失咲散歸芎湯以補氣血卽安

一居人逃避石室中賊以烟火薰之欲死迷悶摸得一束蘿蔔嚼汁嚥而甦又炭烟薰火雞冠含蘿蔔一片着口中烟氣

不能毒人或預曝乾爲末備用亦可新水搗爛飲其汁亦妙
一自行破跌撲斷舌血出不止以米醋用雞翎刷所斷處其血
卽止仍用真蒲黃杏仁去皮尖礪砂少許研爲細末煉蜜調
藥得所噙化而安

一眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如鉄條乃是熱毒結氣于下
焦用白礬滑石各一兩爲末作一服緩七服盡其病卽安

一虫如蟬走于皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化用雷九雄黃
各一兩爲末摻在猪肉片上蒸熟吃盡自安

一身及頭面浮腫如蛇狀者用兩滴堦磚上苔痕一錢水化之
擦上立消

一鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸龜圍如繩痛不可忍蟬摘

一莖卽須更復生此因食猪羊肉過多遂有此疾用乳香礪

砂

各一兩

爲末以飲爲丸如梧桐子大空心臨

卧各一服

自然遺落

一人兩目珠忽然流出在外用九味羌活湯

一服令仰卧時

九味羌活湯防風

黃芩白芷與川芎

蒼朮細辛生地

煎法還須薑蔥

外科癰疽論

癰疽發背爲何生好好身軀出此形內被七情于臟腑憂愁思慮總關心外又六淫傷氣血風寒暑濕火相臨膏粱厚味多無忌勞傷房慾致虧陰故將五臟多垂變自然六腑不調勻發于心上多危險五臟相干事可明心之以下多成順六腑之因亦

許評脾家積毒生肩脊心經火毒對心臨兩肩左右雙生發肺
肝積受不虛名蓮子蜂窠防毒陷腰間腎俞發難生督脉經虛
從頂發俗名對口故相稱何期耳後多生發天疽銳毒亦非輕
又有脫疽生手足行房補術孽根因慢腫難治燉腫易總論中
間法可憑諸方另自分明說豈許輕手紊自呈

癰疽治法論

癰疽發背怎生醫不論陰陽先灸之不痛灸至痛疼灸不疼時
內服蟾酥丸一服外將神火照三枝用膏貼頂上敷藥四邊圍
氣盛兮頂自高而突起血盛兮根脚束而無疑高腫起者忌用
攻利之藥以傷元氣平壅滯者宜投補托劑以益其虛內熱甚
者量加消毒清劑便閉燥者必須通利相宜使臟腑得宣通俾

氣血目流利十日之間瘡上堅必用拔針當頭生肌之後膿亦少須將藥筒對頂拔提有膿血之交粘必臍肉之易脫且如其時內有膿而不得外發者以針鉤向正面鉤其頂肉用刀剪當原頂剪開寸餘使膿管得通流瘡頭無閉塞頻將湯洗切忌風吹又關節在于斯時變生出于此後治當大補方全收斂之功切忌寒涼致取變生之局蓋瘡全賴脾土調理必要端詳飲食必須戒口冷硬發物休食癰疽須屬外科用藥即同內症藥必求標本切莫別于先醫後醫若一概之攻補恐兩途之悞用又說陽變為陰內外被寒涼尅伐豈其陰變為陽首尾得辛熱扶衰病分真似理究陰陽湯散九丹

要發誠為學而必中神聖功

外科一宗予寔未經學習姑就外科

正宗撫拾數條以脩承

癰疽治法

神授衛生湯

治一切癰疽毒疔主方初起神效

羌活

分八

防風白芷山甲

炒

沉香

麝

紅花

連翹

各六

銀花

各六

銀花

各六

銀花

各六

銀花

各六

銀花

各六

皂刺

個一

歸尾

石決明

甘炒

花粉

錢一

乳香

錢五

大黃

二錢

如

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

服此方不愈又服

內消沃雪湯

前方必要三四劑

青皮陳皮乳香沒藥

各去

連翹

各八

生黃芪

當歸

各一

白芷

射干

花粉

山甲

貝母

各一

白芷

射干

花粉

山甲

貝母

各一

白芷

射干

花粉

山甲

貝母

各一

白芷

赤芍

金銀花

皂刺

各八

末香

另磨水

二分

大黃

二錢

大黃

二錢

大黃

二錢

大黃

二錢

大黃

二錢

大黃

二錢

大黃

二錢

大黃

二錢

大黃

雙解復生散

治一切癰疽毒瘡初起發寒發熱

荊芥

防風

川芎

赤芍

黃芪

山甲

麻黃

各七

麻黃

各七

麻黃

各七

麻黃

各七

麻黃

各七

麻黃

各七

麻黃

各七

麻黃

各七

麻黃

各七

生黃芪

當歸

薄荷

枝仁

連翹

金銀花

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

羌活

大黃 柴胡各一錢 體虛者加人參白朮

內消散 治一切癰疽毒瘡未破者 歸尾 赤芍尾 白芷尾

甘草稍當歸尾各一錢皂刺 內紅消 川山甲花粉 枳壳

枳八如服二三劑不消又服後方 金銀花 知母貝母

花粉 白芨錢一半夏 川山甲 皂刺 乳香各七分

托裡消毒散 治一切癰疽毒瘡已成不得內消者宜服此以

人參 川芎 白芍 黃芪蜜炙 當歸 白朮 茯苓

金銀花 白芷 甘草各一錢皂刺 桔梗各八分

排膿內托散 治癰疽及一切毒瘡已爛流膿時宜服此藥

當歸 白朮炒人參 川芎 黃芪蜜炙 白芍 陳皮 茯苓

苓 香附肉桂各八分甘草五錢白芷 桔梗各一錢牛膝下部加五分

透膿散 治癰疽及一切毒瘡內膿已成而不破服此即效

黃芪三錢 山甲錢半 川芎 當歸各二錢 皂刺一錢

回陽三建湯 治陰疽等瘡初起不紅不熱堅如頑石硬若舛

毛孔流血手足熱者俱急服之 附子 煨人參 黃芪 當歸

川芎 茯苓 枸杞 陳皮 束皮各一錢 木香另磨

甘草 紫甘厚朴 蒼朮 紅花獨活各五分 煨姜引

薰瘡奇方 治癰疽及發背一切毒瘡未成膿者薰之即消

雄黃 硃砂 血竭 沒藥 麝香 共為末 每用分

綿紙裹藥撚作條長尺許以麻油潤透灼火焙瘡徐徐薰

之火頭向上藥氣入內 瘡毒隨火解散真神方也

鉄桶膏 治癰疽發背及一切惡瘡已破根脚不收束貼銅綠