

醫學發明

丹溪心法

附錄
未

丹溪附餘三種

醫學叢書

文奎堂梓

醫學發明方目錄

吳茱萸丸

氣不通

利膈丸

痰喘

消痞丸

心下痞

黃耆補中湯

本草十劑

傷元活血湯

墜

乳香神應散

止痛

當歸導滯散

墜

紫金丹

骨

聖靈丹

止痛

調中順氣丸

痞

沉香導氣丸

痞

木香順氣湯

腹

沉香交泰丸

腹

加減瀉白散

喘

神祕湯

三奇湯

痰嗽

補中益氣湯

勞

朱砂安神丸鎮固

人參益肺散氣鬱

草薢菴丸心痛

丁香練實丸癰疔

茴香練實丸疔

托裏榮衛湯瘡

續隨子丸虛腫

木香楊氣丸腹脹

導滯通經湯脾濕

薑附湯寒禁

用藥加減法

通氣防風湯太陽氣鬱

白木附子湯寒中

天台烏藥散疔

川練子散疔

沉香海金砂丸脾脹

海金砂散脾濕

廣茂潰堅湯積

赤茯苓丸脾濕

沉香桂附丸

十全大補湯補弱

中滿分消丸熱脹

中滿分消湯寒脹

藿香安胃散嘔吐

加減二陳湯吐

人參平肺散肺痿

參蘇溫肺湯寒嗽

滋腎丸熱閉不渴

清肺飲子渴小便

還少丹補

補腎益肝丸困乏

水芝丸補

地黃丸腎虛

三才封髓丹益腎

離珠丸虛冷

天真丹下焦虛

八味丸腎氣虛

通幽湯幽門不通

潤腸湯燥結

當歸拈痛湯脚氣

羌活道滯湯脚氣

開結導飲丸痞悶

除濕丹溫腫

除風湯淋瀝

枳實大黃湯脚腫

小續命湯中風

疎風湯中風

三化湯治風燥

大羌活愈風湯風

大秦朮湯中風

半夏溫肺湯痰冷嗽

丁香半夏丸停飲

紫蘇飲子脾寒

巴戟丸腎虛

雙和散補血氣

附子溫中丸溫胃

五邪相干

醫學發明卷一

新安吳勉學校

膈咽不通並四時換氣用藥法

黃帝鍼經云胃病者腹膜脹胃臑當心而痛主支兩
脇膈咽不通食飲不下取三里夫咽者嚥物之門
戶也膈者上焦胸中心肺之分野不通者升降之
氣上不得交又云清氣在下則生飧泄泄黃如糜
米穀不化者是也濁氣在上則生脹腹中膜滿
不得大便或大便難或先結後溏皆是也濁氣在
上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而

友在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是
陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也
此皆氣衝之火逆胃之脉反上而作者也清氣在
下則生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而營
經也因飲食失節勞役形體心火乘於土位胃氣
弱而下陷于陰中故米穀入而不得升反降而為
飧泄也膈咽之間文通之氣不得表裏者皆衝脉
上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通
飲食不下取三里者是也鍼經云清濁相于亂於
胃中是為大惋惋者惑也氣不交通最為急證不

急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰
氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在
陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經
脉去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有
噎有塞塞者五藏之所生陰也血也噎者六府之
所生陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今立
四氣用藥並治法于後

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗
內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬
乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之

母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者
善嚏鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡
風寒小便數而久或上飲下便色清而多大便不
調夜寒無寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為唾白
沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者

吳茱萸丸主之

吳茱萸 草豆蔻仁

各一分錢

橘皮

益智仁 人參

黃芪

升麻

各八分

澤瀉

白殭蚕

薑黃

柴胡

各四分

當歸身

炙甘草

各六分

木香

二分

青皮

分三

大麥蘖

五分各

半夏一錢

右件為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大細嚼二十丸白湯送下無時

夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天助正氣而挫其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中如梗其者前證俱作治法當從時利膈丸泄肺火以黃芪補中湯送下如兩足痿厥行步惺然欬側欲倒臂膈如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃芪人參甘草白

木蒼朮澤瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎丸
一百五十丸六七月之間濕熱之令大行氣短不
能言者加五味子麥門冬如心下痞悶食不下
以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸五七十九丸更
當審而用之

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

朮香

錢七

枳實

七分

厚朴

姜製二兩

人參

藿香葉

當歸

炙甘草

枳實

炒各三兩

大黃

酒浸烔秤二兩

右為細末滴水和丸或少用蒸餅亦可如梧子大

每服三五丸食後諸飲下

消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連

去鬚棘淨炒六錢

黃芩

剉黃色六錢

姜黃

白木略

人參

四錢

炙甘草

縮砂仁

枳實

炒黃色半兩

橘皮

四錢

乾生姜

半夏

湯洗六次四錢

炒黃色二錢

一方加澤瀉厚朴各三錢

猪苓

三錢

右為極細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七十九至百丸白湯送下食後服

黃芪補中湯

醫方明

黃芪錢一

人參錢八

炙甘草

白朮

蒼水

橘皮各半

澤瀉

猪苓

茯苓各三分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓大溫送下上件九藥

本草十劑

宣可以去壅姜橘之屬是也此大畧言之盖外感六淫之邪欲傳入裏三陰尚實而不受逆邪氣於胃中窒塞不通而或噦或嘔所謂壅也仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之况乾噦者乎三陰者解也故單

用生姜宣散必愈若嘔者有聲而有物邪在胃系
未深入胃中以生姜橘皮治之或以藿香丁香半
夏亦此之類投之必愈此天分氣分虛無處一無
所受今乃窒塞仲景謂膈之上屬上焦悉屬於表
或有形質之物因而越之則可若氣壅則不可之越
者吐也亦破氣藥也辛溫若陰虛穢氣逆上窒塞
無下之理嘔噦不足之病此地道不通也止當用生地黃當
歸桃仁紅花之類和血涼血潤血兼用甘藥以補
其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則
氣逆嘔噦自不見主復有胃中虛熱穀氣久虛發

而為嘔噦者俾得五穀之陰以和之

五穀皆屬陰或食穀飲酒

湯皆止

則嘔噦自止且如小兒其後餘熱不退痼

不收斂大便不行一謂血燥則當以陰藥治血因而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也繁古云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風徹熱之劑傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲譫語躁狂不大便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所傷以及氣湯瀉其土實元氣乃得周流承氣之名於此見矣今哀世人以苦瀉火故備陳之除熱瀉火非其寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之

故諄諄及此至如孫真入言生疆嘔家之聖藥謂
上焦氣壅表實而言之非以瀉氣而言之也

右脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不上胃中閉
塞惟益胃推揚穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣
瀉血藥下之下之則轉增閉塞疼痛或變作結胃
復下其膈由此致危者多矣鍼經說阿欠噦唏振
寒噫噎脾沸淚出太息涎下耳中鳴自齧舌頰唇
視生病者補之此十二邪者皆奇邪之走空竅者
也凡邪之所在皆為不足宜補而不宜瀉空竅者
胃之清氣能通也胃氣虛則穀氣不上行是氣路