

東醫寶鑑雜病篇卷之二下

東醫忠勤真亮扈 聖功臣崇壽大夫陽平君

臣許浚奉 教擇

風

中風微漸

凡人初覺食指次指麻木不仁或至用者三年內必中風之漸也宜先服愈風湯天麻丸

方附見

各一兩料此治之先兆

○聖人治未病之病

知未來之疾此其良也具中風者必有先兆之證

微掣者此先兆也三年內必有大風宜調其榮衛覺大拇指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉

先服愈風湯天麻丸或加減防風通聖散

方見可

以預防也○竹瀝枳本丸

鯉鰐與搜風順氣丸 費

或臂膊立癱股指節麻痺不仁或口眼喎斜言語

或臂膊立癱股指節麻痺不仁或口眼喎斜言語

蹇滯或脅膈迷悶吐痰相續或六脈浮滑而虛軟無力雖未致於倒仆其爲中風暉厥之候可指日而定矣早當從丹溪之法調治之軒○初覺風氣便服愈風湯及天麻丸相爲表裏乃治未病之聖藥也

老陽

調法預防左半身不遂左手脉不足者以四物湯加味爲主治○右半身不遂右手脉不足者以四君子湯加味爲主治○痰盛者二陳導痰等湯加味兼用之○氣血兩虛而挾痰者八物湯加味加南星半夏枳實竹瀝薑汁之類○若真元漸復痰飲漸消或覺風邪未退者仍以羌活愈風湯防風通聖散加減調治而安

軒○更 加灸法尤好

熱生風凡濕生痰痰生熱熱生風妍○風病多因熱甚俗云風者言未而忘其本也非謂肝木之風實

甚而卒中之亦非外中於風良由將息失宜而心火暴盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣

怫鬱

心神

昏言筋骨不用

而卒倒無所知也多因

五志

憇懃

過極而卒中者由五志過極皆爲熱

甚故也

渴

○熱者風之體也風生於熱以熱爲本

而風爲標也凡有風者卽風熱病也

嗣

鄉里有人忽覺心腹中熱甚服治風藥而愈後到夷陵見

一太守夏月忽患熱甚不免以水灑地設簾臥其

上令人扇之次日急中風數日而殂及到澧陽而

一老婦夏中亦患熱夜出臥廳上次日中風其子

煎飲小續命湯更召醫調治數日而愈始知人之

中風因心腸中多太熱而後作也

熱生風信哉

贊所謂肥人多中風者肥則腠理緻密而多

肥人多中風

所謂肥人多

中風者肥則腠理緻密而多

中風者肥則腠理緻密而多

中風者肥則腠理緻密而多

中風者肥則腠理緻密而多

中風者肥則腠理緻密而多

中風者肥則腠理緻密而多

中風者肥則腠理緻密而多

中風者肥則腠理緻密而多

人年逾五旬氣衰之際多有此疾壯歲之人無有

也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而有也

疎

也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而有也

疎

也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而有也

疎

也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而有也

疎

肥人多中風者以其氣盛於外而歉於內也肺爲氣出入之道人胖者氣必急氣急則肺邪盛肺金丸木胆爲肝之府故痰涎壅盛治法先須理氣爲急藿香正氣散鰲眼加南星木香防風當歸非特治中風之證中風中氣尤宜醫

中風所因

內經曰風者百病之長也至其變化乃爲他病故有他風

風

漏風內風首風陽風泄風又有肺風心風肝風脾風腎風胃風勞風等

證

本經○河間曰風病多因熱甚詳見○東垣曰

中風者

非外來風邪乃本氣病也詳見○丹溪曰

風之爲病

西北氣寒爲風所中者誠有之東南氣

溫而地多濕

有風者非風也皆濕生痰痰生熱熱

生風也

經曰亢則害承乃制河間曰上極似木數

千年得經意者

河間一人耳○王安道曰昔人主

乎風河間主乎火東垣主乎氣丹溪主乎濕反以

風虛爲象而大異於昔人以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢殊不知因予風者真中風也因火因氣因子濕者類中風而非中風也○王安道有論二子與昔人論風之不同而立真中類中之目愚竊疑焉夫中風之證蓋因先傷於內而後感於外之候也但有標本輕重之不同耳假如百病皆有因有證古人論中風者俱有詔也三先生論中風者言其因也知乎此則中風之候可得而詳論矣

征

寒溫曰痰
壅盛譖

中風大證

風中於人曰卒中曰暴仆曰暴瘡曰蒙昧口

口眼喎僻

曰手足癱瘓曰不省人事曰言語

賊虛邪中人

黃帝問曰余聞四時入風之中人也風故有寒暑者寒則皮膚急而腠理間暑則皮

肥人多中風者以其氣盛於外而歉乎將必須火
正虛形乃能傷人乎少師曰不然賊風邪氣之中
人也不得以時然必因其開也其人深其內極其
病也卒暴因其閉也其人淺以留其病也徐以
遲帝曰有寒溫和適腠理不開然有卒病者其故
何也少師曰人與天地相參也與日月相應也故
月滿則海水西盛人血既積肌肉充皮膚緻毛髮
堅腠理郤烟垢着當是之時雖遇賊風其人淺不
深至其月郭空則海水東盛人氣血虛其衛氣與
形獨居肌肉減皮處縱腠理開毛髮殘勝理薄烟
垢落當時之時遇賊風則其深入其病人也卒暴
癘○邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次
治肌膚其次治筋脉其次治六腑其次治五臟治
五臟者半死半生也○邪秉虛人是謂虛邪細
留而不去其病則實

中風大法有四

一曰偏枯半身不遂二曰風痺身無痛
四肢不舉三曰風懿奄忽不知人四曰

風痺諸痺

類風狀

偏枯

血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛謂之
偏枯

偏枯隕○虛和偏客于身半其入深內居榮衛

榮衛

稍衰則虛氣去邪氣獨留發爲偏枯

仲○偏枯者手足爲邪氣阻塞脈道而然痿病則陽明虛

宗筋

縱帶脉不引不然痿病有變志亂之證痿

病則無之蓋痿病發於擊仆之暴瘓病發于怠情

之漸明是

兩疾也

風痺

神智不亂身體無痛曰肢不舉二臂不遂謂之
風痺

風痺隕○寐之爲病身無痛四肢不收志亂不

其其言微知可治甚則不能言不可治神

者緩者四肢不舉急則一身皆仰或右躰右瘓或

一臂不遂智亂不能言者難治宜換骨丹神仙飛
步丹脾實者膏梁之疾宜疎風順氣元祐無脾虛
者十全大補陽虧類人寶回春湯脉○辨廢也卽
偏枯之邪風深者癥與偏枯是二疾其偏枯身偏
痛而言不變志不亂邪在分腠之間卽東垣所謂
邪氣府也癥病身無痛手足不遂而言瘡志亂者
邪入于裏卽東垣所謂邪中臟也

風濁忽然迷舌強不語喉中室塞噫噫有聲謂之
風濁○風瘡者濁作卒倒悶針不語自軟有
汗者生汗不出直者不由痰水制火閉塞心竅而
不語也熱者牛黃清心元虛者道瘀湯方視吸飲
○風濁者奄忽不知人咽中室塞室然舌強不能
言病在腑腑汗出身軟者生汗不出生真有七日

風痺有全門

在下

中風之名各不同

其卒然仆倒者經稱爲擊仆世稱爲

半身不遂經稱爲偏枯世稱爲癱瘓及腰腿風乃

中倒後之證也

○其舌強不言唇吻不收經稱爲

癥病世稱爲風懿風氣亦中倒後之證也

○凡病偏枯必先仆倒故內經連名稱爲擊仆偏枯也

凡中風脈無不大者非熱也是風脈也

寸口

脈浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮

肉

膚絡脉空虛賊邪

不瀉或左或右邪氣反緩正氣

節急正氣引邪喝辟不遂邪在于絡肌膚不仁邪

在於經卽重不勝邪大于腑卽不識人邪入于臟

舌卽難言口吐涎沫等○中風口禁遲浮吉急實

大數三魂孤渺○中風脈遲浮可治大數而極者

死訛○中風脈浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治

脈法

東坡醫案

卷二十一 雜病篇

或浮或沉而微而虛扶危溫痰風未可疎謬。大法浮遲者吉急疾者凶。脉沉而遲者易治大數而急者死謬。○脉浮而大者曰風。○脉浮而數中風使然跡

風有中血脈中腑中臟之異

中血脉則口眼喎斜中腑

三者治各不同中腑者面頰五色有表證也而脉浮惡風寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中腑其病多易治。中臟者脣吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞀大小便秘結皆中臟其病多難治。○大抵中腑者多着四肢中臟者多滯九竅。○中血脉而外有六經之形證則從小續命湯加減或疎風湯治之。○中腑者先以加減續命湯隨證發其表如兼中藏則內有便尿之阻隔宜以二化湯或局仁丸方。○大觀滋潤湯外無六經之形證內無便

阻隔宜養血通氣大秦艽湯卷活愈風湯
○中臟者疾塞昏冒宜至寶丹之類鎮墜或活命
金丹牛黃定志丸祛風至寶丹○風中五臟舌瘡
眼瞀宜排風湯加減排風湯○但手足不遂言語
蹇涩當從愈風湯以行中道久服大風悉去治病
之法不可失于通塞或一氣之微汗加麻黃一錢
或一旬之道利加大黃二錢此爲常治
之法久則清濁自分榮衛自和矣

小續命湯

治卒中風不省人事咽斜癱瘓瘡瘍麻木眩暉初中無汗表實等及治一切諸風證

防風一錢半防己肉桂杏仁黃芩白芍藥人參川芎麻黃甘草各一錢附子泡五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服即○一方無防己附子有當歸石膏有熱用白附子○凡中風內脈浮緊風氣太盛心火暴升痰涎壅遏于經絡之中宜用小續命湯用附子以其稟雄壯之資而有斬閼奪將

之勢能引人參輩並行於十二經以追復其散失
之元陽又引麻黃防風杏仁輩發表開腠理以驅
散其在表之風寒引當歸川芎輩人血分行血養
血以滋養其虧損之真陰或加石膏知母以降胃
火或加黃芩以清肺金若病勢稍退精神稍復輒
當改用丹溪之法以補氣血清痰之劑以調養其
本氣此急則治其標與

夫標而本之之治也

軀

疎風湯治風中腑手足不仁先宜解表後用愈風湯
調理羌活防風當歸川芎赤茯苓陳皮半夏
烏藥白芷香附子各八分桂枝細辛甘草
各三分右剉作一貼入薑三片水煎服

加減續命湯治風中腑今人不分表裏虛實故張易
老授東垣以六經加減之法○太陽中
風無汗惡寒麻黃續命主之本方倍麻黃防風杏
仁有汗惡風桂枝續命主之本方倍桂枝芍藥杏

七○陽明中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之
本方倍桂枝黃芩加葛根一錢四分。太陰中風
無汗身涼附子續命主之附子加一倍甘草加二
錢一分乾薑加七分。少陰中風有汗無熱桂枝
續命主之本方倍桂枝附子甘草。六經混淆擊
之於少陽厥陰或肢節攀痛麻木不仁宜用羌活
連翹續命主之本方一兩加

羌活

一錢連翹一錢半

甘草

三化湯治腑臟俱中風便尿阻隔不利厚朴大黃枳
實羌活各等分右剉一兩作一貼水煎服日
二三次微利即止

二三次微利即止

養榮湯治中風脈外無六經之形證內無大小便之
阻隔但肢不能舉口不能言或痰迷不省當
歸川芎白芍藥生地黃麥門冬遠志石菖蒲陳皮
烏藥白茯苓枳實黃連防風羌活秦艽牛夏南星

甘草各六分右剉作一貼入

薑三片竹茹一塊水煎服

翻

排風湯

治風中五臟精神恍惚手足不仁口眼喎斜獨活麻黃赤茯苓各一錢白朮肉桂川芎杏仁白芍藥防風當歸甘

草各八分白鮮皮二錢

五分右剉作一貼入薑

三棗二水煎服

加減排風湯

治同上通治

五臟風天麻二錢蒼朮一錢防風川芎羌活獨活各八分麻黃七

分白鮮皮當歸白芍藥

白朮半夏赤茯苓黃芩杏仁甘草各四分右剉作一貼入薑三片水煎服

大秦艽湯

治中風外無六經之形證內無便尿之阻

隔知爲血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮此主之秦艽石

膏各一錢羌活獨活川芎白芷生地黃熟地黃當

歸白芍藥黃芩白朮各七

分細辛三分右剉作一

貼水煎服不拘時服

羌活愈風湯

治風中腑中藥

臟先以本藥治之後用此藥調理。

○凡中風內邪已除內邪已

盡當服此藥以行導諸

經久則大風悉去清濁自

分榮衛自和矣蒼朮石

膏生地黃各六分羌活防

風當歸蔓荆子川芎細辛黃芪枳殼人參麻黃白

芷甘菊薄荷拘杞子柴胡知母地骨皮獨活杜仲

秦艽黃芩白芍藥甘草各四分內桂二分右剉作

一貼入薑三片水煎朝夕服或以此湯空心熱下

二參丹臨臥薰下四白丹

一名愈風湯。

療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憒或瘦而偏枯

或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思忘之道

皆精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝

楊不省人事及風中臟精神

至寶丹

治卒中急風不語昏冒犀角朱砂雄黃琥珀玳瑁各一兩半黃

五錢龍腦麝香各一錢半銀箔五十片金箔五十

片內半爲衣安息香以酒濾去沙土淨一兩熬膏

右爲末大安息香膏內和勻一兩分作四十九人
參湯化下一丸一日二三服。安息香性硬難
化倉卒難用宜減半代。煉蜜爲佳藥。

滋潤湯

治風中臘二便閉濁先服此後以愈風湯調
理當歸生地黃枳殼厚朴檳榔大黃麻仁杏
仁各一錢羌活七分紅豆酒焙

三分右剉

作一貼水煎服

春

卒中風救急

初中倒時隨卽

醒者宜治若不醒者宜掐

亦宜吐之若口開手散遺尿者爲陽暴絕速宜大
料參芪補接之若眼戴

上者宜灸之。氣虛卒

倒濃煎人參黃芪湯加竹瀝薑汁服。卒中昏

倒不省牙噤涎潮口眼喎斜精神恍惚倉卒之際

以手大指掐刻人中卽省或急令人將病者兩手

兩足從上而下頻頻趕出四肢痰風卽散免致攻