

尚論後篇十

子仙珍藏

尙論後篇卷之三諸方目錄

太陽傷風諸方

計十五方除重

太陽傷寒方

計三十九方除重附

太陽兩傷方

計十方除重

尙論張仲景傷寒論太陽本經諸方

西昌喻昌嘉言甫著

黎川陳守誠伯常重梓

尙論諸方大意

仲景一百一十三方。用本草九十一種耳。仲景
上遡神農本經藥三百六十五種。効法周天三
百六十五度之數。應三才而合四時。妙義開天
也。仲景取述神農本經藥品。纔九十一種。入傷
寒論中。輔相裁成。有合六經之大綱者。有合六
經之一目者。蓋神農百病兼收。而仲景則由六

經以例百病。所以於上古本經取裁九十一種。用之不盡。萬世而後。星日炳然。聖之又聖者矣。梁陶隱君別錄。倍之爲七百三十種。迨唐本圖經證類。宋嘉佑政和旁搜編錄。於是旁門捷徑各自成名者多矣。而仲景宮牆生色。間出英賢數十輩。尤爲不孤。識大識小。總計一千七百四十六種。病雖百疾。藥無纖漏。天下後世永賴焉。然一千七百四十六種。顯現億兆。如問同一日昭式。乃至漸推漸廣。觀察盡矣。何獨仲景九十一種。賢哲挺生。莫識厥旨。昌也。晚進無識。手集神

農本經竊以傷寒論中藥品為主其晉唐以後諸賢發揮傷寒論全方有得者亦一一錄出而昌亦少步尙論諸方之後總欲門下好學隨證問藥一目瞭然無檢書之苦難是慰耳

太陽經風傷衛方

辨中風證用桂枝湯解肌大綱總法

桂枝湯方

桂枝 三兩去皮 味辛熱
芍藥 三兩味苦 酸微寒
甘草 二兩

炙味 其平
生薑 三兩切 味辛溫
大棗 十二枚 味甘溫

右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒

溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力
溫覆令一時許遍身熱熱微似有汗者益佳不可
令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服
不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促
役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服
周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不
出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪
臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者有汗
出音告惡寒淅淅惡風翕翕發熱宜桂枝湯

仲景原文

風之傷人也。頭先受之。故令頭痛。風在表。則表實。故令發熱。風爲陽氣。亦爲陽。同類相從。則傷衛外之氣。衛傷。則無以固衛津液。故令汗出。其惡風者。衛氣不能衛也。其脉緩者。衛氣不能鼓也。上件皆太陽症。故曰太陽中風。桂枝辛甘。辛則能解肌。甘則能實表。內經曰。辛甘發散。爲陽。故用之以治風。然恐其走泄陰氣。故用芍藥之酸。以收之。佐以生薑甘草大棗。此發散而兼和裏之意。是方也。惟表邪乃可用之。若陽邪去表入裏。裏作燥渴。二便秘結。此宜承氣之時也。而悞用之。則反矣。昌按承氣

之誤庸者固然。而工者悞在微細。仲景諄切不似此項逐條本文詳玩始獲。凡桂枝湯病症者常自汗出小便不數手足溫和。或手足指稍露之則微冷覆之則溫。渾身熱微煩而又憎寒始可行之。若病者無汗小便不數手足溫和或手足逆身冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也。脉緊必無汗有汗不可悞作桂枝症。此脈與症仲景說得甚明。後人看不透所以不敢用此方。假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也。尺脉弱名曰陰不足陽氣

下陷入陰中則發熱也。此謂元氣受病而然也。又
曰陽微則惡寒。陰微則發熱。醫既汗之。使陽氣微。
又大下之。令陰氣弱。此謂醫所使也。大抵陰不足。
陽往從之。故陽內陷而發熱。陽不足。陰往乘之。故
陰上入陽中則惡寒。舉此二端。明白易曉。何憚而
不用桂枝湯哉。

仲景治表虛。製此湯。桂枝味辛熱。發散助陽。體輕
本乎天者。親上。故桂枝爲君。芍藥甘草佐之。如陽
脉濇。陰脉弦。腹中急痛。乃製小建中湯。以芍藥爲
君。桂枝甘草佐之一。則治其表虛。一則治其裏虛。

故各有主用也。

以桂枝易肉桂。治傷寒腹痛。神品藥也。如夏中熱、腹疼、少加黃芩。去桂。痛立止。桂於春夏二時爲禁藥。

按經云。桂枝入咽。陽盛則斃。春夏發者爲禁藥也。桂能動血。血熱者爲禁藥也。木得桂而死。肝不足者爲禁藥也。

桂枝湯有禁用三法。仲景本文并昌論

汗後水氣上逆有禁更汗增滿一法。本文并昌論

中風病主用桂枝湯解肌和營衛七法。本文并昌論

或問桂枝湯發字之義曰一桂枝耳或云發汗或云當得汗解或云當發汗更發汗宜桂枝湯者數方是用桂枝發汗也復云無汗不得用桂枝又曰汗家不得重發汗又曰發汗過多者都用桂枝甘草湯是閉汗也一藥二用如何說得仲景發汗與本草出汗之義相通爲一答曰本草云桂味辛甘熱無毒能爲百藥之長通血脈止煩出汗者是調血而汗自出也仲景云藏無他病發熱自汗者此衛氣不和也又曰自汗者爲營氣和營氣和則外不諧以衛氣不與營氣和諧也營氣和則愈故皆

用桂枝湯調和營衛。營衛既和，則汗自出矣。風邪由此而解，非桂枝能於腠理發出汗也。以其固閉營血，衛氣自和，邪無容地而出矣。其實則閉汗孔也。昧者不解閉汗之意，凡是病者俱用桂枝湯發汗。若與中風自汗者合效，如桴鼓。因見其取効而病愈，則曰此桂枝發出汗也。遂不問傷寒無汗者，亦與桂枝湯，悞之甚矣。故仲景言無汗不得服桂枝，是閉汗孔也。又曰發汗多，叉手冒心，心悸欲得按者，用桂枝甘草湯，是亦閉汗孔也。又曰汗家不得重發汗，若桂枝湯發汗，是重發汗也。凡桂枝條

下言發字當認作出字。是汗自然出也。非若麻黃能開腠理而發出汗也。本草出汗二字上文有通血脉一句。是非三焦衛氣皮毛中藥是爲營血中藥也。如是則出汗二字當認作營衛和自然汗出。非桂開腠理而發出汗也。故後人用桂治虛汗。讀者當逆察其意則可矣。噫。神農作於前。仲景述於後。前聖後聖其揆一矣。

不解肌或悞汗。病邪入裏。用五苓兩解表裏二法。

一法水逆用之。多服煖水。汗出愈。

一法脉浮小便不利。微熱消渴者用之。

五苓散方

猪苓

十八銖
去皮

茯苓

十八銖

澤瀉

一兩
六銖

白朮

十八銖

桂

半兩

右五味爲散，以白飲和服，方寸匕，日三服，煖水汗出愈。

不解肌而悞發大汗，其變逆有救亡陽漏風二法。

一法真武湯

一法桂枝加附子湯

真武湯方

此本少陰經之神方，并加減法，而太陽上篇。

先錄之至太陽下篇尤宜緊要先同錄此

茯苓

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩切

白朮

二兩

附子

一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

桂枝加附子湯

於桂枝湯內加附子一枚餘依桂枝湯法

不解肌而用燒鍼取汗寒入核起灸核止變一法

桂枝加桂湯更加桂

於桂枝湯方內更加桂枝二兩

中風肌未解不可下宜用桂枝湯解外一法

桂枝湯

方見前

不解肌反悞下邪不服者於前下藥內更加桂枝湯一法

卽桂枝大黃湯之互詞因上衝陽位故兩解之也、不上衝者不用此方

不解肌反悞下心痞用溫補藥兩解表裏一法

桂枝人參湯

卽理中加桂枝而易其名也

桂枝

四兩
去皮

甘草

四兩
炙

白朮

三兩

人參

三兩

乾薑

三兩

右五味以水九升先煎四味取五升內桂枝更煮
取三升去滓溫服一升日再服夜一服

或問大柴胡瀉也桂枝人參湯補也何爲皆治下
利心下痞鞭曰此非裏熱乃下之早因作痞裏虛
協熱而利表又不解故與桂枝人參湯和裏解表
若夫傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利
者表和而裏病也以心下痞鞭故爲實當以大柴
胡下之二者心下痞鞭雖同而虛實之症有別故