

五更絲心解
四本二十二卷四
八種共十六本

金匱懸解卷十六

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

胸痺心痛短氣

胸痺心痛之病濁陰逆犯清陽責在肝腎之陰盛心肺之陽虛而其原總由於中氣之敗胃逆則濁陰不降脾陷則清陽不升是寒水凌火風木賊土之根本也陽宜降也陽中之濁氣宜降而清氣不宜降陰宜升也陰中之清氣宜升而濁氣不宜升濁陰升而清陽降則陽陷於下而陰填於上清虛冲和之位變而爲痞滿結鞭之所陰賊橫逆宮

城墳塞。君主失守。陽神奔敗。此胸痺心痛所由來也。失升
降之職。易陰陽之部。非緣中氣虧敗。何至於此。仲景於破
結開痺之中。而示人參一湯。所謂握要而警策者矣。

胸痺心痛

師曰。夫脈當取太過不及。陽微陰弦。卽胸痺而痛。所以然者。
責其極虛也。今陽虛知在上焦。所以胸痺心痛者。以其陰弦。
故也。

診脈當取其太過不及。以定虛實。寸爲陽。尺爲陰。寸旺於
尺。人之常也。寸微。是陽虛於上。尺弦。是陰盛於下。弦爲肝

脉應見於左關。尺弦者，水寒不能生木。木鬱於水而不升也。木不升，則脾必陷。肝脾所以升清陽。肝脾鬱陷，清陽不升，是寸之所以微也。陽不敵陰，則陰邪上犯，濁氣填塞。是以胸痺。宮城逼窄，是以心痛。所以然者，責其上焦清陽之極虛也。陽在上，今寸微陽虛，因知病在上焦。其上焦所以胸痺而心痛者，以其尺脉之弦也。陰氣盛而侵微陽，濁邪上而凌清位，故窒塞而不開，鬱衝而不宣也。此脈之不及而病虛者。

胸脾短氣二

平人無寒熱，短氣不足以息者，實也。

若夫平人。外無寒熱之表證。忽而短氣不足以息者。此必
隧道壅塞而不通。或有宿物阻格而不達。是實證也。實則
宜泄。當以行瘀開閉之方。除舊布新之法。排決菀陳。則氣
降而息順矣。脉之太過而病實者。

胸痺心痛短氣三

胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脉沈。而遲。關上小緊。
數苦。蘡薤白酒湯主之。

胸痺之病。凡喘息欬唾。卽胸背疼痛。短氣。喘促。寸口之脉。
沈而遲。關上之脉小而緊。數是中氣不通。濁陰上逆。氣道

痞塞而不通也。苦薑薤白白酒湯。苦薑滌瘀而清煩。薤白
白酒開壅而決塞也。

苦薑薤白白酒湯

百二十

苦薑實一
塢枚 薤白半觔 白酒七觔

右三味同煮取二升分溫再服。

胸痺心痛四

胸痺不得臥心痛徹背者苦薑薤白半夏湯主之。

胸痺不得臥心痛徹背者是陰邪上墳衝逼心宮而胸膈
痞塞氣無前降之路膈上莫容是以後衝於脊背也苦薑

薤白半夏湯苦蘷滌瘻而清煩薤白白酒半夏破壅而降逆也。

苦蘷薤白白酒半夏湯

百二十一

苦蘷實一枚搗薤白三兩白酒一斗半夏半觔

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺心痛五

胸痺心中痞留氣結在胸胸瀉下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之。參湯亦主之。

胸痺心中痞塞濁氣留結在胸胸膈壅悶脇下氣逆上搶

於心。是皆胆胃逆升。濁陰不降之故也。枳實薤白桂枝湯。

枳實薤白破壅塞而消痺結。苦薑桂枝滌濁瘀而下衝氣也。人參湯。參朮燥土而益氣。薑甘溫中而緩急。亦主之也。

枳實薤白桂枝湯

百二十二

枳實

四枚

厚樸

四兩

苦薑

一枚

薤白

半觔

桂枝

一兩

右五味以水五升先煮枳實厚樸取二升去滓內諸藥

煮數沸分溫三服

人參湯

百二十三

人參

三兩

白朮

三兩

甘草

三兩

乾薑

三兩

右四味以水八升煮取三升温服一升曰三服。

胸痺短氣六

胸痺。胸中氣塞。短氣。茯苓杏仁甘草湯主之。橘枳生薑湯亦主之。

胸痺。胸中氣塞。短氣。是土溼胃逆。濁氣痞塞。肺無降路。是以短氣。肺氣堙塞。則津液凝瘀。而化痰涎。茯苓杏仁甘草湯。杏仁利氣而破壅。芩甘補土而泄溼也。橘枳生薑湯。橘皮破凝而開鬱。枳薑泄滿而降濁也。

扶苓杏仁甘草湯

百二十四

茯苓三兩 杏仁五十枚 甘草一兩

右三味。以水一斗煮。取五升。温服一升。不差更服。

橘枳生薑湯百二十五

橘皮一觔 枳實三兩 生薑半觔

右三味。以水五升煮。取二升。分温再服。

胸痺七

胸痺緩急者。薏苡仁附子散。主之。

胸痺緩急者。水土溼寒。濁陰上逆。肺氣鬱阻。胸膈閉塞。證有緩急不同。而總屬溼寒。薏苡附子散。薏苡泄溼而降濁。

附子驅寒而破壅也。

薏苡附子散

百二十六

薏苡

十五兩
附子

十枚
炮

右一味。杵爲散。服方寸七。日三服。

胸痺心痛八

心中痞。諸逆。心懸。痛桂枝生薑枳實湯。主之。

心中痞塞。諸氣上逆。心懸作痛。以膽胃不降。胸膈鬱滯。阻
碍厥陰升路。衝擊作痛。桂枝生薑枳實湯。枳薑降濁而泄。
痞桂枝疏木而下衝也。

桂枝生薑枳實湯

百二十七

桂枝三兩 生薑三兩 枳實五枚

右三味。以水六升煮取三升。分溫三服。

胸痺心痛九

心痛徹背。背痛徹心。烏頭赤石脂丸主之。

寒邪衝逆凌逼心君。故心背徹痛。烏頭赤石脂丸。烏附椒
姜驅寒邪而降逆。赤石脂護心君而止痛也。

烏頭赤石脂丸

百二十八

烏頭一分 蜀椒二分 乾薑一兩 附子半兩 赤石脂一兩

炮

右五味末之蜜丸梧子大先食服一丸日三服不知稍加附方。

九痛丸

八

治九種心痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛並冷氣上衝落馬墜車等皆治之。

附子

三兩泡

巴豆

一兩去皮心熬研如脂

生狼牙

一兩炙香

吳萸

一兩炒

人參


一兩乾薑

一兩

三服弱者服二丸。

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三丸日

狼牙。瘡家敷洗之藥用之心痛方中甚屬無謂。去此一味換橘皮一兩減巴豆十分之七可也。



金匱懸解卷十七

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

腹滿寒疝宿食

腹滿寒疝。宿食病之相因者也。寒水風木之邪合而賊土。土溼脾陷。迫於風水之侵滯塞不通。是以脹滿所謂腎氣實則脹者。雖寒水之侮土。其中未嘗無木邪也。風木上鬱而尅溼土。則爲脹滿。風木下鬱而陷寒水。則爲疝瘕寒疝者。風木之下鬱於寒水而凝結者也。土之所以化穀者。火也。寒盛火衰。水穀不化。是謂宿食。宿食既停。壅遏中氣。變

虛而爲實。故宜攻下。攻下雖行。而其始實屬寒。因此三證悉以寒爲病本。總因於少陰之勝。趺陽之負也。

腹滿一

趺陽脉微弦。法當腹滿。不滿者必便難。兩胠疼痛。此虛寒從下上也。當以溫藥服之。胠音區。脇也。

趺陽。胃脉。在足趺上卽衝陽也。微弦者。肝膽之氣也。脉見微弦。則木邪剋土。戊土賊於甲木。胃逆而濁氣不降。法當腹滿。若不腹滿者。則甲木不賊於戊土。乙木必賊於己土。脾陷而清氣不升。法當便難。以脾陷肝鬱。不能行其疏泄之令。