

千金要方

附衍義

上海中原書局印行

治諸風方 凡八類

論雜風狀第一 論二十五首

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痲三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風邪得輕微人所不
悟宜速與續命湯依腧穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也 偏枯者半身不遂肌肉
偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫臥取汗益其不足損其有餘乃可復也取汗則經云溫則
風痲者身無痛四肢不收智亂不甚言微知則可治甚則不能言不可治 風懿者奄忽不知人咽中塞
室室然然源作意舌強不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後實於陽發其汗身轉輒者生
汗不出身直者七日死然源作意黑一赤吐沫者不可治 風痺濕痺周痺筋痺脈痺肌痺皮痺骨痺胞
痺各有證候形如風狀得脈別也脈微澀其證身體不仁 凡風多從背五臟輸入諸臟受病肺病最急
肺主氣息又冒諸臟故也肺中風者其人偃臥而胸滿短氣冒汗出者肺風之症也視目下鼻上兩邊
下行至口色白者尚可治急灸肺腧百壯服續命湯小兒減之若色黃者此為肺已傷化為血矣不可復
治其人常妄言撮空指地或自拈衣尋縫如此數日死若為急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少氣
微憊不能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺腧及膈腧肝腧數十壯急服續命湯可救也若涎
唾出不收者既灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄言與肺病相似然著緩可經久而死 肝中風者其
人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若唇色青面黃尚可治急灸肝腧百壯服
續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而死 心中風者其人但得偃臥不得傾
側悶亂胃絕汗出者心風之證也若唇正赤尚可治急灸心風百壯服續命湯若唇或青或白或黃或黑
者此為心已壞為水面目亭亭時悚動者不可復治五六日死一云旬 脾中風者其人但踞坐而腹滿

身通黃吐鹹汁出者尚可治急灸脾膈百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治 腎中風者其人
踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如餅桑大者尚可治急灸腎膈百壯服續命湯若齒黃赤鬚髮直面土
色者不可復治 大腸中風者臥而腸鳴不止灸大腸膈百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傷於陽陽
外先受之客於皮膚傳入於孫脈孫脈滿則入傳於絡脈絡脈滿則輸於大經中成病歸於六腑則為熱
不時臥止為啼哭其脈堅大為實實者外堅充滿不可按之按之則痛也經絡諸脈傍支去者皆為孫脈
也 凡風之傷人或為寒中或為熱中或為厲風或為偏枯或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以
夏丙丁傷於風者為心風以四季戊己傷於風者為脾風以秋庚辛傷於風者為肺風以冬壬癸傷於風
者為腎風風中五臟六腑之膈亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風風氣循風腑而上則為腦風
風入頭則為目風眼寒飲酒中風則為酒風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風久風入房中
風則為腸風外在腠理則為泄風故曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方焉是知風者善行
而數變在人肌膚中內不得泄外不得散因人動靜乃變其性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒
熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜為熱中目黃瘦人有風肌肉薄
則常外汗身中寒目淚出有風遇於虛腠理開則外出淒淒然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹管吹處
此是其證也有風遇於實腠理閉則內伏令人熱悶是其證也 新食竟取風為胃風其狀惡風頸多汗
膈下塞不通食飲不下脹滿形瘦腹大失衣則憤滿食寒即同泄新熱食竟入水自清及浴者令人大腹
為水病 因醉取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜渴近衣則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈
墮不欲自勞 新沐浴竟取風為首風其狀惡風而汗多頭痛 新房室竟取風為內風其狀惡風汗流
沾衣 風之為病法在腳下使人強上而目脫唾出若涕惡風而振寒候之三日及五日中不精明者
走也七八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻出為蓋若不出則傷肺 風邪客於肌膚虛癢成風疹瘙
不能發則磨癢喉痺苦緩不時服藥鍼灸風逐脈流入臟使人卒然昏厥從風發也

臟入形小浮於腑夢臟小形大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入臟寒氣客於山不能發則瘡癰瘰癧苦緩不時服藥鍼灸風逐脈流入臟使人卒然瘡緩縱嚙瘡致死風入陽經則狂入陰經則癲陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒 若因熱食汗浴通腠理得開其風自出則覺肉中如鍼刺步行運力欲汗亦如此也 凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出也宜解肌湯則善

夫目睜動口唇動偏喎皆風入脈故須急服小續命湯將八風散摩神明白膏丹參膏依經鍼灸之

諸痺由風寒濕三氣并客於分肉之間迫切而為沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮膚居分肉之間直氣不能周故為痺也其風最多者不仁則腫為行痺走無常處其寒多者則為痛痺其濕多者則為著痺冷汗濡但隨血脈上下不能左右去者則為周痺也痺在肌中更發更止左以應左右以應右者為偏痺也夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也 諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊也久痺入深令營衛滯經絡時疎則不知痛 風痺病不可已者足如履冰時如入湯腹中股脛淫漑煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷肝悲恐短氣不樂傷肺不出三年死云 太陽中風重感於寒濕則變瘧也瘧者口噤不開背強而直如發癰之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣息如絕汗出如雨時有脫易得之者新產婦人及金瘡血脈虛竭小兒臍風大人涼濕得瘧風者皆死溫病熱盛入腎小兒癰熱盛皆瘧瘧瘧瘧皆相似故久厥成癰宜審察之其重者患耳中策策痛皆風入腎經中也不治流入腎則喜卒然體瘳直如死皆宜服小續命湯兩三劑若耳痛腫生汁作癰癰者乃無害也惟風宜防耳鍼耳前動脈及風府神良

諸風第二方二十九首

小續命湯 治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗令人不虛方 麻黃 防己崔氏外臺不用人參 黃芩 桂心 白芍藥 甘草 川芎 杏仁各一兩 防風半兩

附子 一枚 生薑 五兩

右十二味咬咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫內諸藥煮取三升分三服

甚良不瘥更合三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人腳弱服此方至六七劑得瘥有風疹家天

陰節變輒合服之可以防瘡一本云恍惚者如茯神遠志如骨節煩疼本有熱者去附子倍芍藥金翼同深師古今錄驗有白朮不用杏仁救急無川芎杏仁止十味延年無防風

小續命湯

治中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜產後失

血并老小人 麻黃 桂心 甘草 生薑 五兩 人參 川芎 白朮 附子 防己 芍藥

黃芩 防風 半兩 右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服古方用附子 防己 芍藥 命湯 治千金翼同 ○又

方 治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所不及方 麻黃 三兩 人參 桂心 白朮 芍藥

甘草 防己 黃芩 川芎 當歸 各一 右十味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服日三覆取

汗

行義 續命方專為中風六經形證而立以其死生反掌較之傷寒尤為巨測益傷寒之邪卒然從表

而入非若中風皆由本虛虛風直犯無禁且多痰涎內壅表裏糾纏之難於分解也所以小續命湯雖

本古今錄驗而麻黃桂枝兩方皆在其中以其本虛必加人參駕馭麻桂發越在表之邪又需附子直

入少陰搜逐在裏之邪不使外內交攻正氣立斷續命之名信乎不虛其餘川芎黃芩防風防己不過

為麻黃之使以祛標熱耳 前方治卒中風欲死病起於暴故用麻黃必兼杏仁開發肺氣之逆滿殊

不可缺此見四肢緩急遺失便利脾腎兩虛故加白朮實脾隄水不得復用杏仁耗氣之品 又方治

風癩歷年不愈笑歌悲哭不常肺虛而風火乘之經謂精氣并於肺則悲笑歌則火之變非續命無以

療之以大柴肺燥非但附子耗陰當去防風杏仁耗氣亦須裁汰但加白朮以攝脾津不使復隨風火

外泄

大續命湯

治肝厲風卒然瘖瘓依古法用大小續命二湯通治五臟偏枯賊風方 麻黃 八兩 石膏 四

兩桂心 乾薑 川芎略二 當歸 黃芩名一 杏仁三十枚 荆瀝一升 右九味咬咀以水一斗先煮麻

黃兩沸掠去沫下諸藥煮取四升去滓又下荆瀝者數沸分四服能言未瘥後服小續命湯舊無荆瀝

今增之效如神軒金翼○又方 治大風經脈奄忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不自知方 獨活

麻黃略三 川芎 防風 當歸 葛根 生薑 桂心 茯苓 附子 細辛 甘草略一 右十二

味咬咀以水一斗二升煮取四升分五服老小半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方上氣

者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩啗者加橘皮二兩若胸中吸吸少氣者加大棗十

二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日已

後更候視病虛實早論之行湯行鍼依穴灸之○又方 治風前大續命湯同宜產婦及老小等方

麻黃 川芎略三 乾薑 石膏 人參 當歸 桂心 甘草略二 杏仁四十枚 右九味咬咀以水一

斗煮取三升分三服外臺名續命湯范注同云是張仲景方本欠兩味

西州續命湯 治中風痺入臟身體不知自收口不能言冒昧不識人拘急背痛不得轉側方 麻黃六

兩 石膏四兩 桂心二兩 甘草 川芎 乾薑 黃芩 當歸各一兩 杏仁三十枚 右九味咬咀以水一斗

二升煮麻黃再沸掠去上沫後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠臥可厚覆小汗出已

漸減衣勿復大覆可熟眠矣前服不汗者後復一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則

愈勿復服飲食如常無忌勿見風并治上氣咳逆若面目大腫但得臥服之太善凡服此湯不下者人

口噤其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服此湯若虛羸人但當稍與五合為佳有軼行此湯與

產婦及羸人喜有死者皆為煩服二升傷多且湯濁不清故也但得清澄而稍稍服微取汗者皆無害

也湖洽方古今錄驗大續命湯

衍義 大續命湯乃麻黃越婢麻杏甘石等方之製即於小續命湯中除去人參附子之助陽加入石

膏以化熱煎瀝以滌疾則大小續命虛實攸分於此顯然以無參附助陽之品則防已傷津之味亦宜

去之 又方即於大續命中除去杏仁乾薑石膏黃芩荆瀝仍取小續命中防風附子甘草而加細辛獨活葛根乃大續命之變法仍不出小續命之圭角 又方於大續命中除黃芩荆瀝仍取小續命中人參甘草是大續命而兼小續命之製也 於大續命本方但除去荆瀝一味即西州續命也張景岳曰按歷代相傳治中風之方皆以續命等方為主夫續命湯以麻黃為君與薑桂並用本發散外邪之方至小續命大續命西州續命則如黃芩以兼桂附雖曰相制而水火冰炭道本不同雖有神妙終非予之心 服者景岳為近代名宿究心靈素之學無出其右然於玉函金匱之旨猶虧一貫如小續命中之黃芩大續命中之石膏非具南陽千金神通妙用難以語此

大續命散

治八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或臥苦驚如

墮地狀盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五臟甚者恐怖見鬼來收攝或與鬼神交通悲愁哭泣忽

忽欲走方 麻黃 烏頭 防風 桂心 甘草 蜀椒 杏仁 石膏 人參 芍藥 當歸 蘭

茹川翼方作黃芩 茯苓 乾薑略一 右十五味治下篩以酒服方寸匕日再後加以知為度

續命者散

治風無輕重皆主之方 麻黃 川芎 獨活 防己 甘草 杏仁略三 桂心 附子

茯苓 升麻 細辛 人參 防風略二 石膏 五兩 白朮 四兩 右十五味粗篩下以五方寸匕納小

絹袋子中以水四升和生薑三兩煮取二升半分三服日日勿絕慎風冷大良吾常中風言語蹇澀四

肢痠重處此方日服四服十日十夜服之不絕得愈

衍義

大續命散與大小續命湯續命者散及排風湯大八風散小八風散總皆一脈相承主治八風

十二痺偏枯不仁悉屬風毒表證其卧如墮地狀盜汗臨事不舉則又腎氣本虧不出內經邪之所湊

其氣必虛一語所以搜逐風痺藥中多人參扶助胃氣度克有濟如大續命散與大小續命之製藥

皆彷彿獨簡如之除大風惡血蜀椒之逐骨節皮膚宛肌寒熱痺痛別出手眼大小續命之所未及續

命者散亦是大小續命發脈與大續命散相同者半惟升麻佐麻黃升散獨活佐防己下泄白朮佐參

附逐消變蘭茹蜀椒之法

排風湯 治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而臥其心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼吸喚其脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨其肺風發則面白咳逆吐膿血上氣奄然而極其腎風發則面黑手足不遂腰痛難以俯仰痺冷骨疼諸有此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目通臟腑悉主之 白鮮皮 白朮 芍藥 桂心 川芎 當歸 杏仁 防風 甘草各二兩 獨活 麻黃 茯苓各三兩 生薑四兩 右十三味㕮咀以水一斗煮取三升每服一升覆取微汗可服三劑

大八風湯 治毒風頑痺痺痺曳手脚不遂身體偏枯或痿弱不仁或風入五臟恍恍惚惚多語善忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊強直不得俯仰腹滿不食咳嗽或始遇病時卒倒悶絕即不能語便失音半身不隨不仁沉重皆由體虛特少不避風冷所致方 當歸二兩 五味子 升麻各一兩 烏頭黃芩 芍藥 遠志 獨活 防風 川芎 麻黃 秦艽 石斛 人參 茯苓各一兩 杏仁四十枚 黃芪 紫苑各一兩 石膏 甘草 桂心 乾薑各二兩 大豆一升 右二十三味㕮咀以水一斗三升酒二升合煮取四升強人分四服羸人分六服

行義 夫風虛濕冷足以傷人肢體亂人志意益八風之邪善行數變得濕以紐之則滯著不行經脈血氣無所不病故其治仍不出排風散邪猶如夏暑蒸得風氣流蕩則濕執隨之立散矣 大八風湯方下見證渾是濕著為患故於續命方中兼取大秦羌湯之製其妙用尤在黑大豆一味及和酒煮服為開發毒風脚氣之捷徑亦諒人元氣用藥之的訣

八風散 治八風十二痺瘰退半身不遂歷節疼痛肌肉枯燥皮膚瞤動或筋緩急痛不在一處卒起目眩失心恍惚忘言倒錯身上瘡癩面上起疱或黃黑角弓反張乍寒乍熱方 麻黃 白朮 羌活 二

黃芩五兩 大黃半斤 桔梗根 甘草 藥劑 天雄 白芷 防風 芍藥 天冬 石膏各十山

黃 食茱萸 躑躅各五 茵芋十四 附子三十 細辛 乾薑 桂心各五 雄黃 硃砂 丹參各六

右二十五味治下節酒服方寸七初每日一服三十日後日再五十日知百日瘥一年平復長服不已

佳先食服

小八風散 治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼喜怒悲憂煩滿顛倒色色短氣不得語語則失

忘或心痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復發熱惡聞人聲不知痛癢身悉振搖汗出猥退頭重

浮腫爪不知痛頸項強直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯癱瘓不得屈伸悉主之方 天雄 當歸

人參各五 附子 天冬 防風 蜀椒 獨活 烏頭 秦朮 細辛各四 白朮 乾薑各三 麻黃

五味子 桔梗 山萸 柴胡 莽草 白芷各二 右二十味治下節合相得酒服半方寸七漸至

全七日三服以身中覺如鍼刺狀則藥行也

行義 八風散主八風十二痺方中諸藥與膽腑門中羌花散考參萬病丸相類其方下雖有半身不

遂之證殊非中風六經形證之比詳其立方專以麻黃附子細辛湯開發陰邪於外大黃附子湯分泄

陰邪於裏而兼藥劑茵芋躑躅雄黃皆瞑眩之藥非大風惡疾詎可輕試必其人元氣素強病氣充

始為合宜 詳小八風散所治之證皆病久本虛邪實雖用麻黃附子細辛湯及理中三建等方之制

專守溫理正氣邪自退聽之法藥味雖峻而無藥劑茵芋躑躅大毒之味故以小八風散稱之

烏頭湯 治八風五尸惡氣遊走胸心流出四肢來往不住短氣欲死方 烏頭 芍藥 乾薑 桂心

細辛 乾地黃 當歸 吳茱萸 甘草各二 右九味以水七升煮取二升半分三服

行義 八風五尸之邪遊走心胸流出四肢往來不住雖非胸痺之著而不移其短氣欲死亦邪據胸

中與胸痺喘息咳唾心痛徹背背痛徹心無異苟非大辛大烈無以分解毒邪故訪金匱赤石脂丸而

用烏頭乾薑方開渾著佐以桂心細辛吳茱萸其裏溫散而兼芍藥當歸乾地黃護持營血甘草和胃并

和藥性之寒熱

耳散 治諸風方 當以五月五日午時乾地刈取耳葉洗曝燥搗下篩酒若漿服一方寸七日三
作散若吐逆可蜜為丸服十九進前計一方寸七數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌
出或如麻豆粒此皆為風毒出也可以鍼鍼刺清去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾之著大
甕中稍取用之此草辟惡若欲省病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿
心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七月九月九皆可採用

行義 耳一名蒼耳為頭風腦痛風濕周痺要藥其葉善辟惡氣開頂門行督脈專祛風濕毒邪服
後觸犯風氣遍身赤斑乃風毒發出之驗刺去黃汁乃止取五月五日者取惡毒之辰以辟惡毒之邪
也

治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁變急方

荆瀝 竹瀝格五 枸杞根白皮 麥冬格一 香豉二合

人參 茯苓 梔子仁 黃芩 川芎 桂心 細辛 杏仁 防風 白鮮皮格二 生薑 石膏

甘草格三 右十八味咬咀以水二斗和竹瀝荆瀝煮取三升分四服相去如人行六七里凡五劑間

三日服一劑一用防

治虛熱恍惚驚邪恐懼方

荆瀝三升 竹瀝二升 香豉三合 牛黃銖八 麥冬 人參格三 升麻 鐵精

天冬 龍齒 茯苓 梔子格二 右十二味咬咀以水二斗煮取三升去滓下牛黃鐵精更煎五六

沸取二升七合分五服溫服相去十里久

地黃煎 治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食冷補方

生地黃汁 枸杞根汁格二 生薑汁 酥格三

荆瀝 竹瀝格五 天冬 人參格八 茯苓六兩 大黃 梔子仁格四 右十一味搗篩五物為散先煎

地黃等汁成煎次內散藥攪和每服一七日再漸加至三七覺利減之○又方 黃芩 乾藍 芍藥

鼠尾草格三 梔子仁 生葛格六 羚羊角 豉綿裹 右八味咬咀以水七升煮取二升五合分三服

治積熱風方 地骨皮 萎蕤 丹參 黃芪 麥冬 澤瀉略 清蜜 薑汁略 生地汁一 右九味咬咀以水六升煮取二升去滓內生地汁更緩火煮減一升內蜜及薑汁又煮一沸藥成溫服三合日再

行義 八風之散多用辛烈治本而兼涼潤治標如小續命湯中之黃芩大續命湯大續命散續命煮散中之石膏大八風湯中之石膏黃芩八風散中之大黃必同麻黃或兼人參或兼烏附各具寒熱相參標本兼濟之妙用而此方及地黃煎並用荆瀝竹瀝潤燥開痰全不用麻黃烏附等味乃八風五痺之變法而實風虛發熱之正治也方中拘杞根麥門冬梔子豉黃芩石膏匡佐二瀝以散虛煩細辛挂心川芎白鮮皮杏仁防風以祛風熱人參甘草以助藥力茯苓以守真氣生薑以散穢惡之邪也 第二方中天棘麥冬梔子豉佐二瀝以清虛熱龍齒牛黃鐵精以鎮驚邪人參茯苓以守臟氣升麻以鼓人參之力也 地黃煎亦用杞根天棘而兼地黃乳酥佐二瀝以潤血燥梔子大黃以泄煩熱人參茯苓以助祛邪薑汁以辟痰涎之滯也 又方用梔子豉湯兼黃芩芍藥乾藍羚羊以解肝風蘊熱筋脈拘攣龍尾生薑以治心胃虛也 其治積熱風用地骨威蕤門冬澤瀉地黃皆清利風熱解散血痺之品黃芪治大風癰疾丹參治心腹邪氣清蜜即地黃煎中醍醐之意薑汁專行陰藥之性與地黃煎功用不殊

大防風湯 治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便利方 防風 當歸 麻黃 白木 甘草格

八黃參三十 乾地黃 山茱萸 茯苓 附子略 右十味咬咀以水九升煮取二升半一服七合

大小便利不利內大黃人參各十八銖太棗三十枚生薑三兩煮取三升分三服深師加天

行義 中風外有六經形證故用麻黃防風內有便溺阻隔故用地黃當歸腎主二便大小便利不利多

屬腎虛風燥故用木附為主加茯苓甘草則真武湯中之二也山茱萸本經治心下邪氣溫中逐寒濕痺去三蟲佐地黃則有酸收肝腎虛風之功黃芩本經治諸熱黃疸逐水下血閉佐麻黃則有解散肌

表風熱之用方後有大便不利內大黃然必兼人參而用者正以血虛風燥藉以助力而除邪氣大棗安中平胃生薑去臭氣通神明皆本經主治及專和營散表之法靡不萃聚於是方也

大戟洗湯 治中風發熱方 大戟 苦參 等分 右二味為末以藥半升白酢漿一斗煮三沸通寒溫

洗之從上下寒乃止立瘥小兒三指撮漿水四升煮洗之

〔行義〕中風發熱不止用大戟苦參為散者湯以滌肢體而祛毒邪專取大戟以治中風皮膚疼痛苦參以治結氣皆本經主治也

金牙酒 療積年八風五疰舉身痺曳不得轉側行步跛躄不能收攝又暴口喑失音言語不正四肢背

脊筋急腫痛流走不常勞冷精聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾胃不磨飲滯結實逆害飲食酢咽嘔吐

食不生肌醫所不能治者方 金牙 碎如米 地膚子 無子用莖 蘇 附子 防

風 細辛 莽草 略四 羌活 用獨活 蜀椒 四合 右十味咬咀以絹袋盛用酒四斗於瓷罈中清蜜閉

頭勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服一合此酒無毒及可小醉常令酒氣相接不盡

一劑病無不愈又令人肥健酒盡自可加諸藥各三兩惟蜀椒五兩用酒如前勿加金牙也冷加乾薑

四兩服此酒勝炙刺起三十年諸風痺曳神驗 附後備急用升麻乾薑各四兩參二兩石斛牛膝各

一兩用姜熬四兩黃芪三兩胡洽用川斷四 兩為十一味千金翼用茵芋四兩無莽草

常山太守馬濯酒 除風氣通血脈益精華定六腑聰明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十

日力勢倍六十日志氣充盈八十日能夜晝百日致神明房中強壯如三十時力能引弩年八十人服

之亦當有子病在腰膝藥悉主之方 天雄 二兩 商陸根 躑躅 蜀椒 各一 烏頭 一枚 附子 五枚 桂

心 白斂 茵芋 乾薑 各一 右十味咬咀以絹袋盛酒三斗清春夏五日秋冬七日去滓初服半

合稍加至兩三合搗滓為散酒服方寸七日三以知為度夏日恐酒酸以油單覆之下井中近水令不

酸也 桂心 為八味 千金翼無商陸

驚風酒 治久風枯攣三十年著床及諸惡風眉毛墮落方 乾地黄 獨活 丹參 礬石各一 麥冬

附子 甘草略 赤石脂半兩 乾薑 蕪荑 芫花 柏子仁各一 蘇子一升 茯苓一作金牙

薯蕷 白朮 杜仲 石南 牡荊 山萸 欬冬各半 白芷 烏喙 烏頭 人參 狼毒 蜀椒

防風 細辛 礬石 寒水石 牛膝 麻黃 川芎 當歸 柴胡 芍藥 牡蠣 桔梗 狗脊

翼作天雄 天雄略半 石斛 桂心略六 右四十五味咬咀以酒二斗清夏三日春秋六日冬九日一服半

合蜜室中合藥勿令女人六畜見之三日清齋乃合千金翼無川芎云加 又方 治八風十二痺偏

枯不隨宿食久寒虛冷五勞七傷及婦人產後餘疾月水不調皆主之方 礬石 桂心 白朮 狼

毒 半夏 石南 白石脂 龍膽 續斷 芫花 代赭 白石英 蘭茹 石葦 元參 天雄

山萸 防風 桔梗 藜蘆 卷柏 寒水石 細辛 烏頭 躑躅 蜀椒 白芷 秦艽 菖蒲

略一礬石 附子 遠志略二 石膏半兩 蜈蚣一條 右三十四味咬咀以酒二斗清四日服一合日

再十日後去滓曝乾搗篩為散酒服方寸匕日再以知為度 胡洽治四十二味無桂心細辛烏頭躑躅蜀

黃龍胡甘草羌活子藥紫苑各一兩杏仁三十枚同搗篩細而盛用酒二斗連黃連大黃附黃地

依藥酒法以藥袋置醱中春秋七日冬十日夏三日酒成服半雞子殼日三服藥為末酒服方寸七

魯王酒 治風眩心亂耳瞶目暗淚出鼻不聞香臭口爛生瘡風齒瘰癧喉下生瘡煩熱厥逆上氣胸脇

肩胛痛手不能上頭不能帶衣腰脊不能俯仰脚痠不仁難以久立八風十二痺五緩六急半身不遂

四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽塞哽哽不利或如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久久不治

入人五臟或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉

主之方 茵芋 烏頭 躑躅略半 天雄 防己 石斛略半 細辛 牛膝 甘草 柏子仁 通

草 桂心 秦艽 茵陳 山茱萸 黃芩 附子 瞿麥 乾地黄 王不留行胡洽作天冬 杜仲 澤瀉 石南 防風 遠志各三十 右二十五味咬咀以酒四斗清十日每服一合加至四五合以

知為度金翼名此為魯公酒有乾薑胡洽無防己以絹囊試藥用水二升法麵二斤同又方治

風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢不遂不能行步不自帶衣攀急五緩六急婦人帶下產乳中風

五勞七傷 乾薑 躑躅 桂心 甘草 川芎 川斷 細辛 附子 秦艽 天雄 石膏 紫

苑各五葛根 通草 防風 柏子仁 巴戟天 石斛 石南 山萸 石龍芮各四牛膝 天冬

兩各一烏頭各二十蜀椒半斤 右二十五味咬咀以水五升清三宿法麵一斤合清黍米二斗合釀三宿

去滓炊糯米一斗醞三宿藥成先食服半合日再待米極消盡乃去滓曝乾末服

獨活酒 治八風十二痺方 獨活 石南各四防風三兩附子 烏頭 天雄 茵芋各二 右七味

咬咀以酒二斗清七日每服半合日三以知為度

行義 金牙酒行義見前七卷風毒脚氣門中 其馬灌酒藥夷酒魯王酒獨活酒等方皆治厲風惡

疾大毒瞑眩之方非中風門中藥也

灸法

扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大趾下橫文隨年壯立愈 若筋急不能行者內踝筋急灸

內踝上四十壯外踝筋急灸外踝上二十壯立愈 若眼戴睛上插灸目兩眥後二十壯 若不能語灸

第三椎上百壯 若不識人灸季脇頭七壯 若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯灸卒

死亦良 治久風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不遂或口噤不言涎唾自出目

閉耳聾或身冷直或煩悶恍惚喜怒無常或唇緩失音聲啞角弓反張始覺發動即灸神庭一處七壯穴

在印堂直上髮際是 次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是 次灸上關二處各七壯一

名客主人穴在耳前起骨上廉陷者中是 次灸下關二處各七壯穴在耳前下廉動脈陷者中是 次

灸頰車二穴各七壯穴在曲頰陷者中是 次灸廉泉一處七壯穴在當頭直下骨後陷者中是 次灸

咽會一處七壯穴在神庭上二寸是 次灸百會一處七壯穴在當頂上正中中央是 次灸本神二處各

七壯穴在耳正直上入髮際二分是四辨次灸天柱二處各七壯穴在項後兩大筋外入髮際陷者中
 是次灸陶道一處七壯穴在大椎節下間是次灸風門二處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸半
 是次灸心膕二處各七壯穴在第五椎下兩傍各一寸半是次灸肝膕二處各七壯穴在第九椎下
 兩旁各一寸半是次灸腎膕二處各七壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半是次灸膀臑膕二處各
 七壯穴在第十九椎下兩傍各一寸半是次灸曲池二處各七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之
 是次灸肩髃二處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是次灸支溝二處各七壯穴在手腕後
 臂外三寸兩骨間是次灸合谷二處各七壯穴在手大指虎口兩骨間陷者中是次灸間使二處各
 七壯穴在掌後三寸兩筋間是次灸陽陵泉二處各七壯穴在膝下外尖骨前陷者中是次灸陽輔
 二處各七壯穴在外踝上絕骨端陷者中是次灸崑崙二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者中是
 治風灸上星及百會各二百壯前項二百四十壯腦戶及風府各三百壯百會治大風灸治百種風灸
 腦後項大椎平處兩廂量二寸三分須取病人指寸量兩廂各灸百壯得瘥治風耳鳴從耳後量八分
 半裏許有孔灸一切風得瘥狂者亦瘥兩耳門前後各灸一百壯治卒病惡風欲死不能語及肉痺不
 知人灸第五椎名曰臑膕百五十壯多至三百壯便愈心膕穴在第五椎一云第七節對心橫三間寸
 主心風腹脹滿食不消化吐血酸削四肢羸露不欲飲食鼻衄目眴眈眈不明眉頭脇下痛小腹急灸二
 三百壯大腸膕在十六椎兩邊相去一寸半主風腹中雷鳴腸癖泄利食不消化小腹絞痛腰脊疼痛
 或大小便難不能飲食灸百壯三日一報腋門在腋下攢毛中一寸名太陽陰一名腋間灸五十壯主
 風絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩足脛疼

賊風第三論一首 方二十九首
灸法六首

桂枝酒 治肝虛寒卒然瘖瘓不聲踞坐不得面目青黑四肢緩弱遺矢便利厲風所損方 桂枝 芍
 藥 獨活 牛膝 薯蕷 甘草和 附子一兩 防風 茯苓 天雄 茵芋 杜仲 蒺藜根 白

合日二加至五六合

肝虛卒犯厲風面青肢緩乃肝之本病至於瘡癰便失又為腎臟氣衰不能統攝上下之兆方

肝風古候其口不能言

當鼻下人中次灸大椎次灸肝腧第九椎下是五十壯餘處隨年壯眼暗灸

之得明二三百壯良

大定心湯

治心氣虛悸恍惚方見十六卷小腸腑中

乾薑附子湯

治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪方

乾卦

附子兩各八

桂心

麻黃

芑窮三兩

右五味咬咀以水九升煮取三升分三服三日後服一劑

衍義

方下雖言心虛而實少火氣衰不能代天宣化故用乾薑附子湯峻補命門之陽兼挂心助薑

附益火消陰腎柔有權則麻黃得以振發表之力心主血焉勞既能治風又能和血觀本經有中風入

腦頭痛寒痺筋攣緩急之治功用可知

側子酒

治心寒或笑或呻口欬方

行義

側子酒方藥味雖宜而方下主治不類未審是否

芍藥湯

治卒中風四肢不仁善笑不息方

芝翳半黃苓

石膏黃連當歸

秦苑

麻黃

桂心

乾薑

甘草兩各

杏仁
一二枚

右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服

行義 卒中風四肢不仁善笑不息土困木乘心火熾然之象乃重取麻黃越脾麻杏甘石之製專以乾薑實脾杜風麻黃開肺泄熱石膏清胃化火具列鼎分之勢餘藥各隨寒熱佐使標本兼該此長沙密諦真銓不覺為之吐露奈何千載塵埋能不為之心折

荆瀝湯 治心虛寒陰氣傷寒損心驚悸悸語聲實急混濁口喝胃味好自笑厲風傷心方 荆瀝三升

母薑取汁麻黃 白木 芎藭防風 桂心 升麻 茯苓 遠志 人參 羌活 當歸防己 甘草防己 右十五味以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下諸藥煮取三升去滓下荆瀝薑汁煎取四升分四服日三夜一

行義 荆瀝湯雖用荆瀝清火滌痰為君薑汁開導經絡為佐全賴參甘維持胃氣運行藥力挂心鼓動於中麻黃開發於外升麻提繫於上防己引泄於下遠志通達心經又以苓不匡佐人參羌活防輔弼麻黃歸協濟挂心統攝荆瀝母薑共襄滌痰祛風活血之功所謂治風先治血血行風自滅也

白木酒 補心志定氣治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧其疾源厲風損心具如前方所說無窮

白木 切地骨皮 荆實格五 菊花三升 右四味以水三石煮取一石五斗去滓澄清取汁釀米二石用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令至吐

行義 此又荆瀝湯之輔助白木治風寒濕痺地骨皮治五內邪氣周痺風濕荆實治筋骨間寒熱濕痺拘急菊花治諸風頭眩腫痛惡風濕痺詳千金取用藥性不出本經主治

治心風寒方 炙心脬各五十壯第五節兩邊各一寸半是

依源麻黃湯 治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦語音沉澁如破鼓聲舌強不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉身重如山便利無度方見別

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮噎喜無度昏悶恍惚脹滿方 半夏 大麻仁熟研 生薑格一芍藥 茯苓 五味子 桂心 橘皮各三 白木四兩 附子四兩 甘草二兩 大棗三十 右十