

葉天士著
女科證治秘方

上海千頃堂書局印行

葉天士先生著

女科證治祕方

上海千頃堂書局印行

R271.1
24

標商局書堂項干



葉氏女科證治目錄卷一

調經上總目

月經先期

月經後期

月經或前或後

月經愆期

過期經行

形瘦經不調

形瘦過期經行

形肥過期經行

一月經再行

每月經來二三次

經來不止

數月行經

經來色紫

經來色淡

形瘦經少

形肥經少

經來過多

經來如猪肝水

經來如屋漏水

經來如黃泥水

經來如銅綠水

經來全白色

經來如白薤色

經來臭如腐肉

經來如魚腦髓

經來如牛膜片

經來下肉胞

經從口鼻出

逆經咳嗽氣急

經從大小便出

經來吊陰痛

經來小便痛

經來脇氣痛

經來遍身痛

經前腹痛

經來腰腹痛

經來小腹痛

經來未盡腹痛

經來潮熱氣痛

經來盡後作痛

經後腹痛

經來嘔吐

經來飲後即吐

經來浮腫

經來泄瀉

經來常咳嗽

經來下白蟲

經來吐蛇蟲

經來潮熱不食

經來傷寒厥冷

經來狂言譫語

經前經後痢疾

熱入血室

石瘕證治

血結成瘕

腸覃證治

調經下總目

十三四歲經證

十五六歲經證

十七八歲經證

十九二十歲經證

廿一二歲經證

廿三四歲經證

廿五六歲經證

廿七八歲經證

廿九三十歲經證

三一二歲經證

三三四歲經證

三五六歲經證

三七八歲經證

三八九歲經證

四十一歲經證

四二三歲經證

四四五歲經證

四六七歲經證

四七八歲經證

四九五十歲經證

五旬後經證

心虛經閉

脾虛經閉

形肥痰熱經閉

形肥痰滯經閉

形瘦血鬱經閉

形瘦血熱經閉

過食生冷經閉

房事觸傷經閉

性急多怒經閉

氣鬱血滯經閉

經閉浮腫

經閉腹大如鼓

室女經閉浮腫

室女經閉脹痛

室女實熱經閉

室女虛熱經閉

室女經閉腹痛

室女經閉勞嗽

室女經閉骨蒸

師尼室寡經閉

婦女失志經閉

崩漏標本證治

崩漏虛實證治

崩漏不止證治

鬱氣崩漏

腎虛崩漏

怒後崩漏

崩久不止

久崩成漏

崩後下白帶

漏下不止

殺血心痛

帶下虛熱

赤白帶下證治

瘦人赤帶多熱

肥人白帶多痰

白帶腥臭

白帶腹痛

白注證治

白濁證治

葉氏女科證治卷一

調經上

月經先期。經以月至為常。若陽太過而月經趨前。一月忽早。一月則其形色多赤。或紫而濃。其藏氣飲食喜冷畏熱。乃為血熱。如證挾痰火。宜服加味調經丸。

加味調經丸

香附五斤分作五股以酒醋鹽湯童便米泔各浸三日乃用原汁煮乾再用葱五斤取白細切并香附焙乾以葱白香黃為度當歸 白芍 生地黃

各四兩

黃連 黃芩

各三兩

川芎 杏仁

柴胡各二兩 白芷二兩

青皮五兩 荆芥

滑石水飛

兩五

共為末醋麵糊丸空心白湯下

月經後期。婦人以血為主。惟能謹於調護。則氣血周流。月水自然如期。若陰不足而月經退後。一月忽

遲一月。則其形色不鮮。或凝滯而少。其藏氣惡寒喜煖。宜服正經養血湯。

正經養血湯

白芍酒炒 當歸酒洗 茯苓 白朮蜜炙 阿膠蛤粉炒 五味子 川椒炒 甘草蜜炙

錢

半夏薑汁

人參各七錢 柴胡分 薑三片水煎食前服如五心煩熱日晡發熱加胡黃連分 不

思飲食加神麩麥芽炒各五分 頭痛加川芎炒

月經或前或後。脾土不勝。不思飲食。由此血衰。故月水往後。或次月飲食多進。月水又往前矣。治宜理

脾脾旺則血勻氣順自然應期宜用紫金丸

紫金丸

青皮 陳皮各五錢 蒼朮 檳榔 砂仁 紅豆各六錢 良薑 烏藥 香附各八錢 三棱一兩

蓬朮二兩

枳殼炒 共為末粳米糊為丸食後米湯下百丸一方無倉朮蓬朮香附

月經愆期。經來或前或後。名曰愆期。此由脾胃虛弱。衝任損傷。氣血不足。宜服加減八物湯。兼服調經

烏雞丸

加減八物湯 人參錢三 白朮 茯苓 甘草各五錢 白芍 當歸身 陳皮 香附 牡丹皮各一錢

水煎食前服

調經烏雞丸 白毛烏骨未鍛雄雞一雙約重一斤以糯米喂養七日勿令食蟲蟻以繩縊死乾撻其毛去肚內雜臟不用納生地黃熟地黃天門冬麥門冬各二兩於雞肚內以好酒十碗丈火煮爛取出肚內藥將雞連骨用桑柴火焙乾仍以前者過生地黃等藥酒又浸又焙至雞骨內枯為度研極細末再用人參銹肉從容酒洗破故紙炒砂仁當歸身白朮川芎丹參茯苓甘草各一兩杜仲鹽水炒香附米醋製共為細末入雞骨末和勻酒麵糊丸空心米湯下五十丸

過期經行。婦人德性溫和而有痰而過期經行此氣血兩虛也宜服八物湯如性躁多怒而過期經行亦氣血虛也宜服八物湯加青皮香附兼服蒼附丸

八物湯 人參 茯苓 白朮 甘草各錢 熟地黃 當歸 川芎 白芍各錢 薑三片棗二枚水

煎服如性燥者加青皮香附

蒼附丸 蒼朮二兩 香附三兩重 條芩一兩 共為末神麴糊丸白湯下

形瘦經不調。形瘦多熱致經不調素無他症此水虧血少燥溢而然宜服加味四物湯

加味四物湯 熟地黃 當歸 白芍 川芎 黃芩 黃連 黃柏酒炒各一錢 甘草五錢 水煎空心服

形瘦過期經行。形瘦素無他症而過期經行者此氣血不足也宜服十全大補湯如食少而脾胃虛弱

過期經行者此氣衰血少也宜服異功散合芎歸湯兼服地黃丸

十全大補湯 人參 白朮 茯苓 甘草各錢 黃芪 肉桂 熟地黃 白芍 當歸 川芎 薑三

片棗二枚水煎服

異功散 人參 茯苓 白朮 陳皮 甘草 炙 薑棗為引食前服

芎歸湯 當歸身 川芎 香附 枳殼 銼炒 滑石錢 薑為引

地黃丸 熟地黃 兩四 山藥 山茱萸 兩各二 牡丹皮 茯苓 各一兩 澤瀉 香附 量便製

形肥過期經行○形肥飲食過多而過期經行者此溼痰壅滯軀脂逼迫也宜服六君子湯合芎歸湯

六君子湯 人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮 半夏

芎歸湯 當歸身 川芎 香附 枳殼 銼炒 滑石錢 薑棗為引空心服

一月經再行○性躁多氣傷肝而動衝任之脈宜服九味四物湯兼服滋陰丸如誤食辛熱藥物致經再

行亦用九味四物湯更服三補丸

九味四物湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍 人參 柴胡 黃芩 黃連 甘草 水煎空心服

滋陰丸 知母 黃柏 等分蜜丸滾湯下

三補丸 黃芩 炒酒 黃柏 炒酒 黃連 炒酒 蜜丸滾湯下

每月經來二三次○經來幾點而止過五六日或十日又來幾點一月之內常行二三次面色青黃先服

膠艾湯一二劑次服紫金丸

膠艾湯 阿膠 白芍 熟地黃 各一錢 艾葉 三錢 川芎 八分 大棗 三枚 水煎空心服

紫金丸 青皮 廣皮 各五錢 蒼朮 檳榔 砂仁 紅豆 銼六錢 良薑 烏藥 枳殼 香附 銼八錢

三稜 兩一 蓬朮 兩一 粳米糊丸食後米湯下百丸 一方無蓬朮蒼朮香附

經來不止○經來十日半月不止乃血熱妄行也當審其婦曾喫椒薑熱物過度治之猶易宜用金狗湯

金狗湯 金毛狗脊 川續斷 阿膠 地榆 川芎 當歸 白芷 銼一錢 白芍 黃芩 銼八錢 熟地

黃錢 水煎空心服

數月行經。形盛多痰氣虛至數月而經始行者宜服蒼附六君湯兼服蒼附導痰丸若形瘦脾胃虛弱

氣血兩虧至數月而經始行者宜服十全大補湯

蒼附六君湯 人參 白朮 茯苓 甘草 炙 半夏 陳皮 蒼朮 浸米汁 香附 童便 條芩 酒 川

芎 當歸 枳殼 煨 水煎食前服

蒼附導痰丸 蒼朮 香附 枳殼 各二 陳皮 茯苓 各一兩 膽星 甘草 各一 共為末薑汁和

神麵丸淡薑湯下

十全大補湯 人參 白朮 炙 茯苓 甘草 炙 熟地黃 當歸 川芎 白芍 黃芪 炙 肉桂

薑棗為引

經來色紫。經來色紫者熱也慎勿作風冷而行溫熱之劑宜服四物連附湯

四物連附湯 當歸尾 赤芍 香附 童便 黃連 丹皮 甘州 水煎食前服

經來色淡。經來色淡者血虛也宜服加味八物湯兼服地黃丸

加味八物湯 人參 白朮 炙 茯苓 甘草 炙 熟地黃 當歸 川芎 白芍 各一錢 黃芪 炙

香附 四製各一錢 薑為引水煎服

地黃丸 熟地黃 兩 山藥 炒 山茱萸 各二 丹皮 白茯苓 各一兩 澤瀉 香附 童便 製

形瘦經少。形瘦經少此氣血弱也宜服加味四物湯

加味四物湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍 人參 香附 童便 甘州 炙 薑棗為引

形肥經少。形肥經少此痰凝經隧也宜服二陳湯合歸湯

二陳湯 陳皮 半夏製各二錢 茯苓 炙甘草各一錢

芎歸湯 川芎 當歸身 香附童便製 枳殼各一錢炒 滑石二錢 薑為引合二陳湯水煎服

經來過多○經多不問形肥形瘦皆屬於熱宜服增味四物湯兼服三補丸或單服增味四物湯亦可

增味四物湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍各一錢 黃芩 知母酒炒 黃連 薑汁 黃柏酒炒 甘草各五錢

薑為引水煎服

三補丸 黃芩酒炒 黃柏酒炒 黃連 蜜丸白湯下

經來如猪肝水○經來如猪肝水五心煩熱腰腹疼痛面黃肌瘦不思飲食此氣血皆虛也先用黃芩湯

退其煩熱後用調經丸調其氣血

黃芩湯 黃芩六分 當歸錢一 川芎八分 天花粉 知母酒炒 蒼朮 白芍各七分 水煎服一方無蒼朮白芍有甘草七分

調經丸 生地黃 熟地黃 當歸 白芍 三稜 蓬朮 玄胡索 白茯苓各一兩 川芎 砂仁

烏藥各八錢炒 香附二兩 大茴 小茴各二兩 共為末粳米糊丸如梧子大每服百丸酒下

經來如屋漏水○經來如屋漏水頭昏目眩小腹作痛更兼白帶咽中臭如魚腥惡心吐逆此血虛有熱

也先用理經四物湯次用內補當歸丸

理經四物湯 川芎 當歸 白芍 生地黃 白朮蜜炙 柴胡 香附童便製 玄胡索絡一 黃芩

三稜各八錢 水煎臨臥服

內補當歸丸 續斷 阿膠炒 蒲黃黑炒 肉苁蓉酒浸 厚樸薑汁炒 山茱萸 白茯苓 香附童便製

當歸 白芷各一兩 川芎 白芍各八錢 甘草炙 乾薑各五錢 熟地黃一兩五錢 共為末鍊蜜為丸

白湯下八十丸空心服

經來如黃泥水。此大虛證也。最忌涼藥。宜用加味四物湯以煖其經。以和其血。

加味四物湯 川芎 當歸 玄胡索 烏藥各一錢 白芍酒炒 小茴各八分 熟地黃錢 生薑二錢 水

煎空心服

經來如銅綠水。經來全無紅色。乃大虛大冷也。忌用涼藥。宜服烏雞丸。半月非特病愈。且有孕。

烏雞丸 烏雞肉去皮油不用 山藥炒 肉桂 肉苁蓉酒洗 蒲黃炒 當歸 山茱萸 白芍

各一 熟地黃五錢 大附子三錢 鹿茸一錢 川芎五錢 共為末。粳米糊丸。空心酒下百丸。

經來全白色。經來白色。五心煩熱。小便作痛。面色青黃。乃血氣虛也。亦忌涼藥。宜服烏雞丸。方見前 半月

即有孕

經來成塊如葱白色。經來成塊如葱白色。或如死猪血。黑色頭昏目暗。口唇麻木。此虛冷也。藥忌寒涼。

急服內補當歸丸

內補當歸丸 續斷 阿膠炒 蒲黃炒 肉苁蓉酒洗 厚樸薑汁 山茱萸 白茯苓 香附高便

當歸 白芷各一兩 川芎 白芍各八分 甘草 乾薑各五錢 熟地黃二錢 共為末。鍊蜜丸。空心白

湯下八十丸

經來臭如腐肉。此乃血弱更傷熱物。譬如溝渠水乾。天氣無雨。久則臭也。身衰舊血少。新血不生。則臭。

如夏月腐肉。宜服龍骨丸。兼服通瘀飲。

龍骨丸 龍骨煨 海螵蛸 生地黃各一兩 白芍 當歸酒炒 牡蠣粉 川芎 黃芩 白茯苓各

錢 共為末。鍊蜜丸。空心酒下百丸。

通瘀飲 當歸酒炒 三棱 莪朮 赤芍 丹皮 白朮蜜炙 香附童便 猪苓 陳皮 木通各八分

生薑片 水煎服

經來如魚腦髓。經來如魚腦髓雙脚疼痛不能舉動乃下元虛冷更兼風邪所致當行血行氣宜服甦風止痛湯

甦風止痛湯 天麻 殭蠶炒 紫金皮 烏藥炒 牛膝 獨活 川芎 當歸 乳香去油 南藤

補骨脂炒 生薑片三 葱白二 酒煎空心服

經來如牛膜片。經來不止兼下物如牛膜片昏迷倒地乃血氣結聚變成此症雖驚人却無大事宜服朱雄丸

朱雄丸 硃砂飛水 雄黃絡一 白茯苓兩 共為末水丸薑湯下五十丸

經來下肉胞。經來不止忽下肉胞三五個狀如雞子大軟如絮用刀剖開內如石榴子昏迷不省人事症亦驚人宜服十全大補湯五劑即安

十全大補湯 人參 白朮 茯苓 甘草 熟地黃 當歸 川芎 白芍 黃芪炙 肉桂 薑三片棗二枚溫服

經從口鼻出。經不往下行而從口中出名曰逆經此由過食椒薑辛熱之物熱傷其血則血亂上行宜服犀角地黃湯數劑

犀角地黃湯 犀角 白芍 牡丹皮 枳殼各一錢炒 生地黃三錢 黃芩 桔梗 陳皮 百州霜各八分

甘草三 水煎空心服

逆經咳嗽氣急。經從口鼻出五心煩熱咳嗽氣急治宜推血下行先服紅花湯七劑再服欬冬湯止嗽下氣四五劑可安

紅花湯 紅花 黃芩 蘇木各八分 天花粉六分 水煎空心服

欬冬湯 桔梗 粟殼炙 蘇子炒 紫苑 知母各八分 石膏 桑白皮炙 杏仁各一錢 水煎溫服

經從大小便出。經來大小便俱出名曰差經。此因食熱物過多積久而成。宜解其熱毒。順其陰陽。宜

服分利五苓湯

分利五苓湯 猪苓 澤瀉 白朮炙 赤芍各一錢 阿膠炒 當歸洗 川芎各八分 水煎空心服

經來吊陰痛。經來有兩條筋從陰吊至兩乳痛不可忍。身上發熱。宜服川棟湯二劑即安

川棟湯 川棟子炒 大茴 小茴 猪苓 澤瀉 白朮各一錢 烏藥炒 檳榔 乳香各一錢 玄胡

索各八分 木香各五分 麻黃六分 薑三片 葱二根 水煎服

經來小便痛。經來小便痛如刀割。此乃血門不通。人皆用八珍散不效。急服牛膝湯

牛膝湯 大牛膝兩三 麝香一分 乳香一錢 水一盞半 煎牛膝至一盞 臨服磨麝乳二香入內

經來脇氣痛。經來脇內有一塊如杯作痛。其血淡黑色。宜治塊為先。急服四物玄胡湯

熟地黃 當歸 白芍 川芎各七錢 玄胡索兩四 沈香錢五 每服三錢 水煎服

經來遍身痛。經來二三日遍身疼痛。此寒邪入骨。或發熱或不發熱。俱已解表。服烏藥順氣湯

烏藥順氣湯 烏藥炒 川芎 白芷 陳皮 枳殼各八分 乾薑炒 甘草各五 殭蠶炒八分 麻

黃分四 薑三片 葱二根 水煎溫服

經前腹痛。經水將來而臍腹絞痛。此血滯不行。以作痛也。宜服通經湯

通經湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍 川棟子炒 小茴香 檳榔 玄胡索 木香各七 水煎

食前服

經來腰腹痛。經來腰腹痛而氣滯無實者宜服桃仁湯

桃仁湯 當歸尾 赤芍 生地黃 香附童便 牡丹皮 紅花 玄胡索 桃仁泥搗服

水煎臨服時入桃仁泥空心服 形瘦有火加條芩黃連 形肥多痰加枳殼蒼朮半夏

經來小腹痛。經來小腹痛結成塊或如皂角一條橫過痛不可忍面色青黃不思飲食宜服玄胡散半月

可癒

玄胡散 玄胡索四兩 頭髮四錢 為末酒調下

經來未盡腹痛。經來一半餘血未盡腹中作痛或發熱或不發熱乃氣血俱實也宜服紅花當歸湯破

其餘血而熱自止

紅花當歸湯 紅花 當歸 牛膝 蘇木各一錢 川芎五錢 枳殼六分 莪朮 赤芍 三稜 芫花

各八分 水煎臨卧服

經來潮熱氣痛。經來一半遍身潮熱頭痛口渴小便作痛此因傷食生冷故血滯不行內有餘血忌服

補劑宜服莪朮湯

莪朮湯 莪朮 三稜 紅花 蘇木 牛膝 水煎空心服

經來盡後作痛。經盡作痛手足麻痺乃腹中虛冷也血虛衰甚者宜服四物湯加吳茱萸煨湯一錢

四物湯 熟地黃 當歸各三錢 白芍二錢 川芎一錢 薑棗為引水煎服

經後腹痛。經後腹痛此虛中有滯也宜服加味八珍湯

加味八物湯 人參 白朮蜜炙 茯苓 甘草炙 熟地黃 當歸 白芍 川芎 木香 香附童便

青皮 薑棗為引水煎食前服

經來嘔吐。經來時常嘔吐不思飲食宜服丁香散半月方癒

丁香散 丁香 乾薑各五 白木一錢 為末每晨米湯調下三匙

經來飲食後即吐。此因痰在胸膈阻隔米穀不能下胃急服烏梅丸化其痰涎後服九仙奪命丹

烏梅丸 硃砂水飛 雄黃水飛 木香各五 礞砂 乳香去油 沒藥各一錢 草果個 胡椒 綠豆各三

十五粒 共為末烏梅肉丸如楊梅大每服含化一丸

九仙奪命丹 豆豉 木香 陳皮 山查各一 草果個 枳殼燉 白茯苓 厚朴薑製 蒼木各三錢

共為末薑湯調下

經來浮腫。經來遍身浮腫此乃脾土不能剋化水變為腫宜服木香調胃湯

木香調胃湯 木香 陳皮 車前子 甘草 三棱 莪木 紅豆 大腹皮 砂仁 蒼朮 木通

山查 萆薢 薑皮 水煎空心服

經來泄瀉。經來之時五更泄瀉如乳兒尿此乃腎虛不必治脾宜服理中湯七劑

理中湯 人參 白木各八分 五味子 甘草各三 乾薑分五 水煎空心服

經來常咳嗽。經來時常咳嗽名曰血咳此肺燥金枯也急用茯苓補心湯止其嗽再用雞蘇丸除其根

茯苓補心湯 茯苓 川芎 當歸 白芍 生地黃 蘇葉 人參 前胡 陳皮 乾葛 甘草

半夏製 桑皮 桔梗 枳實 生薑片 水煎空心服

雞蘇丸 川貝母兩 蘿蔔子升 共為末蜜丸滾湯下五十九丸空心服

經來下白蟲。經來血内有白蟲形似雞腸滿肚疼痛先用追蟲丸通其蟲於大便而出後用建中散補

之

追蟲丸 大黃兩 續隨子 檳榔 牽牛 大戟各五錢 芫花錢一 麝香分五 為末麵糊丸如圓眼核

大每服一丸酒下

建中散 黃芪錢五 肉桂 甘草各五錢 白芍兩一 為末白湯調下

經來吐蛇蟲。經來寒熱四肢厥冷大汗不止嘔吐蛇蟲痰氣緊滿百無一生不治之症也

經來潮熱不食。經來胃氣不開潮熱旬日不思飲食當以開胃為先宜服鴨血酒

鴨血酒 白鴨一隻 用銅刀取血調熱陳老酒服

經來傷寒厥冷。經來誤食生冷忽然作渴遍身潮熱痰氣急滿惡寒四肢厥冷名曰觸經傷寒急服五

積湯

五積湯 厚朴八分 陳皮錢一 桔梗分 蒼朮錢一 川芎分 白芷分 白茯苓分 當歸分 香附

酒炒八分 半夏七分 枳殼八分 肉桂分 甘草分 白芍八分 麻黃錢一 青皮分 薑三片

葱一根水煎溫服

經來狂言譫語。經來怒氣觸阻逆血攻心不知人事狂言譫語如見鬼神先服麝香散定其心志後服

茯神丸以除其根

麝香散 麝香 甘草 辰砂各三分 木香不見 人參 茯神 桔梗 柴胡各八錢 遠志錢一

研末白湯調服二錢

茯神丸 茯神 茯苓 遠志各八錢 砂仁錢三 粳米糊丸如茱豆大金銀湯下五十九

經前經後痢疾。月經將臨傷食椒薑辛熱毒物熱攻五臟變作痢疾諸藥不效宜服甘連湯 三劑

甘連湯 黃連二錢 水煎服

熱入血室。婦人傷寒或勞役或怒氣身體發熱適遇經行以致熱入血室或血不止或血不行晝則安靜夜則譫語如見鬼神者是也。若熱因外邪由表而入者宜一柴胡飲。若或怒或勞火由內生其人多汗而無表證者宜清化飲。若病雖漸愈而元氣素弱熱未退血未止者宜補陰血氣煎。若脾氣虛者宜歸脾湯。若血熱多滯者宜加味柴胡湯。

一柴胡飲

柴胡 白芍

各二錢

黃芩

生地黃

陳皮

各一錢五分

甘草

水

一鍾

半煎

七分

溫服

如

內熱甚者加連翹

去錢

外邪甚者加防風

錢

熱在陽明而善渴者加天花粉

錢

或葛根

錢

清化飲

白芍

麥冬

去錢

各二錢

牡丹皮

茯苓

黃芩

生地黃

各一錢

石斛

水

一鍾

半煎

七分

溫服

食遠溫服如骨蒸多汗加地骨皮

二錢五分

如兼外邪發熱加柴胡

錢

熱甚頭痛者加石膏

錢

小便閉澀

者加木通

錢

補陰益氣煎

人參

當歸

山藥

酒炒各二錢

熟地黃

陳皮

炙甘草

柴胡

各一錢

升麻

炒三錢

水二鍾加生薑三五片煎八分食遠溫服如無外邪除去柴胡加火浮於上除去升麻

歸脾湯

人參

黃芪

炙

白木

蜜炙

茯苓

棗仁

各二錢

遠志

製

當歸

各一錢

木香

炙甘草

各五錢

水二鍾加圓眼肉七枚煎七分服

加味柴胡湯

柴胡

半夏

製

黃芩

人參

各一錢

牡丹皮

當歸

各七錢

紅花

甘草

各四錢

薑三

片棗二枚水煎服

石瘕證治。石瘕因經來之後寒入陰戶客於胞宮血凝不行而腹漸大如有胎孕在壯盛之婦半年之

後氣力強健不治自消若虛弱者必成腫脹宜服加味溫經湯

加味溫經湯

當歸尾

赤芍

川牛膝

肉桂

莪朮

醋炙

破故紙

鹽水炒

小茴香

香附

四製

烏