

~~01420~~

05130



醫說卷第十

小兒

小方

孫思邈千金方曰小兒六歲以下黃帝無說中
古有巫妨始撰顱顱經以占壽夭自茲始有小
方則小兒方藥始於巫妨也

善醫小兒

杜任郎中善醫里人王奉職宗簡時仕於汶陽
時有郡人孟生家甚溫厚惟一子方數歲抱疾



他醫數人治之無驗召任治之數日而良已踰
月而平復人詢任曰君以何藥主之任語之故
其人驚曰公所言皆藥之至溫者也他人不取
君用之能起其疾其義可聞乎任曰孟生富家
也而衆醫皆用犀珠金銀主之其性至涼久則
寒其胃又從而投之由是多不喜食日益羸瘠
則潰其元失其本矣吾之劑先溫其胃使其飲
食如故然後攻其他疾是以先壯其本而無失
者焉又知杜君之善醫也如此

青箱
雜記

瘡豆禁雞鴨子

療病豌豆瘡欲無癰頻揭去痂勿令隱肌乃不成癰縱揭傷有微血但以面膏塗無苦也瘡家不可食雞鴨卵即時盲瞳子如卵白其應如神不可不戒

良方

小兒夜啼

井口邊草主小兒夜啼着母蓆薦下勿令知之

酉陽雜俎

小兒不可食雞

養生論曰雞肉不可令小兒食食之令生蛇蟲

又令體消瘦

杜陽雜編

治兒語遲

社壇餘酢酒治孩兒語遲以少許喫吐酒噴屋

四角辟蚊蟲

本草

兒得母寒下痢

東陽陳叔山小兒二歲得下痢嘗先啼日以羸困問華佗佗曰其母懷軀陽氣內養乳中虛冷兒得母寒故令不時愈佗與四物女苑元十日

即除

魏志

小兒感冷身熱

有小兒感冷身大熱惡寒此有表證用發汗藥汗出遂涼過一日復熱醫謂表解裏未解驗之服四順飲子利動臟腑一行遂涼隔一日又再熱醫云經熱未解驗之小便赤故知心熱未解服生氣湯遂涼過二日又熱其家無所措手醫曰脉已和非病也既發汗又利大小便其兒已虛陽氣無所歸皆見於表所以身熱以和胃氣

藥如六神散之類加烏梅煎令微覺有酸味收其陽氣歸自此全愈

小兒糞青

此脾虛生風之證也脾屬土其色黃糞黃則是脾家正色今乃青肝木剋脾也肝屬木其色青肝盛脾虛受肝之剋故糞青也當服益脾去風藥如半硫元加白附子蝎梢可以治之雖然小兒青糞拋下便青者是風冷也良久然後青者非病也小兒糞自然如此

小兒瀉後脚弱

小兒因患泄瀉或疳氣服藥瀉止却患咳嗽治得咳嗽少愈以五六歲脚弱不能行師曰脾傳肺故咳嗽肺傳腎故不能行脾屬土土生金金生水故傳之腎腎主腰脚故不能行因用猪腰子煎汁服五疳保童元半月遂能行

小兒得地氣方行

小兒未會行能坐不可常常抱在手中可以入坐車能獨坐春夏坐於地上寒則以薦蓆襯之

人得地氣方能行惜之過當常抱持之所以當行而不能行也萬物非土不生故小兒亦要得地氣也

以上醫錄

小兒初生畏寒

小兒初生候浴水未得且以綿絮包裹抱大人懷中暖之及浴了亦當如此雖暑月亦未可遽去綿絮漸漸去之乍出母腹不可令冒寒氣也預煎下沸湯以瓶收之臨時漸煖不犯生水則兒不生瘡如此一月爲佳

小兒初生回氣

小兒初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍且將胞衣置炭火爐中燒之仍燃大紙燈蘸油點之於臍帶上往來徧帶燎之蓋臍帶連兒臍得火氣由臍入腹更以熱醋湯捋洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗了即斷臍帶

小兒初生服藥

小兒初生急以綿裹指拭盡口中惡血若不急

拭啼聲一出即入腹成百病矣亦未須與乳且先與拍破黃連浸湯取濃汁調朱砂細末抹兒口中打盡腹中舊屎方可與乳兒若多睡聽之勿強與乳則自然長而少病

小兒初生通大小便

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先嗽口了吸咂兒前後心并臍下手足心共七處每一處凡三五次漱口吸咂取紅赤爲度須臾自通不爾無生意有此證遇此法可

謂再生

小兒夜啼有四證

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼此冷證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱證也若重舌口瘡則要乳喫口到乳上便啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡舌必腫也客忤者見生氣忤犯而啼也

小兒傷乳食發熱

小兒傷乳及食者或時發熱熱有退時熱退後但肚熱或夜間熱者此傷乳食也其糞有酸臭氣異常千金紫元主之

小兒發熱治法

小兒積熱者表裏俱熱則遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以清涼四順飲子利動臟腑熱則去既去復熱者裏熱已解而表熱未解也當用惺惺散或紅綿散內加麻黃微發汗表

熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可醫誤致夭傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身體便涼熱重者用銀白散

小兒血熱

小兒血熱者每早食後發熱夜則涼世醫多謂虛勞或謂疳熱此血熱也宜用猪膽元

急慢驚風

小兒發癇俗云驚風有陰陽證因身熱面赤而發搐搦上視牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐不瀉日漸面色白脾虛成冷而發驚不甚搐搦微微目上視手足微動者陰證也陽證用涼藥陰證用溫藥不可一槩作驚風治也又有一證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

小兒吐瀉用藥

小兒暑月多吐瀉其證不一宜詳審用藥不可
差謬有伏暑吐瀉小水必不利宜服五苓散香
薷散有傷食吐瀉者其吐及糞皆有酸臭氣宜
服感應元三方易知今不復載瀉多日口唇白
及糞色亦白及瀉糞頗多者因而成冷也宜以
前方六神散每二錢匕加附子末一錢匕煎作
三四服以防變痢也

小兒瀉痢

小兒暑月多瀉者一則伏暑心藏熱小水不利

清濁不分因成泄瀉可服五苓散或大順散二藥皆用沸湯調若小水快而瀉者冷瀉也宜於六神散內加附子煎服若肚大瀉色白者疳瀉也宜服官局六神元瀉者不可急以熱藥止之若以熱藥止之便變成痢凡病痢者皆因有積赤痢熱積也白痢冷積也赤白痢冷熱不調之積也赤多白少者熱多而冷少也白多赤少者冷多而熱少也

小兒解顱