

婦科一

婦

科

光緒庚子年仿製

珍版印於製造局

婦科

美國紐約醫學院婦科教習湯麥斯著

慈谿 舒高第

海鹽 鄭昌棧

同譯

第一章

小引

女科一門，近日講求較衆，古昔醫道，與今不無關係，古法應加考證，不得概置無用，卽今時婦科醫法，昔人亦早有提及者，惟古人未精造耳，卽如探子宮具，海絨傘，照鏡，實兆朕於埃及古書，法人取以考希臘二三千年前婦科，迄今翕然稱之，羅馬一千年前，已明著破腹生子之法，羅馬大將軍西受生時，不能齋由正路，醫生破母腹出之，母仍無恙，由是泰西婦科，有破腹法

猶太國經書亦講及產門經水。婦女病症講求自希臘昔扑克來梯司起。希臘出有醫書三種論及子宮發炎。陰道子宮起繭。經期不整。子宮不正。嗣有阿里梯也斯查驗陰戶。用指探法。論各種白帶。子宮爛等症。戮侖首製陰戶照鏡。與肛門照鏡不同。又有考究圍繞子宮之質料發炎。彼時已明曉此質料層數易發膿炎。有由陰戶直腸流出膿水證據。希臘索來納斯西歷前二百二十年至羅馬。著有書論婦人子宮並陰道。並昔扑克來梯司論生育具甚精細。曾經剖視人屍。非若戮侖止剖猿猴屍也。以爲子宮形似火罐。指明子宮與胯骨臀骨相關。又指明受孕後足月時。子宮口如何改變。子宮垂卸。因襯衣脫落所

致。又論子宮與乳頭相關。古人子宮與陰道混論。獨彼首分別之。又分別有身妊與水鼓脹。並實心癰。如果懷妊。無水鼓脹之空氣聲。並無實心癰之水激聲。亦用探子宮具。陰戶照鏡。第一圖。卽古時照鏡。合於婦科之用。倘婦女陰戶子宮生癰等症。可以之察看。設法醫治。阿依旭斯論探具。可以整飭子宮。

置。昔撲克來梯司亦說及此探具。能令不受胎者受胎。其大者將子宮頸歪曲者。令其整飭。卽可受孕。法令婦人洗浴。用熱汽蒸薰。開其子宮口。用錫探具整之。初必用小探具。如嫌過小。則換麤者。探具先須浸於油膩內。香肥皂或萬式林油然後探之。希臘人

論子宮有疵。交媾後不能留精。如子宮口縮小。以照鏡看明。用

鉛片塞入拓之。統而言之，古藉所稱，不能枚舉，今之醫法，大半根荑古書，而精益求精，出簡捷法，而醫法益加詳焉。

第二章

婦女病症根原

婦女病症，各國或有不同，茲就美國天氣風土言之，公家病症紀錄不可得，祇就余所親見，曾經歷醫治者，以示吾徒，非泛論也。婦女病之根原，分二類，一爲向病根原，一爲引病根原，是編所論，就最顯明而治法已有效驗者著之。至於傳代病證，另有專書，向病根原，講論既詳，而引病根原，可以悟及，欲求詳晰，各有專書。上等婦女，與夫貧賤操作婦女，如美國土人婦女，黑人婦女，比較難言其爲同祖傳下，以爲有相同氣體也，余謂

婦人女子，非受風俗之累者，亦能耐勞苦，可與男子同。生番婦女，其作爲較勝於男，如馬之跑勝者，雌馬居多。獵者遇牝獅極小心，獵狗雌者更趨健。由是以觀，英美等國婦女之束腰，由

華婦女之纏足，皆受風俗之弊，致使不克耐勞而禦病痛焉。願

子宮之病，化外人亦有之。余曾查得奴婢黑人，有子宮墜下，子

宮折向後，變爲努肉顆粒而壞者，然尙不致大害身體。此種病

每由生產傷損而來，更有陰戶肛門交界處扯碎。交界處名會陰子宮

頸破碎，子宮翻摺之症。生番婦女，亦有與白人同。然番婦身體

強健，偶患此症，其禦病力量較大，治之亦易痊愈。近時紐約做

工婦女，帶有病苦者，約有數千百人，竟有子宮直腸墜於身外。

者、上等婦女、一有此症、其苦累更爲難受、身軀康彊者、腦線均整、筋血脈亦調勻、舉止安詳、身心俱泰、或產時、或經期、遇有不測之驚、遂致患重症、或生育具夙有向病根原、或有傳代病症、所患則更加劇、凡此皆由教化風俗不妥而來、缺少門外運動、阻礙身體暢發之機、一腦用過度、腦線功用發動太過、一衣裳裝束不合、一經來而有房勞不宜之事、一產不多時爲不宜之事、一醫生不識病證、或忽略產時所損證據、一阻止妊娠及打胎、一未嫁之前、生育具已有病、一食物不足、一大便常秘結、

忘却運動、門外空曠處運動操作、最足暢發生機、上等婦女、

喜靜怕動，專務門以內之事，關緊暖房，不思運動肢體。女館學堂，每日功課嚴密，竟無暇及他事。師長既不令學生加增筋肉之力，而反以玩耍爲不文，僅許行走一小時，以爲足矣。若然，人之性靈，常爲拘束，而心亦厭苦拘束矣。運動之有益者，能令身體外週血脈靈通，皮膚因以透發，血脈亦以加調。婦人女子，忽略之，當經水來時，卽不免子宮並卵核有血脹之病。平時血脈行亦緩矣。子宮等症，用瑞典國運動肢體治法，土耳其國洗浴法，並在海灘有沫浪內洗澡，能令皮膚內微細發血管通暢。身體外週筋肉等，皆長力，更有日夜用大海絨在熱鹽水內洗淨，以麤毛手巾磨擦，又用大小木棍，棍兩端有錘，操演以活血。

脈。

腦筋部生長過度

腦筋部與肉筋條生長並力量，彼此均須

平勻。古語云：好身體自有好性靈。美國百姓性不肯下，志量過高，每習一技藝學業，不遺餘力，致此二部生長不均。女人受苦累較男人更甚，如讀書每過其力量，腦與腦筋生長甚速，肉筋部不能耐苦，生育具易招病。將來少年女子，考究身體與學業並重，其母欲女孩得好身體，則生育具向病根原，可以減少。婦女而不知調養，骨盆處各生育具，當卵核內卵珠成熟時，理應血脹，反害出腦筋痛之經難症，或有卵核微炎，子宮受胎而厚大，產後復原收縮或不周到，子宮常有微摺之弊，子宮因

之加重其牽連之肉筋條類反弱不能禁子宮之漸墜子宮或變彎折或偏向

衣裳裝束不合 晚今風俗之累女眷衣裳於胸脇下段裝束極緊或以爲姣好有樣實則子宮之病由是害成微特害出向病根原且害出引病根原而無病反有病矣人生肺之呼吸而令周到胸膛須純任自然以是胸脇下段須格外寬舒卽膈疝之根處是也衣裳緊束無異夾板夾住醫生治脇骨斷者用夾板夾脇要其呼吸不動脇骨而以腹動代之膈膜收縮肺臟不張則必向下擠腸以壓子宮至骨盆底或壓令子宮偏斜其收束之力約有五磅至十磅之重其分兩喫重於胯骨及腹而暗

爲所凸，每二十四小時有十四小時壓下重力，每餐飯後又增加重數。以沁姆斯照鏡照看子宮，腰間收束緊切，子宮之頸必偏向鈎骨凹處，照鏡欲查看子宮頸更難，照鏡看子宮時，每一呼吸，子宮亦一升一降，可見子宮宜任其靈活，凡醫生於陰道用手法時，察子宮升降自如，便知其呼吸合度，用蒙汗藥時，察其呼吸無異，可無庸再診脈息，生育具如是靈活，束腰過緊，必累及子宮，且脇骨切緊於肝，剖屍時每見肝有切痕也。不特此也，壓力在腹肉筋條，與胸肉筋條，並膜膈，必害出幾分癱痿情形，以其阻礙胸腹呼吸，並減腹與骨盆內提力，提力既少，必隨重心吸力，出本位矣，束腰風俗之患，罄竹難盡，其患實爲

引病根原，臟腑重力，皆壓於生育子宮上，子宮之囊底，或彎向頸，致子宮後面之生長，較速於前面，女子發身時，經水因頸處彎摺，不能暢行而痛，子宮遂有新病根原。子宮軸線與陰道

軸線本不整對，陰道軸線合於骨盆下口軸線，子宮軸線合於

骨盆上口軸線，以是交媾時，男陽莖頭，每過子宮頸後旁而

於囊道，

囊道者子宮頸四面夾道也，夾道不通，如囊有底，以此名爲囊道。

束腰緊時，子宮壓下寸許

則天生位置改變，子宮頸不免受損，凡男女成婚，子宮平正，亦

媾無所損累，若女人生育具不合位置，即略交媾，亦易致病，

生育具不整，血脈行即不暢，有處血多，有處血少，血多處脹，人

筋肉堅老，子宮口抵住陰道內邊，而經不能流，將害出子宮，

摺之病，子宮頸卽在骨盆底磨擦，所有牽連子宮之筋，皆鬆弛失其用，醫生用襯墊法以整飭子宮，須想及以上各節，若專講襯墊，譬用短撬桿以撬子宮，並撬臟腑裝束重物，必反害出疼痛發炎之患，而致廢此醫具，應先將壓緊腰脇重物解去，少腹處束以肚兜令熨貼，以藥水棉花從陰道襯入，俾不整多血之子宮，上聳骨盆上口，或令病者俯跪，令子宮斜向上，見一百八十八圖順子宮重性，整飭位置，約一星期之久，乃用襯物，可無弊病。

經期到時，不思保重身體，卽爲多病根原，假如天色不佳，驟雨涼風，衣服單薄，而冒昧從事，以爲無關緊要，亦或出於不得已者，將有甚劇血脹之經難證，或子宮內衣發炎，若延久不治，

勢必害及子宮本體病證，則難醫矣。卵核子宮血充足時，極面穿破，任卵珠自出，當血脹迸裂時，所有腦線，皆煩厭不勝觸動，須保重身體，令腦線平安，切戒冒風受寒，顧婦女每踈略不留心，如今日寒暑表祇高於○度十五度，大花園跑走冰池，有幾許文弱女子在內，豈非冒險之事歟。經到時，冒犯風雨之寒者，最爲害子宮內襯衣發炎，此症一起，每延挨數年，致子宮本體有恙，及經難證，成不孕之症，骨盆處疼痛，胃病不消化，不足養身，更有骨盆處腹包膜發炎，骨盆處連網發炎，骨盆處巨血瘤。

產後不保重之症 婦人受孕，卵核所發出卵珠，與陽精相感

即停住於子宮，子宮是處料質感動，令子宮全體迅行。

成胚胎，足月臨產，乃出。子宮產後子宮即自復原，所有長大。

絡等變為油質而收縮。西名陰復羅興若小產，子宮縮小甚速，不

若大產後子宮復原，須六星期之久，欲其照常復原，須令產婦

安靜平穩，若起床太早，急欲操作，其時惡露未淨，恐有危險，且

彼時子宮較平時更重，用力多則難免子宮出位之患，子宮內

襯衣，許久不歸常度，若粗健婦人，一產即操作，其生育具無病

證，固未受上所說之累也。產後上等人較下等人多受累者，

女僕每用兩層大手中束於子宮上小腹處，加帶條收極緊，致

擠子宮向鈎骨凹處，蓋臥在牀褥，子宮業已向內，而再擠之，則