

三
五
七

金匱玉函經二註卷之四

趙以德術義文之清也。新元和李清俊春泉重刊

周揚俊補註。小學與藝長洲葉萬青訥人叅校

甲瘧病脈證并治第四

證二條方六首

師曰瘧脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者下之差。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗針灸也。浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。

衍義今觀此篇雖未盡內經諸篇論瘧之詳。然亦取

其一二立方以明其治。此條叙脈固亦未盡瘧脈之

變然舉其自弦。則自之一字已該其脈之要。何則。弦者少陽甲木之象也。瘧邪客于榮氣之間。與衛氣合而病作。寒熱者正隸少陽半表半裏之分。所以少陽爲瘧之舍。故弦乃瘧疾之本脈也。于是少陽引邪退而就陰。陰則寒。寒則遲。進而就陽。陽則熱。熱則數。寒用溫而熱用涼可知矣。此明表裏進退乘其虛實而調之者也。復言小緊與弦緊汗下之者。此又明表裏之有實邪而攻之者也。浮大者以明病不在表裏而在上者也。非若內經之謂瘧脈大虛者。斯因其浮而

用吐也。弦數風發者，非前多熱之所云，乃更論其數之變。而木從火則風生。風得火則旺。旺則尅土。火發木淫。必先實脾。實脾莫如資以飲食消息寒涼之味。以止之。此乃明其病在中者也。仲景凡一言一字皆立準繩。學者詳之。

嘉言云。卽梨汁。蔗漿。生津止渴之屬。

病瘡以月一日發。當以十五日愈。設不差。當月盡解。如其不差。當云何。師曰。此結爲癥瘕。名曰瘡母。急治之。宜

鼈甲煎圓。

鼈甲煎圓方

鼈甲十一分炙

烏扇

三分燒

黃芩

三分

柴胡

六分

鼠婦三分熬

乾薑

三分

大黃

三分

芍藥

五分

桂枝三分

葶藶

一分熬

石韋

三分去毛

厚朴

三分

牡丹皮五分

瞿麥

二分熬

紫葳

三分

半夏

一分

人參一分

廑蟲

五分熬

阿膠

三分炙

蜂窠

四分炙

赤消十二分

蜣螂

六分熬

桃仁

二分

右二十三味爲末、取鎚龜下灰一斗、清酒一斛五斗、浸灰、候酒盡一半、著鼈甲于中煮、令泛爛如膠漆、絞

取汁內諸藥煎爲丸如梧子大空心服七丸日三服
千金方用鼈甲十二片又有海藻三分大戟一分麿
蟲五分無鼠婦赤消二味以鼈甲煎和諸藥爲丸

衍義內經云天度者所以制日月之行也氣數者所
以紀化生之用也五日爲一候三候爲一氣然人之
三陰三陽上奉之而爲之應焉是瘧有發于月一日
者至十五日則一氣終人氣亦更故瘧氣隨變而散
設有未愈則至月盡又歷第二氣終其天之月以應
人之血月再生魄血亦更新邪當從其更新而解矣

若又不愈。則是榮氣內著。不得流行。與日月度數相應。而肝藏血。血并其邪歸之于肝。是以瘧母多結左脇下。由是用柴胡行氣。鱉甲破血爲君。餘二十一味佐之。行血補血。散結導滯而已。雖然。天人氣候之相應者。大法如是。然人之稟質有強弱。邪中有重輕。質弱邪重。雖不內結瘧母。亦至連月者有之。質強邪輕。不待一候。卽瘥者亦有之。然仲景此論。補內經未言。

耳。二錢五分。
爲一分。

師曰。陰氣孤絕。陽氣獨發。則熱而少氣。煩冤。手足熱而

欲嘔名曰癰瘡若但熱不寒者邪氣內藏于心外舍分肉之間令人消爍肌肉

衍義內經云但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癰瘡又云肺素有熱氣盛于身因有用力風寒舍于分肉之間而發發則陽氣盛盛而不衰其氣不及于陰故但熱而不寒氣內藏于心而外舍于分肉之間令人消爍肌肉故命曰癰瘡此二者一爲先傷于風一爲肺素有熱所感之邪雖不一然病是陽盛又內經之陽盛逢風

兩陽相得而陰氣虛少。少水不能制盛火。而陽獨治此熱如火。當爍肉也。由是觀之。瘧之寒熱更作。因陰陽之氣互爲爭併。若陰衰少。則離絕真陽。先自退處。不與之併。而陽亦不併于陰。故陽獨發。但熱而已。此總論二者之癰瘡。其少氣煩冤。肺主氣。肺受火抑。故也。手足熱者。陽主四肢。陽盛則四肢熱也。欲嘔者。火邪上冲。胃氣逆也。內藏于心者。心乃五藏陽火之主。故陽盛則直隸而藏之外。舍分肉之間也。消爍肌肉者。消萬物者莫甚于火。火甚則肌肉爍矣。然此條詞。

無治法。自後條除溫瘡者觀之亦可治此瘡瘍也。何則。白虎湯退熱藥也。分肉四肢。肉屬脾胃。非切于其所舍者乎。又瀉肺火。非救其少氣煩冤者乎。設其別有兼證。豈不可推加桂之例以加別藥乎。仲景于此雖不言方治。蓋可知矣。凡立一法。則足以比類用之。雖然。自其陰氣孤絕一語觀之。又足有可論者。夫陰陽之在身者。血與氣也。水與火也。內屬乎心與腎也。而寒本于陰。熱本于陽。以寒治熱。固可退陽而回陰也。然治病有輕重。豈一法而盡哉。小熱之氣涼以取

之大熱之氣瀉之于內。或反佐以取之。取之不衰。求其屬以衰之。謂壯水之主。以消陽光也。

溫瘡者。其脈如平。身無寒。但熱。骨節疼痛。時嘔。白虎加桂枝湯主之。

白虎加桂枝湯方

知母 六兩

甘草 二兩

石膏 半斤

粳米 二合

桂皮
三兩

右剉末。每五錢。水一盞半。煎至八分。去滓。溫服。汗出

愈。

衍義內經名溫瘧亦有二一者謂先傷風後傷寒風陽也故先熱後寒一者爲冬感風寒藏于骨髓之中至春夏邪與汗出故病藏于腎先從內出之外寒則氣復反入是亦先熱後寒二者之溫瘧則皆有陰陽往來寒熱之證而此之無寒但熱亦謂之溫瘧似與內經不侔然繹其義一皆以邪瘧爲重而名之夫陰不與陽爭故無寒骨節皆痺不與陽通則疼痛火氣上逆則時嘔用白虎治其陽盛也加桂療骨節痺痛通血脈散瘧邪和陰陽以取汗也

瘧多寒者。名曰牡瘧。蜀漆散主之。

蜀漆散方

蜀漆洗去腥

雲母燒二日夜

龍骨等分

右三味杵爲散。未發前以漿水服半錢匕。溫瘧加蜀漆半分。臨發時服一錢匕。一方雲母作雲實

衍義心者。牡藏也。邪在心而成瘧。故曰牡瘧。何以言之。心肺居上。陽也。而心乃陽中之陽。今邪氣結伏心下。則心虛。內經曰。心虛者。熱收于內。則陽氣不行于外。故外寒積聚津液以成瘧。是以牡瘧反多寒也。用

蜀漆和漿水以吐所結痰邪。龍骨以療氣伏心下者。
雲母安藏補虛以除內收之熱。若夫溫瘧亦用是少。
加蜀漆治者亦爲邪氣結伏在心下致傷氣而不入
于陰反獨盛在外以成熱而不寒故亦以此去其所
結也。

牡蠣湯治牡瘧方

牡蠣去其肉加牡蠣

牡蠣

四兩
熬

麻黃

去節
四兩

甘草

二兩

蜀漆

三兩
上研

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內
諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服。

衍義此與前牡瘧名同、故治亦同、畧以有初感寒邪爲異、牡蠣者能軟堅消結、除滯血、今更佐之蜀漆、以理心下所結之邪、而甘草佐麻黃、非獨散寒、且可發越陽氣而通于外、陽通結去、其病卽瘥。

柴胡去半夏加枯萎湯、治瘧病發渴者、亦治勞瘧、

柴胡 八兩

人參

黃芩

甘草 各三兩

枯萎根

四兩

生薑

二兩

大棗

十二枚

右七味、以水一斗二升、煮取六升、去滓、再煎取三升、

溫服一升、日三服、

嘉言云渴雖陽明津竭而所以致陽明津竭者全是一少陽之邪故卽小柴胡去半夏加栝蔞也

衍義內經謂渴者刺足少陽此證胃土被木火之傷則津液涸而燥渴故用柴胡黃芩治木火人參甘草補胃栝蔞生津益燥薑棗發越榮衛若勞瘧由木火盛榮衛衰津液竭者亦治以此

柴胡桂薑湯治瘧寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神

柴胡

半斤

桂枝

三兩

去皮

乾薑

二兩

栝蔞根

四兩

養恬齋藏板

黃芩

三兩

牡蠣

二兩

甘草

二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

衍義是瘧也以寒多言之若與牡瘧相類以藥論之

則非也牡瘧邪客心下此風寒濕痺于肌表肌表行陽以溫分肉痺則陽氣不得通于外遂鬱伏于榮血之間半表半裡之分也陽化氣熱血滯成瘀著于其處遇衛氣行陽二十五度及之則病作其邪之入營者既無外出之勢而榮之素痺者亦不出而與陽爭