

平

諸證部

凡

汪訥菴先生秘本

徐靈胎二先生藏本
葉天士
清御醫吳謙先生審定

本草易讀

上海大成書局發行

中華民國十五年三月初版
中華民國十五年六月再版



秘本
本草易讀
全書八冊
◎定價大洋壹元

休寧 汪詒庵先生秘本

清御醫 吳謙先生審定

上海新北門民

發行者 大成書局

立路潘家街口

分售處 本外埠各大書局

序

本草一經。撰自炎農。其種三百六十五。以象周天之數。漢末張仲景。悉依本經撰方。治療疾苦。其效如响。此傷寒金匱所由稱方藥之祖也。自唐以降。藥品日增。而性味多未研究。率皆師心自用。沿及宋元。藥益稱倍。仍相謬誤。即依本經製方。其精蘊微義。每多遺漏。是以唐宋而下。製方不能盡效者。致此之由。茲欲詳為闡述。無如耳目所及無多。古今名實互異。地土殊產。氣味異質。一時難以推測。故特即諸家增補。擇其稍精詳者。附諸本經。合為一體。兼為稍斂句法。以便誦讀。其土產形狀。真贋謬誤。悉折衷於李氏綱目。如是而已。蓋本草之撰。代有其作。試舉其目。兼約其略。陶氏叅別錄。而名醫仍舊。蕭梁陶弘景增補。名醫別錄。徐氏增藥對。而雷公悉遵。北齊徐之才補。雷公藥對。唐之英公。後增脩乎通明。而詳定又賴蘇恭。唐李勣撰。英公本草。長史蘇恭重訂。蜀之乾昇。重校證夫新唐。而圖說頗詳。陶蘇。唐偽蜀翰林乾保升撰。蜀本草。黑白異迹。開寶取唐蜀

而更訂。宋開寶間。劉翰撰開寶本草。繼踵者嘉祐之補註。宋嘉祐間。命郎中林億禹錫撰嘉祐補註。圖說相

謬。圖經繼補註而再刊。宋仁宗命博士蘇洵撰圖經本草。蔡攸者寇氏之行義。宋醫官寇宗奭撰本

義。草行他若千金之食治。唐孫思邈撰。千金食治。不遺食物。孟張之食療。唐孟詵撰張鼎

草。取法食醫。士良明食品之性。宋南唐醫學助教陳士良撰食性本草。專務調養。臧器拾約

性之遺。唐縣尉陳藏器撰。本草拾遺。不厭僻怪。采百約而收單方。證類復改為大觀。宋

蜀醫唐慎微撰證類。本草後改大觀。本草。分諸約而配五行。補遺推廣乎衍義。元末朱丹溪撰衍義補遺。明

煅煉熬煮之法。雷公之炮炙。劉宋時雷敫著。雷公炮炙。僅及三百。辨升降浮沉之義。元

素之珍囊。宋時金易州明醫張元素著。珍珠囊。未及編評。東垣祖潔古而成法象。元末元素弟子李杲

著用約。法象。師程克遵海藏習明之而著湯液。李杲弟子王好古著。湯液本草。源淵相授。迨至

有明。集要循古。王倫著。本草集要。蒙筌鑿句。陳嘉謨著。本草蒙筌。發揮因循。徐彥純著。本草發揮。會編

撮約。汪机著。本草會編。盛矣李氏綱目。李時珍著。本草綱目。統括諸家。引證百氏。萃玉集錦。

指謬辨誤。自軒皇而後。使諸家本草及各約單方。繼證類而堪垂千古。不

致淪沒者。獨賴此撰之存。第卷帙太繁。不無濫與。而吳越一家。卒難割分。展如之人。得無登蘭台而超超也耶。然而詩以約精。筆隨削成。述創非勞。悲憫倍切。所謂先天而憂其憂也。居閑閑而懷濟世之隱者。得毋類是於焉。即素日所珍。詮次成編。具陳臆見。以當臚言。聊以備億兆疾痛之需。成一部陰騭之書。如是焉耳。

例

一昔唐慎微撰證類。悉收古今驗方。附入綱目。因之增廣數倍。第收括太繁。未經詳擇。優劣並載。不無包荒。茲於千萬方中。加意去取。凡險危峻猛。質偽邪僻之品。用之而意有畏難者。并棄如遺。所有精詳真實。輕淡簡便之劑。試之而效如應響者。悉收入錄。更於諸家大劑。選其尤切實者。與所帶試奇效大小諸方。隨附每味之下。則庶幾因症查方。任意驅使。可無畏縮忘虛之慮。

一醫家本草不讀。則藥性不明。即偶讀矣。或旋忘之。雖讀如無讀。而仍藥性不明。藥性不明。於病之寒熱虛實。雖悉。於藥之寒熱溫涼。則昧。且於藥之反畏宜忌。更相違逆。如是欲用藥却病。將藥與症。兩不相符。而欲拯厄拔苦。生死骨肉也難矣。茲於精揀各方。附於各藥之下。因症用方。按門查尋。一覽而知方所在。即一覽而知藥之性。蓋方之所在。即藥性

之所在也。

一用藥治病。有輕病立愈。重病悠輕。小症忽大。危症卒死者。峻猛大劑是也。也有小病略瘥。大病少效。輕症不重。重症不危者。輕淡小方是也。益以峻猛治病。恒治十而愈六。而四者必損。何者。不有大勝。必有大敗也。以輕淡治病。每療十而愈四。而六者無恙。何者。絕無大功。亦無大過也。茲於小方。則加倍收之。於大劑。則約略舉之。益早儲此心。於不求有功。只求無過之地。惟其不求有功也。而醫家之功量。正無限矣。

一醫家治病。當以常問此心。無所抱愧為主。益用藥如用兵。難保常勝。我朝徐洄溪。江南宿儒也。其導人以行醫之道。惟小心敬慎。擇清淡切病之品。俾病勢少減。即無大功。亦不貽害。若欺世徇人。止知求利。亂投重劑。一或有誤。無從挽回。病家總不知。而此心不能無愧也。愚以為非閱歷深者。不能有此確論。茲所附諸方。皆輕淡切病之品。治病期以緩攻。

而效不欲速收。葯方與本草相輔而行。為壽世無窮之利。醫家執此以行。則終身無抱愧之時矣。

一是編有本草未及載。而主治頗詳於方中者。如甘草治下痢。療羸瘦。防風通便秘。解諸毒之類是也。讀者由此而推測之。自能悟本草主治。猶有未盡之秘。依經制方。復有旁通之妙。蓋本草與葯方相須而行。大有關益。而近世選本草者。每於諸葯主治。則詳言之。於所附葯方。悉迸棄之。是未諳本草與葯方相輔而行之義也夫。

一是編諸方。於葯之貴重者。悉不多錄。以貴重者多偽。而且費資厚。取厚資。賈偽葯。以偽葯治真病。於醫病兩無所益。不惟無益。而反有損。故不多錄。

一是編諸方。於葯之遐僻者。亦不多載。以遐僻者。其來不易。或經雨濕蟲蛀。渝其故色。或出殊產異道。失其常性。愚以為用葯之際。當即照本草。

察其形色。嘗其氣味。各與本草吻合。方為真品。然後再照如何炮炙。而後用之。方屬妥當。

一是編諸方。於藥之習見習知者。獨加詳收。以習見習知者。多真實無偽也。

一是編諸方。即不嘗習醫之人。亦可照症查方。如遇病人所求。即照目錄中。查其所病。再照所病。查其所兼症。乃照所症。尋篇查其所宜方。或此方不妥。再查目錄中。另查彼方。或彼方仍不妥。欲另取大方。即照諸方中。大方加減取用。仍即所方本部。查其藥性之寒熱溫涼。反畏宜忌。再即病之寒熱虛實。而合觀之。儘任用藥。即不小效。亦無大咎。凡尿赤便燥。舌胎氣粗。口渴者。實熱也。尿清便滑。舌潤氣微。口不渴者。虛寒也。然外感初得。舌色亦潤。不可不知。

一是編當家值一部。一備緩急之需。蓋即稍識字之人。亦可照症查方。或

山僻之區。無地求藥。或貧寒之家。乏資制劑。即照目錄所症。其旁註中。有所習見。習知之品。而所習見。習知之品。即方中之君藥。或即此單方。一味如此。方不安。或不效。欲另擇一方。仍照前再查一方。蓋方隨意。到用之不盡也。

一有謂古方不能治今病者。此大謬也。夫病不外乎六淫七情。試問風寒暑濕。古今之天氣。有以異乎。喜怒憂思。古今之人情。不相侔乎。如果有異而不侔。何傷寒金匱諸方。用之而效驗如響。唐宋以下諸方。用之而有效有不效者。豈以仲景為今。而唐宋以下為古耶。蓋非古方之不效於今。而實今人之不復能用古方也。茲撰大方。不遺仲景。而唐宋以下。仍擇其精詳者。悉附記載。聊備用方者之去取云爾。

脉法總括

肺心浮脉主表。浮緊傷寒。浮緩傷風。浮數風熱。浮芤失血。邊有中室為芤浮洪主火。浮

濡陰虛。浮滑痰熱。浮弦痰飲。浮散危候。浮革勞極。浮如鼓皮為革浮大內虛。多在

右關。

肝腎沉脉主裏。沉緊內痛。沉弦伏飲。沉數內熱。沉實熱甚。沉遲內寒。沉滑宿

食。沉細溼寒。沉弱氣鬱。沉牢痼冷。沉伏霍亂。

脾臟遲脉主臟。遲浮表虛。遲沉裏寒。有力為痛。無力寒虛。遲緩沉實。陽盛之

端。遲細難澹。澹脉陰衰可見一息三至。脉現三關。

心腑數脉主腑。有力為熱。無力為瘡。細數為勞。滑數痰火。數止為促。陽盛之

候。一息六至。數脉不謬。

肝膽弦脉主飲。弦數為熱。弦遲為寒。寸弦頭痛。尺弦腎傷。弦緊寒實。弦細病

極。傷暑之脉。弦細芤遲。少陽傷寒。弦數弦細。

四至為緩。平和之候。有止為結。浮結氣滯。沉結則積。○動脉如豆。三關皆有。崩帶失精。為痛為驚。動而中止。良久方出。此為代脉。病關生死。平人難救。妊婦可喜。

八脉奇經。直上下行。緊直任脉。浮督牢衝。寸左右彈。陽蹻之形。尺左右彈。陰蹻可憑。關左右彈。帶脉在中。尺外斜上。至寸陰維。尺內斜上。至寸陽維。○浮直為督。脊強癰癩。牢直為衝。氣逆裏裏。緊直任脉。七疝癢堅。陽蹻陰急。陽緩陰蹻陽急。陰緩寒熱恍惚。癰瘕癰癩。陽維寒熱。目眩僵仆。陰維心痛。胸脇刺築。帶主帶下。臍痛失精。

本草易讀諸症部卷一目録

中風部一

風寒部二

溫熱部三

感冒部四

瘟疫部五

傷暑部六

癰瘰部七

痿部八

風溼
身痛部九

鼠溼部十

厥部十一

脾胃部十二

酒部十三

痰飲部十四

咳嗽部十五

肺痿部十六

喘部十七

瘧部十八

痢部十九

瀉部二十

霍亂部二十一

轉筋部二十二

反胃部二十三

嘔吐部二十四

脹滿部二十五

痞堅部二十六

氣臌部二十七

水腫部二十八

氣部二十九

癖部三十

諸積部三十一

黃疸部三十二

發熱部三十三

補養部三十四

癆部三十五

男陰部三十六

陽痿部三十七

諸血部三十八

諸汗部三十九

打呃部四十

麻木部四十一

癲狂部四十二

健忘部四十三

驚部四十四

頰部四十五

嗜卧部四十六

小便部四十七

大便部四十八

痔漏部四十九

脱肛部五十

胡臭部五十一

虫部五十二

脹飽部五十三

失音部五十四

頭部五十五

眩運部五十六

耳部五十七

面上斑部五十八

白秃部五十九

鼻部六十

口舌部六十一

唇牙部六十二

目部六十三

本草易讀卷一

汪詒庵先生秘本

中風部一

清御醫吳謙審定

中風口噤

白朮第九
驗方十四

中風口噤

荊芥七十三
驗方四

中風口噤

竹力三百三十八
有火者

諸風口噤

南星一百四十
驗方三

牙關不開

南星一百四十
驗方四

口噤身冷

獨活三十二
驗方二

口噤痰壅

皂角三百。四
驗方一

中風不語

獨活三十二

中風舌強

雄雞三百八十七

中風不遂

黃芪第五

卒風不語

黑豆二百。七
驗方三

中風失音

槐米三百。一
驗方八

中風痰壅上膈

鉛四百二十二
黑錫丹

中風口斜

黑豆二百。七
驗方三

中風口斜

皂角三百。四
驗方二

中風口斜

白附一百三十九
驗方一

口目斜歪

乳香二百八十四

口目斜歪

南星一百四十
驗方八

口目斜歪

比麻一百三十四
驗方五

一切偏風

荊芥七十三
驗方三

手足不舉

比麻一百三十四
驗方四

半身不遂

秦沙三百五十二

諸風有痰

藜蘆一百三十六
驗方一

暗風卒倒

細辛四十三
驗方三

中風不甦

藜蘆一百三十六
驗方一

中風身直

槐皮三百。二
驗方九

中氣不甦

木香五十三
驗方二

中風中氣

南星一百四十
驗方十二

老人中風

鷄三百八十七

一切卒中

生薑二百二十八
驗方二

中風主方

麻黃一百〇二
諸方十一

中風續命湯

麻黃一百〇二
諸方十一

風寒部二

發熱身痛脉緊無汗為傷寒

麻黃一百〇二
諸方二

發熱頭痛脉緩有汗為中風

桂枝二百七十七
諸方一

頭疼如破

葱二百二十一
驗方一

時疾頭痛

驗方二

發熱頭痛無汗

胡桃二百五十四
驗方一

傷寒脚攣便癰

白芍五十一
諸方二

傳陽明經表在脉洪不飲

葛根一百七十一

傳陽明經表去脉洪大渴飲

智母第七
諸方一

傷寒傳胃谷入即吐

吳茱二百六十一

傳少陽

見下柴胡三十

傳府腹痛懼按便結脉實

大黃一百二十八
諸方一