

增訂本草備要卷之三

休寧汪昂認菴著輯

弟汪桓殿武叅訂

太部

甘溫益脾助陽淡滲利竅除濕色

曰入肺瀉熱而下通膀胱能通心氣于

腎使熱從小便出然必其上行入肺能清化源而後能下降利水也

寧心益氣

調營理衛定魄安魂營主血竊主氣治

憂恚驚悸心虛心下結痛寒熱煩滿口

焦舌乾苔火下降則熱除咳逆肺膈噦

休寧汪昂認菴著輯

弟汪桓殿武叅訂

姪汪惟龍子錫

校訂

理氣之劑經曰諸氣膶鬱皆属于肺又曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同百病皆生于氣也夫人身之所恃以生者此氣耳原出中焦總統于肺外護于表內行于裏周流一身頃刻無間出入升降晝夜有常曷常病于人哉及至七情交攻五志妄發乖戾失常清者化而爲濁行者阻而不通喪失護衛而不和裏失營運而弗順氣本屬陽極滯則爲火矣河間所謂五志過極皆爲火丹溪所謂氣有餘便是火也人身有宗氣營氣衛氣中氣元氣胃氣冲和之氣上升之氣而宗氣尤爲主及其爲病則爲冷氣滯氣上氣逆氣氣虛諸變症矣無病之時宜保之養之和之順之病作之時當審其何經何症寒熱虛實而補滻之

胃膈中痰火脾虛水腫淋瀝泄瀉濕遺精

補中益氣湯東垣治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言

益心腎苦虛寒遺溺泄精者又當用溫
熱之劑峻補其下忌用茯苓淡滲之藥

小便結者能通多者能止濕除則便自止

生津

止渴麻熟去津生退熱安胎松根靈氣結

虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之症

中者脾胃也藏府肢

成以大塊堅白者良去皮乳拌蒸白者

體皆稟氣于脾胃饑飽勞役傷其脾胃則衆體無以稟

入肺膀胱氣分赤者入心小腸氣分時

氣而皆病矣陽氣下陷則陰火上乘故熱而煩非實熱

曰白入氣補小脾曰勝利濕熟赤勝惡

珍也頭者諸陽之會清陽不升則濁氣上逆故頭痛其痛

寒自汗氣虛故懶言脾虛故惡食脾胃虛則火上千肺

故喘金受火剋不能生水故渴脾虛不能統血則血妄

行而吐下清陽下陷則爲瀉痢氣血兩虛則瘧不止名

白斂裹地榆秦艽甲桂黃酒皮

瘧瘧老也○李東垣內傷外感辨傷千飲食勞役七

真能行水治水腫膿肉以皮行皮之義

情六慾爲內傷傷于風寒暑濕爲外感內傷發熱時熱

腫而煩渴便祕渴赤屬陽水宜五皮散

疏瀉飲不順渴大使溏小便數不赤泄

感惡風見風更惡口易煩渴三兩下小

周除水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜沃腰以下腫宜利小便。

茯神主治略同茯苓但茯苓入脾胃之

用多茯神入心之用多開心益智安魂

養神療風眩心虛健忘多恚 即茯苓

抱根生者 昂曰以甘抱心故能補心也 夫皮及中木

用 茯神心木名黃松節療諸筋攣縮

偏風喝邪心掣健忘 心木一而乳香一氣
錢石器炒研名松

節散每服二錢木瓜湯下治一切筋

牽疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也

瑞草甘平以脂入土而成寶故能通寒

以寧心定魄魄療癲邪 從鎮驚藥則安心神色赤

麻三錢蜜炙

黃耆蜜炙人參

甘草一錢

白米一錢

陳皮留當歸五分

白當歸分升

者不宜服

熟傷食膈滿

宜秘或溏左人迎脈主表外感則人迎大于氣口右氣

口脉主裏內傷則氣口大于人迎內傷證屬不足宜溫

候作外感妄發其表重虛元氣禍如反掌故立補中益

為先外感重者宜發散為急此湯惟上焦痰咽中焦濕

宜補宜和外感證屬有餘宜汗宜吐宜下若內傷之症

為先外感重者宜補養

候作外感妄發其表重虛元氣禍如反掌故立補中益

為先外感重者宜補養

無休止 徒表邪傳裏方罷內傷有濕或不作渴或心火乘肺亦作燥渴外感須二三日外表熱傳裏口方作渴

內傷則熱傷氣四肢沉困無力倦怠嗜臥外感則風傷筋寒傷骨一身筋骨疼痛內傷則短氣不足以息外感

入手少陰足厥陰血分心故能消瘀血

神短少加人參五味肺嗽咳嗽去人參益乾加葛根

破癰瘍生肌肉合金瘡

從辛溫藥則其多燥葛根獨能止渴者以其能升胃中清氣入肺而生水耳

頭痛加蔓荆子痛甚加

味甘淡上行能使肺氣下降而通膀胱

川芎腦痛加藁本細辛風濕相搏一身盡痛加羌活防

經曰飲食入胃游溢精氣上輸于脾肺氣散精上歸于肺通調水道下輸膀胱

凡滲藥皆上故能治五淋利小便燥脾風有痰加半夏生薑胃寒氣滯加青皮蔻仁木香益智

土從淡滲藥則利窮行水然石藥終燥行而後下降故能治五淋利小便燥脾若血少而小便不利者反致燥急之苦

又能明目磨翳松脂入七年久結濕勝加蒼朮陰火加黃柏知母陰虛去升柴加熟地山

茱或云楓脂結成以摩熱拾芥煮

古茱山藥大便秘加酒煨大黃咳嗽春加旋覆欬冬夏加

多煮鷄子及青魚枕偽用柏子仁末入麥冬五味秋加麻黃黃芩冬加不去根節麻黃天寒加

之摩呵亦能拾芥宜辨

死鍋同煮半日搗末用

乾薑泄瀉去當歸加茯苓蒼朮益智

松節松之骨也堅勁不凋故取其苦溫

此足太陰陽明藥也肺者氣之本黃耆補肺固表爲君

之性以治骨節間之風濕丹溪曰能燥

脾者肺之本土能生金脾胃人參甘草補脾益氣和中

杵碎浸酒良史國公菜

酒中用之

一虛肺氣先絕人參甘草瀉火爲臣東垣曰參耆甘草瀉火之聖藥蓋煩勞則虛

燥祛風去濕化毒殺蟲生肌止痛養生

謂之瀉火爲臣東垣曰參耆甘草瀉火之聖藥蓋煩勞則虛而生熱得甘溫以補元氣而虛熱自退故亦

家鍊之服食今熬膏多用之

膠葛有孔

亢升麻以升陽明清氣

右升而復降

其本位柴胡以升少陽清氣

蟲即從脂出

松毛釀酒煮竹代水亦治風痺脚

左旋而上行陽升則萬物生清升則陰濁降加陳皮者以通

氣

利其氣

陳皮同補藥則補獨用則瀉脾

生薑辛溫大棗甘溫用以和營

極苦辛甘而潤其氣清香能透心腎

衛開腠理致津液諸虛不足先建其中中者何脾胃是

而悅脾昂按凡補脾藥多燥此潤藥而香能舒脾燥脾藥中兼用最良

土位其次肺氣受邪須多用黃耆而人參甘草次之

養心氣潤腎燥助脾滋肝好古曰肝經氣分藥益

脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而固腠理不令自汗上喘氣短故以人參補之心火乘脾用炙草甘

智寧神養聰耳明目。甘益血。益血止汗。

香通竅

心生血汗。陰風濕愈驚癇澤皮膚辟鬼為心液。

魅炒研去油油透者勿用畏菊花。

側柏苦澁微寒。本草微溫養陰滋肺而燥。

土最清血分爲補陰要藥。止吐衄崩淋。

腸風尿血痢。一切血症去冷風濕痺。

歷節風痛。肢節大痛晝靜夜劇名白塗。

湯火傷。搗爛水調塗。生肌殺蟲。久瘻瘍瘍。

烏鬚髮取側柏。丹溪曰多得月令或

炒或生用桂牡蠣爲使惡茹蕊宜酒

萬

溫以瀉火熱而補脾元。若脾胃急痛併大虛腹中急縮宜多用之中滿者減之。白朮苦甘溫除胃中之熱利腰脅間氣。胃中清氣在下必加升麻柴胡以升之引參耆甘草甘溫之氣味上升以補胃氣之散而實其表又緩帶脈之縮急氣亂于中清濁相干用去白陳皮以理之又助陽氣上升以散帶氣脾胃氣虛爲陰火傷其生發之氣營血大虧血減則心無所養致令心滿而煩病名曰煩故加甘辛微溫之劑生陽氣仲景之法血虛以入參補之。陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃柏以散腎水瀉陰中伏火如煩猶不止少加生地黃補腎水水旺則心火自降李士材曰虛人感冒不任發散者此方可以代之東垣曰肌熱者表熱也服此湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也準繩曰凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子加吳萸散藥血虛者四物湯加發散藥東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼朮海藏治風濕無汗者用神术湯有汗者用白朮湯治剛中渴脉弦細花遲者用黃耆湯此皆仲景所謂辛苦之病陽之病陽寒是也用薯蕷散云發熱有效重治各

調多壽之木故元旦飲椒柏酒以辟邪此麻黃桂枝之義也感于寒冷之月即時花病故用辛

肉桂辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分

平肝補命門相火之不足

兩腎中間先天精氣乃真

補腎補命門相火之不足

火也入非此火不能有生無此真陽之火則無以蒸糟粕而化精微脾胃衰敗清熱解毒若夫飲食勞倦爲內傷元氣則真陽下陷內氣盡而益陽消陰治痼冷沉寒能發汗亡矣

益陽消陰治痼冷沉寒能發汗

疏通血脈宣導百藥

辛則善散執則通行

去營衛

風寒虛表自汗

陽

腹中冷痛咳逆結氣

欬逆亦腎氣不歸元

桂能引火歸宿丹田

木得桂而枯

根其木又能抑肝風而扶脾土

肝木盛則克土

辛散肝風從治目赤腫痛

以熱攻熱名曰從治及甘益脾土

及

熱以勝寒如春溫之月則當裏以辛涼之藥夏暑之月則當裏以甘苦寒之劑又有冬溫此天時不正陽氣反

泄用藥不可溫熱又有寒疫却在溫熱之時此陰氣反逆用藥不可寒涼又有瘟疫沿門闔境相似者此天地

之厲氣當隨時令參氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以

清熱解毒若夫飲食勞倦爲內傷元氣則真陽下陷內

生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之藥大補其

氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足也又有劳心

好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而裏爲火是謂

陰虛火旺勞瘵之症故丹溪發陽有餘陰不足之論用

四物加黃柏知母補其陰而火自降此用血藥以補血

東垣所謂清暑益氣是也又有因暑熱而過食冷物以

傷其內或過取風涼以傷其外此則非暑傷人乃因暑

而致之病治宜辛熱解表辛溫理中之藥却與傷寒治

法相類者也外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與

血虛如冰炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣

醫貫曰讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而殺人

脾虛惡食。命火濕盛泄瀉。坐爲木尅。不水方中亦多用桂。如補勞明目通經墮胎。辛熱能動。出嶺南桂州者良。州因桂名色

紫肉厚味辛甘者爲肉桂。入肝腎去粗皮用。

其毒在皮。去裏外皮當中心者爲桂心。

入枝上嫩支爲桂枝。入肺膀胱得人參

甘草麥冬良。忌生葱石脂。本草有菌桂筒桂牡桂板桂之殊。今用者亦罕分。

桂苦入心辛走血。能引血化汗化膿。別惟以肉厚氣香者良。

桂苦入心辛走血。能引血化汗化膿。

內托癰疽痘瘡。同丁香治益精明目消治氣虛多汗。餘皆同前。

補中湯。統用甘溫。所謂勞者溫

之。員首溫之。或加白芍五味之。

多矣。讀東垣書而不讀丹溪書。則陰虛不明而殺人多矣。東垣脾胃論深明餓飽勞役發熱等症。俱是內傷。悉類傷寒。切戒汙下。以爲內傷多而外感少。只須溫補不必發散。如外感多內傷少。溫補中少加發散。以補中益氣爲主。如內傷兼寒者。加麻黃兼風者。加桂枝兼暑者。加黃連兼濕者。加羌活。寶萬世無疆之利。此東垣特發陽虛發熱之一門也。然陰虛發熱者十之六七。亦內傷寒。今人一見發熱。則曰傷寒。須用發散。發散而斃。則曰傷寒之法已窮。余嘗于陰虛發熱者。見其大熱面赤。口渴煩躁。與六味地黃丸一大劑即愈。如下部惡寒足冷。上部渴甚躁極。或飲而反吐。即加肉桂五味。甚則加附子。冷飲以此活人多矣。此丹溪發明。陰虛發熱之外。尚遺未盡之旨也。

本方除當歸白朮。加木香。藜。名調中益氣湯。

東垣治脾胃不調。胸滿肢倦。食少短氣。口不知味。心和則坦。治脾腎不調。胸滿肢倦。食少短氣。口不知味。舌知味。

療生肌補勞傷暖腰膝續筋骨治風寒

酸以收耗散之氣有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎本方加葛根倍分半

癰癩噎膈腹滿腹內冷痛九種心痛一

二症三風四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪乘于手少陰之絡邪正相激故今蟲

心痛

桂枝辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太

氣不思食不知味時惡寒

吳鶴泉曰升柴辛甘升其清清升則陽氣順矣柄皮苦寒

陽膀胱經溫經通脈發汗解肌能利肺

降其濁濁降則陰氣順矣參耆甘草當歸補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利其膈膈利則痰氣順矣豆蔻

辛甘發散為陽治傷風頭痛無汗能發中風曰汗有汗

神曲消其食食消則穀氣順矣東垣曰升麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行于陽道以滋春氣之和又引參耆甘草上行充實腠理使衛外爲固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之以辛甘溫熱之

桂枝為君芍藥甘草爲佐加薑棗名桂枝湯能和調口營衛使邪從汗出而汗自止亦治手足痛風勝風

痛風有風痰風濕風痰瘻助秋冬之沉降者也在人之身是肺腎也本方加炒芩

夏葛芩益智各三分名參术益胃湯

東垣治內傷勞倦

火燄

半夏黃柏名升陽順氣湯

東垣治飲食勞倦所傷滿悶短

熱短氣口渴無味大便溏黃本方法白术加草蔻神變

血氣虛血虛之異桂枝用作引經藥屬肝桂能平肝東垣曰桂枝橫行手臂以其爲枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則花熱肉桂下行而補腎王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒花汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能閉汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病花熱汗出者此爲營弱衛強陰虛陽必湊之故以桂枝花其汗此乃調太陽病花熱汗出者此爲營弱衛強陰地名補中益氣加黃柏生地湯治陰火乘陽發熱甚自汗短氣口渴無味本方加白芍細辛川芎蔓荆子名順氣中和湯寶鑑治清陽不升頭痛惡風脉弦微細本方加羌活防風細辛川芎名調營養衛湯節庵治勞力傷寒頭痛身就惡寒微渴汗出身痛脉浮無力

○亦惟有汗者宜之若傷寒無汗則當從汗出而汗自此非桂枝能閉汗孔也以發汗爲主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斂承氣入胃

神麃名益胃升陽湯東垣治婦人經水不調或脫血後食少水瀉東垣曰脫血益氣古聖之法也本方加黃柏生地名補中益氣加黃柏生地湯治陰火乘陽發熱甚自汗短氣口渴無味本方加白芍細辛川芎蔓荆子名順氣中和湯寶鑑治清陽不升頭痛惡風脉弦微細本方加羌活防風細辛川芎名調營養衛湯節庵治勞力傷寒頭痛身就惡寒微渴汗出身痛脉浮無力

華子骨節則疼痛壅于經絡則語濶行難語言蹇澀口眼喎邪喉中氣急有痰

風勝則氣壅壅于皮膚則頑麻

黃連

嚴用

治中風遍身頑麻骨節疼痛步履艱

難語言蹇澀口眼喎邪喉中氣急有痰

風勝則氣壅壅于皮膚則頑麻

甘草

本草
苦寒

潤肺清肝滋腎無氣

烏藥

橘紅

去二
錢黃節川芎

加五

白芷桔梗

枳壳

生精助陽補虛勞強筋骨

肝主筋
腎主骨

去風

目爲肝竅利大小腸治嗌乾消渴

瞳子屬腎

色赤屬火能補精壯陽然氣味甘寒而性潤

仍是補水之藥所以能滋腎益肝明日而治消渴也

南方樹

昂按古諺有云去家千里勿食枸杞其

力

加木瓜脚氣加牛膝五加皮獨活

此手太陰足厥陰藥也風盛則火熾故有痰火衝逆而上此裏氣逆也然中風必由外感風寒而發內虛而外邪乘之此表氣逆也麻黃桔梗肺家之藥發汗而祛寒

潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮

見下

葉名天精草苦甘而涼清上焦心肺客

高數尺北方並是大樹以甘州所產紅

潤少核者良酒浸搗用根名地骨皮

見下

熱茶止消渴

時珍曰皆三
焦氣分之藥

地骨皮甘淡而寒降肺中伏火瀉肝腎

散相火逆

結之疾

黑薑溫經通陽甘草和中瀉火烏藥能通行

痰順氣正以行瘀

僵蠶清化散結

垂病風則僵得清化

之氣故因以治風能

行

錢僵蠶去絲

嘴炒炮薑

甘草炎五分

加薑煎虛汗者去

虛熱能涼血而補正氣故內治五內邪

熱淫于內治以甘寒地骨一斤生地五斤酒煮服治帶下吐血尿

血搗鮮咳嗽渴外治肌熱虛汗上汁服

除頭風痛能除風者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則中平胸脇痛清肝下利大小腸

癆在表無守之風邪傳尸有汗之骨蒸

李東垣曰地爲陰骨爲裏皮爲表地骨皮燬腎火牡丹皮瀉包絡火統治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退

外潮人實本知病或風寒散而未盡作熱往來非柴葛所能治用地骨皮走表

邪滯諸氣此乃先解毒氣而兼順裏氣順則風散

風邪卒中當先治標若氣虛病久者非所宜也

厥逆痰口噤

脉伏身溫爲中風身冷爲中氣中風多痰涎中氣無痰涎以此爲辨中氣因怒而得者尤多局方用此治之許

學士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之症不可作中風治愈嘉言曰中風症多挾中

氣嚴用和曰人之元氣強壯外邪焉能爲害必真氣先虛營衛虛疎邪乃乘虛而入若內因七情得者法當調

氣不當治風外因六淫得者亦當先治氣後依兩感六氣治之此良法也宜八味順氣散方用人參白朮茯苓

甘草陳皮青皮白芷烏藥併不用前方枳梗麻黃僵蚕風藥正先治氣後治風之妙旨後人或謂不當雜入白芷不知白芷香而不燥正和營衛之善藥也局方合兩

方用人參白朮陳皮甘草乾薑川芎厚朴桔梗麻黃白芷更加葛根治感風頭痛鼻塞舌重尚爲合宜王機微義曰嚴氏此論迥出前人其用築則未也何也四君子補脾胃藥更如白芷去手陽明經風烏藥通腎胃間氣不走裏之藥消其壅肺之邪服之未有

不愈者特表明之時珍曰枸杞地骨以腎而氣實者可用但經有十二五藏之氣互有勝負

寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以芩連降上焦知柏降下焦致傷元氣惜哉予嘗以青蒿佐地骨退熱累有殊功

甘草水浸一宿用。腸滑者忌。枸杞子中寒者忌。地骨皮掘鮮者同鮮。小薊煎濃汁浸下疳甚效。

甘草水浸一宿用。腸滑者忌。枸杞子中

壅盛喘嗽嘔血或大便不利肺爲氣主肺虛火盛故氣血也火炎津枯有升無降故大便不利又有氣痛便秘

用通劑而愈不通或暫通復秘用而下血者亦當順氣氣順則自通當求溫煖之劑

辛溫酸澀補腎溫肝。入二經固氣分

固

精秘氣強陰助陽安五藏通九竅。聖濟

云得

滻劑以通九竅經疏云精氣充則九竅通利昂按山茱通九竅古今疑之得經

疏一言而意旨豁然始嘆前人識見深

遠不易測識多有如此類者即經疏一

語而擴充之實可發

緩腰膝縮小便治醫人之慧悟也。緩腰膝縮小便治

風寒濕痺溫肝故鼻塞目黃。肝虛邪客能逐風。也骨皮山茱萸

此手太陰藥也蘇子前胡厚朴橘紅半夏皆能降逆上

之氣兼能除痰氣行則痰行也數藥亦能發表既以疎

內壅兼以散外寒也

風痰壅盛多挾外感

當歸潤以和血甘草甘

本草清宣木

也骨皮山茱萸

此方安能盡其變乎况真氣先虛之人亦難用也

耳鳴耳聾

腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功王好古曰滑則氣脫

通

瀉劑所以收之仲景八味丸用之爲君其性味可知矣。昂按別錄甄權皆云能發汗恐屬誤文。酸劑散瀉何以反發仲景亦妄取發汗之藥以爲君乎。李士材曰酸屬東方而功多在

北方者尤入氣源血

去核用核能

滑精惡桔梗防風防已

數末甘酸而潤。凡仁、薑、補、肝、胆、炒熟，皆潤重補。肝膽炒熟，張滿大便不利。胸膈痞悶者，脾胃受傷，中氣不運，不能升降。濁氣在上，則生腹脹也。腹脹脹滿者，肝火盛也。大便秘者，清陽不升，故濁陰不降也。

筋骨除煩止渴

斂陰汗。經疏曰：凡肺生津斂汗，固表藥而汗

不止者，用棗仁炒研同生地白芍五味麥冬竹葉龍眼肉煎服，多效汗爲心液

故寧心心君易動皆由胆性所致經療

以緩中下虛上盛，故又用官桂引火歸元也。

主微義曰此散鬱

和中之劑，準繩曰：口鼻出血，皆由上盛下虛有升無降氣湯，加人參阿膠各一錢，下養正丹。昂按方內多破氣發表之藥，又有半夏肉桂血症亦當審用。養正丹金石

烹煉而成

尤覺非宜。

木香順氣湯

坦

治陰陽壅滯，氣不宣通。胸膈痞悶，腹脹

木香

草蔻仁

炒

益智

蒼朮

三分厚朴

四分

青皮

陳皮

半夏

吳茱萸

湯泡

乾薑

茯苓

澤瀉二升

升麻

柴胡

一當歸五

胆虛不眠

溫胆湯中可加用之用虛則不歸脾臥亦虛肝不藏魂故不寐血

知母茯苓芍藥各二兩深師加生薑二

兩此補肝之劑經曰卧則血歸于肝蘇

頌曰一方加桂一兩二方棗仁並生

用治不得眠豈得以煮過便爲熟乎酸

瘧久瀉酸收濁香舒脾

生用酸平療胆熱好眠

時珍曰今人事以爲心家藥殊昧此理

卽按胆熱必有心煩口苦之症何以反

能好眠乎溫胆湯治不眠用二陳加竹

茹枳實二味皆涼藥乃以涼肺胃之熱

非以溫胆經之寒也其以溫胆名湯者

以胆欲不寒不燥常溫爲候耳胆熱好

眠四字不能無疑也

炒研用惡防已

檳榔 沉香 烏藥 人參 等分濃磨煎三四沸溫

一方人參易枳殼一方去人參加枳實木香白酒磨

此足太陰陽明藥也木香厚朴青皮陳皮辛能行氣兼

能平肝草蔻益智香能舒脾蒼朮半夏燥能勝濕乾薑

吳茱溫能散寒升柴之輕以升其陽芩瀉之淡以泄其

陰益脾爲中樞使中樞運轉則清升濁降上下宣通而

陰陽得位矣然皆氣藥恐其過燥故重用當歸以濡其

血共成益脾消脹之功也

四憂湯嚴氏

治七情氣逆上氣喘急妨悶不食

怒則氣上思則氣結

憂愁不已氣多厥逆重則眩仆輕則上氣喘急滿悶妨食

甘溫能補微辛能潤色紫入肝經

服一方人參易枳殼一方去人參加枳實木香白酒磨

氣分潤肝燥補虛子能令母實故兼

補腎肝充則筋健腎充則骨強能使筋

骨相着皮中有絲有筋治腰骨酸痛

經骨相着之象

治腰骨酸痛

經曰

腰者腎之府轉移不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣一少年新娶得脚軟病且痛甚作脚氣治不效孫

琳曰此腎虛也用杜仲一兩半酒半水煎服六日全愈按腰痛不已者屬腎虛

痛有定處者屬死血往來走痛屬瘀腰冷身重遇寒便發屬寒溫或痛或止屬

濕熱而其原多本于腎虛以腰者腎之

加陰下濕養小便餘瀝胎漏瀝血月臘

懷孕胎漏

慣墮胎者受孕一兩月用杜仲八兩糯米煎湯浸透炒斷絲續斷二兩酒浸山藥六兩爲糊丸或裏肉爲丸米飲下

服名五磨飲子治暴怒卒死名曰氣厥

此手太陰藥也氣上宜降之故用沉香檳榔

檳榔性如鐵石沉香

入水獨況故氣逆宜順之故用烏藥加入參者降中有

皆能下氣氣逆宜順之故用烏藥加入參者降中有

升瀉中帶補恐傷其氣也大實者仍宜枳殼

丹溪統治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔吐飲食不消

六鬱

氣鬱血鬱痰鬱火鬱溫鬱食鬱也六者之中以氣爲主

氣行則鬱散矣吞酸嘔吐由于痰火飲食不消由氣不

運行丹溪曰氣升則食自降六鬱不言風寒者風寒鬱

則爲熱也滑伯仁曰鬱者結聚而不得發越當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化所以傳化失常而病見矣氣鬱者胸膈痛溫鬱者周身痛或關節痛遇陰寒即發痰鬱者動則氣喘寸口沉滑熱鬱者昏瞀便赤脉沉數血鬱者四肢無力能食食鬱者噯酸腹飽不能食寸口緊盛經曰木鬱達之火