

增廣  
靈驗

驗方新編

上海錦章圖書局  
印行

後陰

大便

泄瀉

(三)

痢疾

脫肛

痔瘡

兩股

海底

腿部

足部

婦人科

調經門

種子門

胎前門

產後門

雜治

難產門

後陰

截腸怪病

大腸蟲出不斷

肛門生瘡

蟲食肛門

黃門形如風瓣作瘡破流黃水浸淫遍體

肛門奇癢難受

大便

大便虛閉

大便熱閉

大小便閉塞不通

大小便不通尾脊骨上

左右疼痛

大小便熱結不通

大便下血

大便下血百藥不效

大便下五色膿血

泄瀉

寒泄

熱泄

久泄不止

五更瀉瀉

老人五更泄瀉

老人虛瀉

脾虛泄瀉

腎虛久泄

脾泄不止泄出食物完穀不化

腹脹泄瀉不止痢物不化

泄瀉不止腹有硬塊不消

小兒水瀉不能服藥

泄瀉口渴

痢疾

痢疾三方

微理妙論

裡急後重欲下痢而不出

痢疾先紅後白

紅痢不止

孕婦痢疾

噤口痢疾

久痢不止

多年痢疾

霍亂吐瀉

脫肛大腸頭自糞門出者是

大腸脫肛不收

小兒脫肛

痔瘡

痔瘡難忍

痔痛難忍

內痔不出

內痔腫痛

內痔治法

痔瘡諸方

增廣驗方新編卷七

後陰

截腸怪病 大腸頭出寸餘痛苦難忍乾則自落又出名曰截腸腸盡則不治初發時用盆盛真脂麻油坐大

浸之另飲火麻仁汁數升而愈

大腸蟲出不斷 鶴虱末錢五調水服自愈

肛門生瘡 肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡好白蜜斤猪胆一枚取汁和勻微火煎乾作條三寸長候冷塗油

納入肛門卧下少時必裏急後重通泄而愈○又方 雞內金即雞肫一枚燒存性為末乾敷其效如神○又方

枳壳炒 槐角各三錢 黃芩 生地各二錢 川連半錢 穿山甲炒 蒲黃 殭蠶各一錢 分作二帖煎服

蟲食肛門 蟲食糞門肛破腸穿痛癢無時旁生孔竅用 蜣螂又名推車蟲又新牛糞錢五肥羊肉兩炒黃同

搗成膏為丸如蓮子大烘熱綿裏納肛門中半日大便中即有蟲出數次即愈 又方 癩蝦蟆一個雞骨一

燒灰敷之大效終身忌食蝦蟆

糞門形如風癰作瘡破流黃水浸淫遍體 當歸錢五巴豆三錢用香油熬枯漉淨藥渣入黃蠟兩共化離火再

入輕粉錢二攪勻捺之神效 又方 銀青散見癰毒諸方門敷之最妙

肛門奇癢難受 蛇牀子 棟樹根各三錢 防風二錢 甘草一錢 皂角五分共為細末煉蜜成條塞肛門聽其自化一

二次即止癢而愈真神方也幼時被人戲弄致有此病者尤為效驗

大便小便不通外治各方凡大便閉結無論虛熱皆可通用

大便虛閉 連鬚葱頭三個 姜塊鹽錢 豆豉十餘粒搗作餅烘熱敷臍中搗定良久氣通即愈不通再敷必效○又

方 食鹽炒熱填臍眼文火燒五次即通○又方 凡大便不通多因寒熱不清用老薑寸許如指頭大加

紙包裹火內煨熱取出蘸麻油塞糞門內快則半日遲則一日必通此方最妙不可輕視○又方 張仲景

傷寒論云陽明病自汗小便反利大便不通者津液內竭也用蜜二合銅器中微火煎之乘熱捻作條大如

指長寸半許候冷塗油納糞門中少頃即通或加 皂角細辛為末少許和蜜作條其效尤速屢試如神○

又方 松子仁 柏子仁 芝麻油去 各等分研如泥白蠟和丸梧子大每服五十丸黃芪煎湯下凡大便

先硬後稀者乃脾虛也服此更效○又方 蘇子 芝麻各半合妍極細用水再研取汁一碗煮粥食此方

最穩其效如神凡老人氣虛或久病或產後不能用藥者用此更妙○又方 有人大便裡急不通小便短

澀而黃服以瀉火通利之藥總不見效後服六味地黃湯加附子錢一肉桂五一服而愈此因虛寒氣不傳送

故也凡患此症審明如非實火宜服此服之必能見效愈後宜服金匱腎氣丸無好肉桂以炮姜代之六味

金匱各方均見內外備用諸方

大便熱閉 或口渴或小便短澀黃而燥者是用小竹管插入糞門三寸用猪胆汁加好醋少許由管內灌入

神效又前大便虛閉外治二方亦可用○又方 牽牛子為末用皂莢熬膏為丸梧子大每服七丸或十丸

即通有人體肥腸結每十日大便一次閉塞不通百藥不效後用此方而愈不可因牽牛性烈而忽之也○

又方 芝麻二大黃二錢二好茶葉錢五共研末溫水沖服○又方 桃花辦一大撮用滾水半碗沖服鮮者更佳

或採來陰乾以備急用亦可 又方 叭咀杏仁 松子仁 火麻子仁 柏子仁錢各三搗爛滾水沖蓋片

刻當茶飲或加甘蔗汁半杯更妙老年人或患癰毒大便閉結者服此最妙此林屋山人經驗方也吸鴉片

人腸閉燥結者用生地五錢銀花錢一泡湯浸打汁涼服甚效

大小便閉塞不通 大皂角燒存性為末粥飲下三錢或以酒和丸梧子大酒下三十丸或以病人坐桶上燒

皂角烟薰自通○又方 苦楝子 茴香 穿山甲各八牽牛子鹽水炒煎服有人大小便不通不能坐臥

立哭呻吟七晝夜百藥不效服此三劑全愈此方妙在多用牽牛以其能達右腎命門走精隧故奏效如神

人多以為性烈棄而不用不知施之得當自能有益無害也○又方 皮硝三錢水化開香油一小皂角末五共

入猪尿胞內用竹管一頭入胞口內用線繫緊一頭安穀道內用力一擠其藥入臟即通○又方 六七月

時尋牛糞中大蜣螂十餘枚又名推車蟲線穿陰乾收之臨時取一個全者放淨磚上四面以炭火烘乾當

腰切斷如大便不通用上截小便不通用下截二便不通全用各為細末井華水調服○又方用桐油子個

批桐油之桐子先將蒂頭或水或酒或水或酒煖熱飲之即通如通不止者即射桐油或水或酒煖熱飲之即止此效如神○又方 雄鼠糞兩頭研末

納臍中○又方 蜂房燒末酒服二三錢日二服不拘大人小兒皆治

大小便不通尾脊骨上下左右疼痛 方見筋骨門

大小便熱結不通 大田螺三個搗爛加青鹽三貼臍下一寸三分即通

大便下血 名曰腸紅又名腸風用 猪尾腸八洗極潔淨以白蓮肉二兩去心灌入用線紮住兩頭煮極爛

取蓮肉少加白鹽日食二三次兩日內血即止而食亦漸加矣猪腸食與不食均可照食七日另用歸脾湯

為丸見內外備用諸方日日服之即可斷根不服歸脾丸照前煮蓮肉日日食之亦斷根有人下血多年時發時愈

百藥不效後服此方永不復發真神方也○又方 豆腐未嘗入袋取漿者炒老黃色攤冷每空心服錢三三服三次

血紫者白洋糖調服血紅者紅沙糖黃糖亦可調服雖患多年面色黃瘦垂危者亦極神效平日多服地黃而下

血者百藥難治用此最效○又方 有人大便下血百藥不效勢甚可危後食辣椒又名青椒五六兩一頓食完食少不效不辣亦

不食後下血更多因此斷根人多以辣椒性熱豈知此物能去大腸之熱故奏功如神也○又方 蠶豆葉

把一大搗融熱酒冲入去渣服一碗二三服即愈有人便血垂危百藥不效服此遂愈○又方 黑豆微炒搗

碎泡水酒飲立效○又方 絲瓜藤又名水瓜燒枯研末淡酒冲服神效○又方 淋症門蜜炙羅蔔方亦

效○又方 真桂圓肉二十個南棗十四個白木耳兩好白蜜四兩煎服三次即愈因虛便血者神效○又方 蓬

大海二個開水泡發去子加水糖調服甚效因熱便血者甚效○又方 酒煮鯽魚常食最妙○又方 用寒

藥熱藥及補脾藥俱不效用山楂肉為末艾葉湯調下應手而愈或掌薺搗汁兩酒杯兌好酒服數日即愈

○又方 凡下血好而復發不能永除者用久蒸黑芝蔴細細嚼食二兩日食數次服至數月不但下血斷

根且能補腎益精久服百病不生功效難以盡述

大便下血百藥不效日久不愈 恐是休息痢照痢症治自愈

大便下五色膿血 此腸癰也照腸癰方治

大腸蟲出不斷 方見上後陰門

泄瀉

寒泄 胡椒末和飯作餅敷貼臍上或熱柴灰布包敷 或炒鹽敷 或糯米酒糟和鹽炒敷 或酒炒艾絨

作餅敷 或胡椒大蒜作餅敷 或艾葉炆心土門斗灰吳茱萸共為末醋炒敷均效

久泄不止 燒天樞二穴離臍邊左右各二寸是氣海穴臍下寸半是雖泄久垂危不止亦效燒法大蒜辦切片安穴上用艾

葉一小團如豆大在臍上燒之或用燈草一根蘸油點燃燒之亦可不如艾火之妙艾火每穴可燒三次燈火

只燒一次○又方 大蒜搗貼足心或貼臍中此千金方也○又方 大蒜鬚加銀硃搗敷臍眼內立止

如神○又方 木鼈丸並治痢疾 上木鼈半斤母丁香四粒麝香一分共為細末并水調為丸如黃豆大納臍中

外用小膏藥貼之立止○又方 新開桃花用針刺取數十朵經手不可麝和作餅煨熟食米湯送下服後其瀉

更甚昏困異常瀉一二日後再飲凉水立止一人因傷酒有積滑泄數年百治不效用此愈○又方 車前

子鹽水炒七次真山藥炒真雲苓各二兩炙甘草六錢共為末每服二三錢炒湖米煎水調服烏梅湯更妙此神方也○又方

黃丹飛過枯礬 黃蠟各一兩將蠟溶化小銅器內以丹礬二味細末投入乘熱為丸如豆大每服二九空

心白滾水下一切久瀉諸藥不效服此一劑即愈○又方 芡實 淮藥各二兩交猪肚蒸服即愈○又方

白朮一兩車前子五錢煎服立止此分水神方也 或車前子一味煎服亦可脾腎虛寒者忌服○又方 燒薑

丸治小兒泄瀉不止雖至面黑氣息奄奄者亦立效回生並治泄出食物不化 沉香 木香 公丁香

花椒 官桂 乾姜 紅飯豆扁而微紅者是砂仁各四研為末煮紅棗肉為丸仍以紅棗肉包之再以麝裏煨熟

須看火色俟黑烟轉為藍烟即取出米湯送下

五更瀉瀉 每至五更即瀉瀉一二次經年不止者名為腎瀉此陰盛也用 五味子去梗二兩吳茱萸湯泡七次五錢同

炒香為末每早陳米湯服二錢或為丸服亦可服完一料即愈不愈即係陰虛用後五神丸治之 五神丸

昂治五更腎泄久不愈者以此丸補命門相火即以補脾也 破故紙炒酒浸蒸四兩核桃肉去皮四兩五味子炒三

兩 吳茱萸鹽水炒一兩生姜煮棗為丸胡椒大每服三錢臨臥鹽湯下

老人五更瀉瀉 蓮米散 黃耆米炒三合蓮肉三兩猪苓 澤瀉炒白朮土炒各五錢木香錢半白沙糖一兩乾姜二錢用濕

紙包共為細末每服三錢空心白湯下其效如神此方簡便不大費錢有老親者切宜留心

老人虛瀉 肉豆蔻三錢 麩研末 乳香一為末 陳米粉煮糊為丸 梧子大每服五七十丸 米湯下極效

脾虛泄瀉 白米土炒 白芍各一兩 冬月加煨肉豆蔻五錢 共為末飯丸梧子大每服五十九丸 米飲下 日二服甚效

腎虛久泄 破故紙焙乾 用猪腰子一錢 去白筋油膜破開將故紙末裝入裏緊蒸熟不用水 食二三自愈極效

效

脾泄不止泄出食物完穀不化小兒科症可治驗 凡大人小兒泄瀉食物不化胃無火也是胃陽虛 生白

木 真雲苓各二錢 川厚朴姜汁炒 砂仁 陳皮各一錢 生益智半錢 水煎數服即愈 屢用皆效 又方 參朮散七

味豆蔻散均見症 俱極神效 又方 柿餅燒紅放地上用碗蓋住不蓋則成灰無性 俟冷研末米湯調服二錢

即愈有一小兒由六歲至十二歲泄瀉食物不化百藥不效服三次全愈

腹脹泄瀉不止痢物不化 此胃寒也用 益智仁二錢 裏煨之煎服立愈

泄瀉不止腹有硬塊不治 此症有氣滯血滯之分一人患此照氣滯治之不效後用 桃仁 大黃 芒硝

甘草 桂枝 白芷水煎服數劑而愈

小兒水瀉不能服藥痢疾亦治 巴豆三粒 黃蠟三錢 共搗爛成膏貼臍上用絹帕縛住半日即愈如噤口不食者加麝

香麝用前藥同貼 又方 香白芷 乾姜各一錢 共研細末以蜜為膏先用酒洗臍溫微熱後貼膏用鞋底

烘熱尉膏上氣通即愈

泄瀉口渴 七味白木散見三 屢試如神

痢疾第十七番草烏末藥方雖休息痢數年者服數次無不奏效惟忌久且重者分兩宜酌加耳

痢疾最忌黃連服則倒胃難治然倪涵初先生痢疾三方均有此味似不相宜胃弱者宜斟酌用之

痢疾三方鮑氏之論固屬慎重然崇當按倪方合數百劑施送服者皆如鼓應桴誠良方也 痢為險惡之症生死所關不惟時醫治之失宜而古今

治法千家多不得其道是以不能速收全效今立方何以為奇不泥成法故奇也立論何以為妙不膠成說

故妙也然其藥品又不外乎當用而已有識者切不可更張勿為庸醫所悞導而用之百試百效者也初

起煎方 川黃連去蘆條 黃芩 生白芍 山查肉各二錢 陳枳壳去穢 紫厚朴去皮 堅檳榔 青皮去穢 各

增廣驗方新編正集 卷七 痢疾 上海錦章書局石印

當歸 甘草 地榆各五錢 紅花三錢 桃仁去皮尖研 南木香三分 水二碗煎一碗空心服渣再煎服此方或紅

或白裡急後重身熱腹痛者俱可服如單白者去地榆桃仁加橘紅四錢 木香三錢 如滯澀甚者或加大黃二錢 用

酒拌勻炒服一二服仍除之若一劑滯澀已去不必再服矣古方用之三五日神效用之於旬日亦效惟十

日半月外則當加減矣另詳於左 加減煎方 川連 黃芩 白芍各酒炒 山查肉一錢 橘紅 青皮 枳

榔 地榆各四錢 甘草三錢 當歸五錢 桃仁粉 紅花三錢 木香二錢 水二碗煎一碗空心服渣再煎服如延至月

餘覺脾胃弱而虛滑者法當補理具方於左 補理煎方 川連 條苓各酒炒 芍藥四錢 橘紅六錢 全當歸

人參無則高麗參亦可 白朮土炙 草各五錢 水煎空心服渣再煎服 以上三方隨用輒效其有不效者必初時投

參朮等補劑太早補塞邪氣在內久而正氣已虛邪氣益盛纏綿不已欲補而澀之則助邪欲清而疏之則

愈滑遂至於不可救藥雖有奇方無如之何則初投溫補殺之也如婦人有胎者去 桃仁 紅花 枳

等味

微理妙論 古今治痢皆曰熱則清之寒則溫之初起熱盛則下之有表症則汗之小便赤澀則分利之此五

者舉世信用如規矩準繩之不可易予謂五者惟清熱一法無忌餘則犯四大忌不可用也今詳於後 一

曰忌溫補痢之為病由於濕熱蘊結膠積於腸胃中而發宜清邪熱導滯氣行瘀血其病即去若用參朮等

溫補之藥則熱愈盛氣愈滯而血亦凝久之正氣虛邪氣盛不可燎矣此投溫補之禍為最烈也 一曰忌

大下痢因邪熱膠滯腸胃而成血薄渠維塞相似惟用磨刮疏通則愈若用承氣湯大下之譬如欲清壅塞

之渠而注狂瀾之水壅塞必不可去無不岸崩隄塌矣治痢而大下之膠滯必不可去徒傷胃氣損元氣而

已正氣傷損邪氣不可除壯者猶可弱者危矣 一曰忌發汗痢有頭痛目眩身發寒熱者此非外感乃內

毒薰蒸自內達外雖有表症實非表邪也若發汗則正氣既耗即邪氣益肆且風剝燥熱愈助熱邪表虛於

外邪熾於內鮮不斃矣 一曰忌分利利小便者治水瀉之良法也以此治痢則大乖矣痢因邪熱膠滯津

液枯澀而成即如用五苓等藥分利其水則津液愈枯而滯澀愈甚遂至纏綿不已則分利之為害也若清

熱導滯則痢自愈而小便自清又安用分利為哉予於此一症素畏其險惡用心調治經今二十餘年百試



分。且粘滯腸胃。急難推動。若冠伐太甚。必傷元氣。此方功能推刮積滯。而不傷損。無論寒熱虛實。至穩至當。百發百中。○又方 元胡索末錢三酒調服。有人年五十餘。下痢腹痛。欲死。棺木已備。服此而愈。○又方 真

川厚朴錢一煎服。一日三次。兩日即愈。神效。○又方 生藕節搗爛。酒沖服。極效。○又方 金銀花五錢研末

不論紅白。用開水調白糖空心服。服後其痢更甚。兩日全愈。奇效無比。小兒一歲服一分。○又方 山查炭

研末紅痢加白蜜為丸。白痢加紅糖為丸。紅白痢加蜜與紅糖為丸。空心白開水湯下。大人每服八錢。小兒每

服三錢。一日服三次。三日全愈。山查能去積補脾。無論虛實。久近。屢試屢效。不可輕視。○又方 陳細茶葉

山查炭 紅沙糖 白沙糖錢三老姜錢一煎服。一日服盡。即愈。甚效。○又方 木耳兩一紅痢用紅糖炒。白痢

用白糖炒。紅白相並者。用紅白糖炒。服之極效。

裡急後重欲下痢而不出者是川厚朴錢一煎水調檳榔末。服奇效。或單服檳榔亦可。○又方 穿山甲焙枯研末。米

湯調下。三五服即愈。

痢疾先紅後白 名曰腸蟲。用 淮牛膝兩二搗碎。以酒斤一泡之。每飲一二杯。日服三次。極效。

紅痢不止 鹽梅錢一胡黃連錢一灶下土錢一共為末。茶調服。或單用鹽梅。好醋調服。亦妙。有人血痢百餘日。用此

而愈。屢試神驗。○又方 馬齒莧又名瓜菜搗汁半茶杯。兌蜂蜜半酒杯。空心溫熱食之。煮食亦可。有人患紅

痢數年。服之即愈。○又方 乾薑燒黑。存性。候冷。為末。每服一錢。米湯飲下。神效。○又方 穀樹皮又名荆構樹

芥等分為末。醋調服一錢。極效。

孕婦痢疾 雞蛋仁破一孔如指頭大。入黃丹五用銀簪攪勻。以紙封口。入飯甑內蒸熟食。神效。

噤口痢疾 生大附子錢一切片貼無根火上。俟熱貼病人臍上。冷則再換。立愈。取無根火法。用新石灰一團。冷

水淋下。自有熱氣出。○又方 雄黃 巴豆 硃砂 草麻子 麝香 各等分。搗為細末。和蜜為丸。如大

實大收好。不可洩氣。放眉心。以膏蓋之。一炷香久。腹內自響。即思飲食。去藥而愈。此人世傳妙方。百發百中。

活人無數。○又方 活蝦蟆一隻加上好麝香三搗勻。貼臍上。用布束半日。即思飲食。兩日全愈。○又方 細辛 肥皂略一葱三酒藥子伴大田螺一共搗成泥。敷臍上。候乾揭去。自能飲食。○又方 田螺 麝香

於連壳搗爛敷臍上○又方 黃瓜藤燒灰存性香油調敷臍上極效細霜之○又方 鐵秤錘或磚石燒

紅放瓦缸內好醋淬音入令病人聞之一日數次極效○又方 真烏梅斤打碎熬水十數碗入一桶內令

病人坐桶上週圍堵塞不令出氣使熱氣冲上蓋門如溫即洗其人即睡去隨扶令就枕待醒即思飲食先

以粥湯半盞食之少頃再食即半碗不宜飽食漸漸加食甚妙小兒烏梅減半用之此神方也○又方 點

眼法見前○又方 白蓮肉煮湯時服之即能思食石蓮更佳○又方 綠豆粉 白沙糖冷水調服其

效如神○又方 乾蘿蔔葉煎水加紅白糖服最妙或用新鮮蘿蔔煎湯服亦可○又方 陳久火腿骨煎

濃湯緩緩服其效如神○又方 子鴨一隻去毛只將肚皮割開肚中諸物均不動仰放大碗上蒸透只服

碗內流出自然湯不食鴨肉服後即能服藥吃粥此秘方也神效之至○又方 水鴨去毛與腸雜掛在厨

內近煮飯處臘乾愈久更妙每服一大塊煎湯飲之甚效○又方 用金絲鯉魚一尾重一二觔者洗淨照

常用監醫易安排畢入胡椒末錢煮熟置病人床前令聞香氣欲盡與之連湯吃一飽病即除根屢治有效

○又方 神曲炒 山查 白沙糖各二 川連一錢 真烏梅三 甘草五分 荔枝肉七 用水三大碗煎溫服且吐且

飲自然思食止痢此方屢試神奇活人無數不可輕視○又方 川烏草烏各等 放淘米水中泡四十九日

取出烘乾於石臼內搗成細末最忌鐵器每服七八分小兒每服三四分紅痢加白糖白痢加紅糖紅白相

兼者加紅白糖腹痛者加吳茱萸末少許此藥性雖猛烈但漂過四十餘日其毒已去分量亦輕且此症係由

胃毒內蘊所致非此藥不能見功神效非常百不一失

久痢不止 麻油煎鹹魚食數次甚效此方奇驗莫測其理

多年痢疾名休 凡痢症腹不作痛惟下膿血兼流黃瓣日久不愈此係平素愛食冷茶水酒所致取 活鱧

魚去腸雜 放瓦上焙枯成炭研粉每服錢 黃糖拌熱陳酒送下數服全愈不拘老幼無不神效忌食生冷水

酒海參海螵等物此林屋山人經驗方也○又方 真烏梅煎水紅白糖調服大有功效或用烏梅煎洗之

法見前亦效○又方 凡痢疾多年不愈其積日久下墜竟至大腸下口直腸下口交界之地有小曲

指隱匿於此為腸臟最深之處藥所不到之地症則乍輕乍重或愈或發便則乍紅乍白或硬或溏任是神

鴉旦子去以桂元肉包之大人每包粒多

則七包少則五包小兒每包三粒多則五包少則三包空心滾水吞下隨服乾飯一二碗俟大便秘行時有白

痢如魚腦者即冷痢之根如無白痢一二日後再服一次或加數粒亦可此後不必服矣戒食生冷諸物及甲魚海

參海蜇皮蛋鴨肉三月戒葷酒五日永不再發雖十數年不愈者無不神效服至一二日後如腹中作痛用

白芍一根甘草一根俱重三錢紙包用水浸濕火內燒熟取出槌爛煎水服立愈○又方豆腐醋煎常常

服之甚效○又方數十年古松樹上皮研細末稀粥和服一碗日服三次三日必愈○此方治霍亂吐瀉

及角弓反張一切痧症上吐下瀉每日百數回一時昏倒在地牙關緊閉速即照方煎服覓得此方服藥立

愈每逢醫士西黨姜汁不用此致誤事不少木瓜三錢扁豆二錢藿香一錢赤苓三錢杏仁二錢甘草一錢砂仁一錢製厚

朴錢一焦木二錢西黨一錢法半夏二錢五分杜前土錢五分加姜汁二匙井水煎服立效

脫肛大腸頭自裏是錢五分

大腸脫肛不收身有螺蚌壳頭有雙鬚者豬油調敷立效桑樹蝸牛更好○又方脚魚頭焙枯研末

麻油調敷或以紙托患處補效○又方大螺蛭一個入頂上梅花冰片分即時水出敷之甚效○又方蟬

退研末香油調搽奇效無比○又方大蜘蛛一個去頭足瓦上焙枯研末燈油調敷半刻即收神效○又方

生鐵斤水煮濃汁日洗數次雖脫肛多年亦效○又方單麻子粒七去壳搗爛敷顯門上少刻即收收後

務即將藥洗去有人脫肛三月一敷即愈○又方樛上灰塵或倒吊塵亦可同鼠糞燒煙於桶內坐上薰之數次

即止○又方後小兒脫肛辣椒方百藥不效服之即愈

小兒脫肛凡小兒脫肛不收久則堅硬難入用蓮鬚意煎湯入桶內坐上乘熟薰之隨後慢慢洗軟再照

以上各方用藥敷之即上○又方五梧子為末鋪紙上捲成筒燒燃放便桶內令其坐上使煙氣薰入肛

門自上或用五梧子煎湯薰洗亦可後將白礬末搽肛門上可不再脫○又方辣椒又名青椒又名辣子多食極效有一小兒脫

肛數月百藥不效後食辣椒數次肛即縮上並不再脫屢試如神此物味宜辣食宜多食少而不辣者不效

痔瘡

凡人九竅中有小肉突出為痔故有耳鼻牙痔等名不獨肛門一處也肛門痔有數種狀亦不一未破曰痔已破曰漏

一肛門邊生數瘡腫而突出膿破即散者牝痔 一肛門邊露肉如珠如鼠如乳時流膿血者牡痔

一腸口顆顆發癰且痛且癢血出淋漓者脉痔 一肛門內結核有血或發寒熱每過大便脫肛者腸痔

一酒醉即腫痛流血者酒痔色痔相同 一每過大便血流不止者血痔

一肛門腫痛遇怒即發怒息即安者氣痔

痔瘡難忍 蠟子不拘多少燒煙薰之極效

痔瘡難忍 木鱉子水磨濃搽陳醋磨之更妙初覺痛甚少頃即止痛消腫神效之至或用紙浸汁貼之亦可○又方

蝦蟆頭陰乾燒烟薰之奇效○又方 鼻涕蟲形似蝸牛而無壳者即是搗爛和陳黑敷之極效

內痔不出 草烏為末口水調點肛門痔即反出乃可用藥敷治

內痔腫痛 猪大腸六蚯蚓十餘條又煮融去蚓食腸極效

內痔治法 內痔有大如茶杯形如一箇音莖從箇心而出痛極上面如盆四邊高中心陷下如箇根莖後用

溫水洗淨以洞天膏見癰毒諸方門攤如菜碗大中剪一孔以一邊煎開熟錫茶壺上盪融套箇根下貼實門四邊

圍護好肉免沾藥汁用枯痔散見後一二分口水調用筆敷箇之外面四旁日夜二次箇之中心通莖門眼

不可敷藥數則大痛難忍一二日毒水流出國亦漸縮而軟再敷一二日漸硬而黑箇邊亦漸脫落然後每

藥一錢再加硃砂一分照前調敷敷至箇根落盡全愈屢試如神此林屋山人極驗方也

痔瘡諸方 枯痔散 紅砒放舊瓦上火煨白烟枯礬二錢真烏梅肉二錢燒存性硃砂三分共研極細末用時以口

浸濕手指蘸藥於痔頭痔身上搓擦一日三次初起不腫五六日出臭水出盡痔乾枯不用上藥輕者七

八日全愈重者半月收功諸痔皆效自有此藥世上斷無不愈之痔人多以砒霜毒藥不肯敷用不知此藥

有斷根之功且只一錢有益無損切不可疑而自悞也 消管丸 苦參四川連酒炒當歸槐花 萆澄

茄各一五倍子錢五各為細末用小鱉二個約重真柿餅四兩二味共煮溶去鱉骨搗爛入前藥末搗為丸每空

心服四錢滾水送下其管自出此林屋山人經驗方也 胎元七味丸 專治痔漏不拘遠年近日膿血通

腸者服之化管除根此方傳自異人屢試神驗直奇方也 男孩臍帶三個瓦上陳棕七錢數十年者犀牛

黃三槐角子五錢肥大者瓦上焙乾存性刺蝟皮三錢象皮四錢地榆三錢共研細末酥油為丸如麻子大者不成丸加

糯米粥少許即成每服空心白滾水下三日化管止痛七日平滿血清膿止十日除根 除痔丸 當歸

川連 真象牙末 槐花各五錢 滴乳香各二錢 露蜂房一個槐樹者佳 共為末黃蠟二錢溶化入藥末為

丸每空心服三漏蘆煎湯送下至五日漏孔內退出肉管待二三指長剪去再出再剪管盡肌生而愈神效

之至 完善丸 專治痔漏去管生肌 夏枯草八兩甘草節四兩連翹四兩為末金銀花一斤煎濃湯為丸每晨

鹽湯送下錢初起者一料全愈久者兩料除根○又方 白煮整雞蛋蘸真象牙末不效空信服之每日

二次有人患痔二十餘年服至半月斷根○又方 榕樹上吊生之鬚五兩此樹惟兩廣福建有之皮硝五錢煎水放瓦

罇內乘熱坐上先薰後洗數日即愈可以斷根極效○又方 小茴香二錢研末泡水服輕者數次即愈極效

○又方 脫肛門內辣椒方最為神效

如神千金方 好信石黃明者用三錢打如豆子大明白礬一兩研末好黃丹五錢蟬梢七個洗淨瓦上焙乾為末草烏光實者去皮生研五錢右藥用

紫泥罐先將炭火煨紅放冷拭淨然後下明礬燒令沸次下信石入礬內拌勻文武火煨候沸再攪勻次看

罐通紅烟起為度將罐撥下待冷研為末方入黃丹草烏蟬梢三味再同研極細收好將痔瘡用甘草湯洗

淨患處然後生麻油調藥以鴨毛掃藥痔上每日敷藥三次必去黃水如膠汁則將痔頭漸消年遠者不出

十日消盡日近者數日化為黃水連根去盡再搽生肌之藥全愈此方五痔皆可治珍之寶之○又方 吳

芙蓉根煎水用瓦罐盛之乘熱先薰後洗數次除根吳芙蓉葉大如桐而厚上面青黑色而光背紫色而毛

氣味極臊六七月間開小紫花簇疊纏纏成叢陰濕處多有之緣前方榕樹上吊生之鬚恐江淮間難得故

補此以取效而簡便也 鏡堂新增

兩股

坐板瘡

股上生瘡

海底在肛門前陰根後兩相交界之處

縣癰

腿部

脚氣腫痛

脚氣外治法

脚氣衝心

脚氣腿脛紅腫

酒風脚

腿足腫痛拘攣

兩膝疼痛

膝上生癰

腿膝疼痛不能舉步

人面瘡

脚上轉筋暑天腹痛轉筋名霍亂症見霍亂門

腿痛轉筋氣衝入腹

腿面腫瘡

腿脚浮腫破爛似膝瘡而非膝瘡

腿上升瘡破爛多孔

腿足忽然紅腫熱痛或時上時下或爛或不爛

面痛極不紅不腫

大腿外內生疽

小腿腿肚生癰

腿瘡難忍

腰臂腿膝疼痛不已

腿足不能起立能食易飢

兩腿不能動作臥床不起

足軟難行

足部

脚氣腫痛

腿足軟弱

酒風瘡

傷寒足痛

兩足痛如刀割

足生疙瘩音隔腫脹骨痛

脚上冷疔初起紫白泡痛疼徹骨漸至腐爛深孔紫黑

黑色水腥臭日久不愈

內外脚蹠生瘡

脚甲腫爛疼痛

脫骨疽

脚了奇癢難受

脚了爛瘡

脚趾縫中生毛痛不可忍

脚根作痛

足生癰如斗大

脚底瘡有細孔日久不愈

脚底生瘡

脚底生瘡穿爛

脚底皮肉生泡痛難行

脚心腫起堅硬如鐵不能履地膝上毛孔時時流水身發寒戰惟思酒食

手足心俱腫

脚心生瘡

脚板色紅如火不可落地

脚底木硬

脚底開裂

遠行健步

脚上生瘰

暗切忌用刀

脚生雞眼

脚臭脚汗

脚冷如冰

行路脚底生泡