



濟陰綱目卷之十

關中 武之望叔卿父輯著 武林 徐弘衍瑤璋父訂正

西陵 汪淇憺濟子詳釋 天都 查 望于周父參閱

○臨產

○論臨產調理法

原有產圖在不載錄亦共由法也

催生藥切不可早若兒未轉身宜以補血為主而寬氣佐之

中指屬心胞絡也

固血之說宜玩

八珍益母配法服法俱佳

固血如開水放舟最穩當

大全云。凡妊娠至臨月。當安神定慮。時常步履。不可多睡。飽食。過飲酒醴雜藥。宜先則產圖。依位密鋪床帳。預備老練穩婆。備辦湯藥器物。欲產時。不可多人喧鬧惶惶。但用老婦二人扶行。及凭物站立。若見漿水。腰腹痛甚。是胎離其經。令產母仰卧。令兒轉身。若兒頭向產門。方可用藥催生坐草。若心煩。用水調服白蜜一匙。覺饑。喫糜粥少許。勿令飢渴。恐其力乏。不可強服催藥。早於坐草。慎之。

薛氏曰。欲產之時。覺腹內轉動。即當正身仰卧。待兒轉身。向下時。作痛。試捏產母手中指中節。或本節挑動。方臨臨盆。即產矣。若初覺不仰卧。以待轉胞。或未產而水頻下。此胞衣已破。血水先乾。必有逆生難產之患。若胎衣破而不得分娩者。保生無憂散以固其血。自然生息。如血已耗損。用八珍湯料一觔。益母草半觔。水數十碗。煎熟。不時飲之。亦有得生者。凡孕婦只腹痛。未產也。若連腰痛甚者。將產也。蓋腎候於腰。胞繫於腎故也。凡孕家宜預請有仁心知事穩婆。當以恩結其心。先與說知。倘有生息不順。只說未產。或遇雙胎。只說胎衣未下。恐驚則氣散。愈難生息。余家親驗之。大抵難產。多患於鬱悶。安佚富貴之家。治法雖云胎前清氣。胎後補血。不可專執。若脾胃不實。氣血不充。宜預調理。不然。臨產必有患難。

○論臨產催生法

大全云。大凡生產。自有時候。未見時候。切不可強服催生滑胎等藥。或勢不得已。則服之。又云。切不可坐早。及令穩婆亂動手。凡催生藥。必候腰痛甚。胎轉向下。漿水破方可服。大法。滑以流通滯滯。若以驅逐閉塞。香以開竅逐血。氣滯者行氣。胞漿先破。疾困者固血。

丹溪云。催生只用佛手散最穩當。又効捷。

血暈血溢以水解之
在暑月尤宜餘月亦
無害惟少與之

止案解飲最穩當可
法

○論難產由於安佚氣滯

大全云。婦人以血為主。惟氣順則血和。胎安則產順。今富貴之家。過於安逸。以致氣滯。而胎不轉。或為交合。使精血聚於胞中。皆致產難。若腹或痛或止。名曰弄胎。穩婆不晤。入手試水。致胞破漿乾。兒難轉身。亦難生矣。凡產直候痛極。兒逼產門。方可坐草。時當盛暑。倘或血暈血溢。當飲清水解之。冬末春初。產室用火和燠。下部衣服尤當溫厚。免致胎寒血結。若臨月洗頭濯足。亦致產難。

○論難產由於氣虛不運

丹溪曰。世之難產者。往往見於鬱悶安佚之人。富貴奉養之家。若貧賤辛苦者。無有也。古方書止有瘦胎飲一論。而其書為湖陽公主作也。實非極至之言。何也。見有用此方者。其難自若。予表妹苦於難產。後遇胎孕。則觸而去之。予甚憫焉。視其形肥。勤於針指。回思旬日。忽有悟曰。此正與湖陽公主相反。彼奉養之人。其氣必實。耗其氣使平和。故易產。今形肥。知其氣虛。久坐知其不運。必氣愈弱。兒在胞胎。用母氣不能自運耳。當補其母之氣。則兒健易產矣。今其有孕。至六七月來告。遂以大全方紫蘇飲加補氣藥。與數十貼。因得兒而甚快。後遂以此方。隨母形色性喜。參時令。加減與之。無不應者。因名其方曰達生散。

○論難產由於血滯血乾

郭稽中曰。產難者。因兒轉身。將兒枕血塊破碎。與胞中敗血壅滯。兒身不能便利。是以難產。急服勝金散。消其血。使兒自易生。陳無擇云。多因兒未轉順。坐草太早。或努力太過。以致胞衣破而血水乾。產路澀而兒難下。宜先服催生如神散。以回其血。設或逆生橫產。當用前法針刺之。

大全云。治胞漿先破。惡水來多。胎乾不得下。須先與四物湯。調養氣血。次煎濃葱湯。放冷。令穩婆洗產戶。須是款曲洗。令氣上下通暢。更用酥油滑石末塗產口裏。次服神妙乳硃丹。或葵子加聖散。

○楊子建十產論

一曰。正產者。婦人懷胎十月滿足。忽腰腹作陣疼痛。相似胎氣墮。至於臍腹痛極。乃至腰間重痛。穀道挺出。繼之漿破血出。兒自逆生。

繫抱則兒不能轉生
裁不可

此學養子法也可於
平日令兒女子熟聞
之

補正氣確是良工有
用人參五錢催生最
妙

如見此症可用凉水
水噴面催之

母身弱而倒產者當
服補藥若用力早者
又當別論

二曰傷產者蓋因人之生陰注陽定各有時日不可改易今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產却仍無事是名試月非正產也但一切產母未有正產之候即不可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却教產母虛亂用力兒身繞方轉動却被產母用力一遍使兒錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母用力未當之所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼產戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗助長無益而有害矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀道挺逆已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產之正氣今兒速得下生四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當滿房者人常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流散使兒易生

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭疼面赤昏如醉乃至不知人事

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一遍遂至身橫不能生下當令產母安然仰卧後令看生之人先推兒手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產母仰卧然後推兒直上徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生

七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉使直下先露其足當令產母仰卧令看生之人推其足入去不可令產母用力分毫力亦不得驚恐使兒自順

八曰偏產者兒身未正產母用力一遍致令兒頭偏在左腿或偏右腿故頭雖露偏在一畔不能生下在當令產母仰卧次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏在穀道只露其額當令看生之人以綿衣炙溫裏手於穀道外輕輕以推兒頭正使令產母用力送兒生也

九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下

收腸法妙絕

不孔不產也。良鴿是連藥其根惡毒者考本草並無催生語。然其毒惡亦或感其毒氣而胎下也。粥可飲者以其煩也。又涼則性降。本草楓葉亦能催生。今村婦亦每用之。臨月洗浴。第不知胃氣不足者亦可用否耳。法術神奇罕見聞耳。

茶飲即車前或用草亦可性最溫和故君之

產法治驗法奇而正妙妙

十曰坐產者。兒將欲生。其母疲倦。久坐椅褥。抵其生路。急於高處繫一手巾。令產母以手攀之。輕輕屈足坐身。今兒生下。非坐在物上也。

十一曰盤腸生者。臨產母腸先出。然後兒生。趙都運泰人。每產則大腸先出。然後產子。產後其腸不收。甚以為苦。醫不能療。偶在建昌。得坐婆一法。而收之。其法以醋半盞。新汲水七分。調停。嚥產母面。每嚥一縮。三嚥盡收。此良法也。

○產難治驗

淳于意治菑州王姜人懷子而不乳。召于意往。飲以良鴿藥一撮。以酒飲之。旋乳。意復診其脈。而脈躁。躁者有餘病。即飲以消石一劑。吐血。血如豆者三四枚。

滑伯仁治一婦難產。七日而不乳。且食甚少。伯仁視之。以涼粥一盃。搗楓葉煎湯。調啖之。旋乳。或詰其理。滑曰。此婦食甚少。未有無穀氣而生者。夫楓葉。先生先落。後生後落。故以作湯飲也。

龐安常治一婦產。七日而子不下。百治不効。龐視之。令其家人以湯溫其腰腹。具為上下拊摩。孕者覺腸胃微痛。呻吟間。生一兒。其家驚喜。而不知所以。龐曰。兒已出胞。但一手誤執母腸。不能脫。非符藥所能為。吾隔腹捫兒手所在。鉗其虎口痛。即縮手。所以遽生。無他術也。取兒視之。右手虎口。鉗痕存焉。

一婦累日產不下。服催生藥。不効。龐曰。此必坐草太早。心下懷懼。氣結而不行。非不順也。素問曰。恐則氣下。蓋恐則怯。精神怯則上焦閉。閉則氣逆。逆則下焦脹。氣乃不行矣。以紫蘇飲一服。便產。及治婦人子縣證。紫蘇飲見胎前脈滿

吳菱山治一婦產難。三日不下。服破血行經之藥。俱罔効。吳因製一方。以車前子為君。冬葵子為臣。白芷枳殼為佐。使煎服。遂產。東醫異之。吳曰。本草謂催生。以此為君。毛詩採芣苢。以防產難是也。

劉復真遇府判女。產不利。已斂。劉取紅花濃煎。扶女子凳上。以綿帛蘸湯。會之。連以澆帛上。以器盛水。又煖又淋。久而甦醒。遂生男子。蓋遇嚴冬。血冷凝滯不行。溫即產。見亦神矣。

一醫宿客店。值店婦產。數日不下。下體已冷。無藥其害。以椒橙茱萸等煎湯。可下手。則和臍腹。產門處皆淋洗之。氣

溫血行遂產

○論交骨不開

其有用攻下之藥而無益者以產母之大氣竭而神大也宜補之惡意虛則者朴硝同補劑下之何如

薛氏曰交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調攝以致血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芍歸湯補中益氣湯產門不開氣血虛也用十全大補湯

地官李孟卿娶三十五歲女為繼室姪娘慮其產難索加味芍歸湯四帖備用至期果產門不開止服一帖頓然分娩

上舍費懷德之室產門不開兩日未生服前藥一劑即時而產上舍傳此方用之者無有不驗

一婦人分娩最易至四十姪娘下血甚多產門不開與前湯一劑又以無憂散煎許煎熟時時飲之以助其血而產

○論胎死腹中

準繩云產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難胞漿已破無血養胎枯涸而死故也須驗產母舌

若青黑其胎死矣當下之大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤之危急者毒藥下之

一穩婆之女勤苦負重姪娘腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許服之隨下

利水而愈

一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以四物薑桂調補而愈

○臨產脈法附驗看生死法

脈經云懷妊六七月脈實太牢強弦緊者生沉細者死○脈勻細易產大浮緩氣散難產

脈決云欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分誕來朝日午定知生○身重體熱寒又頻舌下之脈黑

復青反舌上冷子當死腹中須遣母歸冥面赤舌青細尋看母活子死定難應唇口俱青沫又出母子俱死總教掩

面青舌赤沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢否不虛陳

○臨水東胎方

東胎丸 胎瘦易生服至產則已

白朮 枳殼各等分 右為末燒飯丸如桐子大八月一日食前服三五十丸溫水下

燒飯用荷葉煎湯更

加法俱妙甚

即東胎丸變法也若氣虛不足者當再酌之

此方為安逆氣旺者設

兩方互服固妙然與氣虛者非宜

氣實者宜之

幸于太峻恐非胎產所宜

達生散 孕至八九個月內服十數帖甚好易產

大腹皮錢三

人參

陳皮

紫蘇莖葉各五分

歸身尾

白朮錢各一

白芍藥錢各一

甘草錢各二

右切作一服入青葱五莖黃楊腦七個即黃楊樹葉精兒食少胎瘦者不須用

水煎服

或加枳殼砂仁

○春加川芎

○夏加黃芩

○秋加澤瀉

○冬加砂仁

○氣虛倍參朮

○氣實加香附陳皮

○血虛加當歸地黃

○形實倍紫蘇

○性急多怒

加黃連柴胡

○熱甚加黃芩

○濕痰加滑石半夏

○食積加山查

○食後易飢倍黃楊腦

○腹痛加木香官桂

又方 第九個月服

酒炒一兩虛弱人不宜涼藥者減半

白朮一兩

枳殼錢各一

滑石錢各七

用小便多者減此一味

右為末粥丸桐子大每服五十丸空心熱湯下

○氣實人宜服多則恐損元氣

滑胎枳殼散

姙孕七八個月常宜服滑胎易產

湖陽公主每產累日不下南方道人進此方

商州枳殼錢各二

粉甘草錢各一

右為細末每服二錢百沸湯點服日三服

○溫隱居加當歸廣木香各等分

○許學士云枳殼性苦寒若單服之恐有胎寒胎痛之疾以地黃當歸蜜丸佐之可也

有餘而內補丸補血不足也

內補丸

治姙娠衝任脈虛補血安胎與枳殼散間服

熟地黃錢二

當歸錢一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸溫酒或滾湯下

張氏方 治姙娠胎肥墮隘動止艱辛臨月服之縮胎易產兼治腸中諸疾下氣寬膈

枳殼錢五

甘草錢一兩

香附子錢三兩

右為末薑湯點服如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋疼痛者用葱白三寸

同煎服

○婦人脾寒血氣成塊作刺熱酒調服

○大小便不通用牽牛湯

保生無憂散

治姙娠身居安逸口厭甘肥憂樂不常食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢或瘦人血少胎弱臨產難

產八月服之則易生也

當歸

川芎

白芍藥

枳殼錢各一

木香

甘草錢各一

乳香錢各一

血餘燒存性另研各五分

石作一服水煎入乳

香血餘和勻不拘時服

神效丸 治骨利易產臨八月服之神功

通明乳香另研 枳殼麩炒 石為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心酒下

○難產催生方

三合濟生湯 以枳殼芎歸達生三方抽其精粹而成合此湯治臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

當歸錢三 川芎 枳殼麩炒各一錢 香附子炒 大腹皮薑汁洗各一錢半 蘇葉分 粉草分 右用水煎待腰腹痛

甚服之即產○一方加白芷一錢

佛手散即芎歸湯 治妊娠因事仆跌子死腹中惡路不行疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若子死腹中立便逐下若

腹痛隨止子母俱安又治臨產艱難胞衣不下及產後血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中血刺疔痛

血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭痛或似瘧非瘧一切胎前產後危急狼狽垂危等症

並皆治之○丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

當歸酒洗去三兩 川芎四錢一方各等分 右細判分作四服每服先用水一盞煎將乾投酒一盞半煎五七沸溫服如

口噤掣開灌之如人行五里許再灌一服盡此四服便立產神驗○如產難倒橫子死腹中先用黑豆炒熟入白

水童便各一盞用藥四錢煎服○如胞產五七日不下垂死及矮石女子交骨不開者加龜板并生育過婦人頭

髮燒灰為末每三錢酒調服

來麤散 治臨產用力太過氣脈衰微精神困倦頭暈目眩口噤面青髮直不省人事

木香 神麴 陳皮白去 麥蘗炒 黃耆 阿膠珠 白芍藥 苳根 甘草各三錢 糯米一合 生薑切碎

錢一 右剉細水煎挖口灌之連進為妙

黑神散一名催生神散 治橫生逆產其功甚大並治胎前產後虛損月水不止崩漏等證

百草霜 白芷不見火 右為末每服二錢以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒煎進二服熱血得黑

則止此藥大能固血又免血涸甚妙○一方加白滑石煎芎歸湯調下

催生立應散 治難產及橫生逆產
車前子 當歸各一兩 冬葵子 白芷各三錢 牛膝 大腹皮 枳殼 川芎各二錢 白芍藥一錢 右剉水煎

加白芷行血海之氣也

投酒之法更妙然看緩急用

立齋以交骨不開為陰虛虛為至陰板則又錯解故用之症亦危矣而參用人參當歸等藥且以神麴參牙陳皮為根者何蓋用力太過則胃氣乏矣故亟扶之救其胃氣又一活法也

熱入酒少許服立產。

榆白皮散 治妊娠滑胎易生。

榆白皮 甘草各二兩 葵子一兩 右為末每服五錢水煎服。○一方單用榆白皮焙乾為末臨月日三服方寸七。

今產極易。

如聖散 專治孕婦難產。

紫蘇葉 當歸各等分 右咬咀。每服三五錢用長流水煎服。

催生散 治難產并胞衣不下。

白芷 滑石 伏龍肝 百草霜各一分 甘草五分 右為細末用芎歸湯入酒童便各少許調服二次立効。

催生飲 治臨產生育艱難。

當歸 川芎 大腹皮 枳殼炒 白芷各等分 右剉水煎溫服。一方無大腹皮有益母草火麻仁。

催生湯 候產母腹痛腰痛兒胞漿水下方服。

桃仁炒去皮 赤芍藥 牡丹皮 官桂 白茯苓去皮各一錢 右剉一劑水煎熱服。

活水無憂散 專治十月已滿多因恚情及多喫熱毒之物瘀血相搏臨產橫逆之厄愴忙不謹觸死胎兒在腹服此一二貼加烏金丸二顆効如神。

益母草 急性子 當歸各四兩 陳枳殼兩 生地黃 蘇葉 赤芍藥各二錢 肉桂 川芎 陳艾各一錢

甘草分 活鯉魚個 右分作二服每服用水三碗先將魚入水坐火上略溫急取魚出魚死則難取効矣。後

下藥煎至二碗臨服之時加入好醋一茶匙每一碗和調烏金丸一顆如死胎不下急取無根水再煎藥相連服

二次。

烏金丸 一名七聖散 實散 臨產腰痛方可服。

當歸 玄胡索 香白芷 焙 白礬 薑黃 沒藥 桂心各等分 右為細末每服三錢燒梨頭令紅淬酒調

下。臨時一二服立產。

白礬固本亦固血之意耶

此以破血為主血實氣盛者宜之若今人不辨氣血虛是一概混用可笑 烏金丸失查附

不盛氣力治宿病而
車用大劑肉桂催生
此急因急急用法也
妙妙

即非橫生亦可服

此方簡當小便取其
破血又有濁陰下降
之理兩摩法更妙

元腦凡其來尚矣然
男左女右手推導出
骨末曾驗宜脫破後
藥至也不然脫未破
時準入腸胃何以能
此再詢之高明者

一方 治難產累日氣力多盡不得生此是宿有病者宜此方

阿膠二 赤小豆升 右以水九升煮豆令熟去滓內膠令烺每服五合不覺更服不過三服即出

勝金散 產難蓋因兒枕破與破血裏其子故難產但服此藥逐其敗血即自生逆生橫生並治之

麝香末一錢 鹽鼓一兩以青布裹 右每服一錢用秤錘燒赤淬酒下

一方 治橫生先露手足

阿膠炒 滑石各一 冬葵子合 右每服四錢水煎連進二三服○一方有酥油一兩

油蜜煎 治難產濕漿胎乾胎不得下

用香油蜂蜜小便各一碗和勻銅鍋內慢火煎一二錢涼去滓調白滑石末一兩或益草末攪勻頓服外以油蜂

蜜於母腹臍上下摩之或油煎一盞服之亦可○一方只用油蜜小便能下難產

兔腦丸一名催 治難產及橫生逆產

兔腦 臘月者去皮 明乳香二錢半 母丁香一錢 麝香一錢另 右研勻用兔腦髓為丸如雞頭大陰乾

油紙封裏每一丸破水後溫水下即產隨男左女右手手中握藥出

柞木引子 治產難或橫或倒治爛腹中腹悶服之

生柞木一大握長一尺 甘草大者五寸 石用新汲水三升半入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至一升

半候產婦腰重痛欲坐草時溫飲一小盞便覺心下開豁如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

催生如聖散 黃蜀葵子不拘多少焙乾為末熱酒調下二錢神効如無子花亦可○若胎漏血乾難產痛極者并

進三服良久腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可服之○如打撲免胎紅花酒下

歌曰黃蜀子炒七十粒細研酒調濟君急若還臨危產難時免得全家俱哭泣

催生如意散 治橫生倒產

人參 乳香各一 辰砂二錢一方 右為末臨產時急用雞子清一個調藥末再用薑汁調開冷服即時順

產子母無恙

此墜藥也未敢輕試

催生鉛丹 治橫逆難產 用黑鉛一錢將小銚子火上鎔化投入水銀一錢急攪結成砂子傾出以熟絹衣角扭

成丸子如菉豆大臨產時麝香水吞下二丸立下。

三退散 治橫逆難產子死腹中。蛇退一條 蟬退十四 人退即男子頭髮如蛋大一團 右俱燒灰為末分三服酒調下。

滑胎散 催生神効

益元散兩 蛇退一條燒 蟬退全者五 穿山甲一片燒 男子亂髮一團香 右為細末用蜜水一碗和

藥煎二沸入髮灰攪勻冷定服之立下。

一方 治產不順。蛇退全者 蠶退一條 右入新瓦瓶內鹽泥固濟火燒存性為末煎榆白皮湯調下一錢三服

覺痛便生。○一方用蛇退一條全者燒灰入麝香一厘酒調二錢面東服如橫生逆產以餘渣塗所出手足即順

也

神効乳砂丹 治難產

明乳香為末以猪心血為丸如桐子大砂砂為衣晒乾每服一丸嚼碎冷酒下良久未生再服○或以蓮葉蒂七

個水煎化服二丸良久未生再服○如胞漿先乾胎不得下急服大料四物湯滋其血氣并濃煎葱湯薰洗產戶

更用油燭塗產戶內却服前藥○如胎死不下用朴硝五錢滾湯調下或子育散一服送下如胞衣未下酒水服

一丸即下○產門不開用加味芎歸湯和服二丸○此藥靈驗如神合時須五月五日午時極妙或七月七日三

月三月及日初上辰日亦可。

一方 乳香砂等分為末麝香酒調下○又方通明乳香一塊如兒子大為末腰痛時用冷水醋少許調服扶立

令兩手拿石燕子二個念響靈藥聖過行數步坐草便生更無痛楚此法似迂用者云甚驗。

一方 乳香研細五月五日滴水丸如雞頭大每服一粒無灰酒下名開骨膏○一方 用大砂砂於端午晒起以

百日為度研為細末取臘月兔體磨丸如菉豆大欲產時粥飲下二丸良久便生其藥男左女右手中捏出晒砂

砂不得著雨。

如神散 催生累効靈驗於理固難通於事實殊効。

即免懸欠意

此急症亦不得已也

奇方益以銅墜為主
能產陰安信非虛語

先妙在椒洗法

此法用之不違何故

已立思傷肺

以寒散之亦是一法
然須因人而施毋妄
試也

益母不惟催生抑且
心痛有驗

用路上草鞋一雙取馬屎上繩洗淨燒灰童便和酒調下三錢一名十里馬此藥甚奇

小品方 療橫生倒產手足先出

用鹽鉞刺兒手足入二分許兒得痛正轉即縮自當回順而生○一方用鹽塗兒足底又可急加於手并以鹽摩產婦腹上即產

黃金散 治生產一二日難分娩者服之如神

真金箔大者五片小者七片以小磁鍾將水少許去紙入金在內用指研勻後再添水至十鍾一面先令一人扶產婦虛坐又令一婦人用兩手大指按定產母兩肩肩井穴前華溫服其胎立下○此催生聖藥如產水未足又安能之

勝金丹 治難產神効 敗龜毫筆一棧燒為灰研細搗生藕汁一盞下之立產若產母虛弱及素有冷疾者恐頭

藕冷動氣即於銀器重湯燒過後服

催生萬應不傳過仙丹

草麻子十四粒 雄黃錢半 蛇退一條 右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯淋洗

臍下安藥一丸於臍中用蠟紙數重覆上以潤帛裹之須臾生下急取去藥一丸可用三次

知聖膏 治產難并治胞衣不下兼治死胎

草麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞即下連洗去不則勝山却用此膏塗頂上臍自縮入○一方草麻子百粒

雄黃一錢細研如上法塗之○一方草麻子三粒巴豆四粒各去殼入麝香研細貼在臍中歌曰三麻四豆脫衣

裳研碎將來入麝香若有婦人遭產難貼在臍中兩分張

立聖丹 治產難橫逆惡候死胎不下並治神

寒石四兩內二兩生 硃砂兩 右同研如深桃花色每用三分井華水調如蒲糊以紙花剪如杏葉大攤上

貼臍心候乾再易不過三次便產

治難產雜方 益母草搗取汁七合煎半頓服立下無新者以舊收者一大把水七合煎服○一方令產婦兩手各

凡產婦藥方不同胎氣各異諸方種種俱云神効然用者必詳症體選之方驗不然恐服之無益

握石燕一枚須臾即下。○一方雲母粉半兩溫酒調服入口即產萬不失一。○一方桂心為末童便酒調服一錢

神効不投苦散。○一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下見頭帶生而下。○一方臘月兔頭煨為末葱白煎湯調

服二錢立生。○一方燒銅錢通紅放酒中飲之。○一方皂子二枚研末酒調下。○一方用魚膠一尺新瓦上煨乾

陳醋調服立下。○一方好墨新汲水磨濃服之墨水同兒出。○一方取弓弩弦以縛服及燒弩牙令赤內酒中飽

之皆取法於快速之義也。○一方神麴末水服方寸匕。○一方赤小豆為末東流水服方寸匕。○一方當歸末酒

調一錢服不產再服。○一方車軸脂吞豆大許即產。○一方紅莧菜與馬齒莧同煮熟臨產食之即下。○一方車

前子為末酒服。○一方取丈夫視帶五寸燒存性酒調服下。○一方取槐樹東枝令產婦把之易產。○一方用紫

蘇煎湯調益元散服之即產。○一方用槐子十四粒即下。○一方取槐子上百枚蒲黃一合納酒中溫服須臾不

生再服之不服亦得。○一方生薑汁生地黃汁各半斤合煎熟頓服之。

○治交骨不開

龜殼散 治交骨不開不能生育。

當歸 川芎 各一

敗龜板 一個

婦人頭髮 生長過者一握燒存性

右為散每服五錢水煎服約人行五里即生如

胞死不下灼龜板亦可。

○治胎死腹中

烏金散

治難產或熱病胎死腹中或因顛仆或從高墜下或產室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到

經行先下惡露已盡胎不下子冷身冷不能自出但視產母面赤舌青是其候也面青舌赤母死子活唇青吐沫

子母俱斃又有雙胎或一死一活其候難知臨時觀變可也。

熟地黃 洗切晒乾酒拌

真蒲黃

大當歸

交趾桂

楊芍藥

軍薑 去皮

粉草 各一

小黑豆 四兩

百草霜 五錢

右為末每用二錢米醋半合許沸湯六七分浸起溫服疑氣之際且進佛手散酒水合煎二三服探之若未死

子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後再進香桂散須臾如手推下常用催生更加滑石末半

兩葵子五十挺碎黃炸葉七八片葱白二寸順流水煎湯調下蓋滑石能利小便炸葉行氣逐血葱白內通

陽氣氣盛血行即產矣

香桂散 下死胎。

服法妙

一平胃散也而所以
下死胎可見用法之
不窮如此蓋胃行則
死胎自行更投補藥
則無不下矣妙妙

藥妙分兩尤奇

東流取其順下先煮
取其力全
煮盡新取輕虛之意

要知葵子多用方妙

妙在先服四物湯

麝香 用五分研一方 官桂 用三錢為末一分 右和勻作一服溫童便酒或葱湯調服須臾如手推下此方比

之用水銀等不損血氣○一方加白芷三錢○一方單用桂末一錢童便調下名救苦散

平胃散 治死胎不下指甲青舌青脹悶口中作臭臭。

蒼朮 水浸 陳皮 厚朴 各一錢 甘草 分五 右剉一劑酒水各一盞煎至一盞投朴硝半兩再煎三五沸

溫服其胎化血水下○或只用朴硝半兩研細以童便調溫服亦妙或用二錢以順流水調下

一方 治姙娠三五個月胎死在腹中不出

大腹子 赤芍藥 榆白皮 各三錢 當歸 兩一 滑石 七錢 瞿麥 葵子 炒 茯苓 粉草 黃芩 各半

右為麓末每服四錢水煎服。

千金神造湯 治動胎及產難子死腹中並姙娠兩兒一死一生服之令死者出生者安神驗

一 蟹爪 升 甘草 兩一 阿膠 兩三 右三味以東流水一斗先煮蟹爪甘草得三斗去滓次內膠令烊頓服之不能

分再服若人因挖口內藥藥入即活煎藥作東向龜用葶藶煮之

一方 治胎死腹中乾燥着背 葵子 升 阿膠 兩三 右以水五斗煮取二斗頓服之未出再煮服

一方 治子死腹中或半生不下或半着脊骨在草不產血氣上溢母心而無顏色氣欲絕及治脫水早乾胎溢不

下 猪脂 初 蜜 升 淳酒 升二 右三味共煎至二升半分溫二服不能服者隨多少緩緩服之

一方 治胎死腹中或半產不下

官桂 錢五 牡丹皮 川芎 葵子 各一錢 右為細末每服三錢葱白湯下

半夏湯 治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胎乾而不能產者

半夏 錢半 桂枝 錢半 大黃 錢五 桃仁 三十個 去 右為麓末先服四物湯一二服次用此藥三錢生薑

三片水煎服如未効次服下胎丸

治難產多難產者妙

危症極矣必黑鉛水銀方妙然症少緩者切不可用之

紫金藤即紫木香

天花粉亦能墮胎

亦可治鬼胎

以下二十餘方隨人便用之

下胎丸 治產難胞衣不出橫倒者或兒死腹中母氣欲絕者

半夏製 白薇各半兩 右為細末滴水丸如桐子大食後用半夏湯下二三丸續續服至五十丸一方二十丸下漸加至五

凡十

一方 治生產不順胎死腹中胎衣不下臨產危急

蛇退一條全者香 麝香許少 右為末童便酒各半盞調下一服即生効

霹靂奪命丹 治臨產驚然氣促目翻口噤面黑唇青沫出口中子母俱損兩臉微紅子死母活

用蛇退一條瓦 蟾蜍錢二 男子髮燒灰 乳香五分 黑鉛二錢半 水銀七分半依前法作 千里馬即路上去脚舊草鞋一隻取鞋

鼻洗淨燒灰一錢 右為末以猪猪心血丸如桐子大金銀箔七片為衣每服二丸用急流水灌下或入伏龍肝調下土

著兒頭戴出為妙

宣明礪砂散 治胎死腹中不下

礪砂細燒 當歸各一兩 右研極細末分作二服溫酒調下如重車行五里不下再服

牛膝丸 下死胎

杜牛膝二兩 紫金藤 蜀葵根各六錢 當歸四錢 肉桂二錢 麝香五分 右為末用糊為丸如桐子大礪砂為衣

每服五十丸乳香湯交下

一方 治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥六兩 通草 桂心各二兩 牛膝 榆白皮各四兩 右細切用水九升煮取三升去渣分三服頓飲即下

一方 無榆皮有天花粉四兩大能墮胎

一字神散 治子死腹中胞衣不下胞破不生累有神驗

鬼臼不拘多少黃色者去毛研為末以手指擦之如粉極細為度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞煎至八

分通口服立生如神

治死胎難方 用辰砂一兩以水者數沸為末取酒服之立出○一方真珠一兩為末酒調服盡立出○一方葵子

為末酒服方寸匕。若口噤不開格口灌之藥下即活。○一方鹿角屑一兩葱五莖豆豉半合水煎服。○一方鹿角燒灰存性為末每服三錢溫酒調下。○一方水銀半兩桂末三錢溫酒調下粥飲亦可。○一方錫粉水銀各一錢棗肉丸如大豆大水吞下立出。○一方用雞子黃一個生薑自然汁一合調勻頓服分晚後用當歸子粥補之。○一方瞿麥二兩剉碎水八盞服未出再服。○一方竈心黃土為末酒調服二錢。○一方鍋底墨酒調服。○一方麥赤小豆同煮濃汁服立出。○一方紅花酒煮汁服二三次。○一方以利斧蝦赤置酒中俟溫飲之其子自下。○一方用雌雞糞二十一枚水二升五合下米作粥食即下。○一方用三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合者令產婦東面飲之立出。○一方取犬尿升煮令沸飲之。○一方以黃牯牛糞塗母腹上立出。○一方以牛糞炒令大熱入醋半盞以青布包裹於母臍上下熨之立下。○一方用烏雞一隻去毛細切水煎三二升候湯通毛用衣帛蘸摩腹中胎自出。○一方榆白皮煮汁服二升。○一方治有孕數月未足子死腹中母欲悶絕取大豆三升醋煮濃汁三升頓服。○一方用瓜萁根一味焙為末每服二錢取順流水下。

濟陰綱目卷之十一

○產後上

○論產後調理法

大全云凡生產畢飲熱童便一盞不得便卧宜開目少坐須臾上牀宜仰卧不宜側卧宜豎膝未可伸足高倚牀頭後鋪綢褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風及以醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更以手從心膺至臍下使惡路不滯如此三日以防血量血逆不問腹痛不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏暈且頻食白粥少許一月之後宜食羊肉猪蹄少許仍慎言語七情寒暑梳頭洗足以百日為度若血氣素弱者不計日月否則患手足腰腿痠痛等證名曰尋勞最難治療初產時不可問是男是女恐因言語而泄氣或以愛憎而動氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治事犯時微若秋毫成病重如山嶽可不戒哉陳藏器云清羊汁與產婦服之將子麻與產婦枕之止血暈產婦腹痛以手安腹上則止○產婦將息如法臟腑調和庶無諸疾苦須先服黑神散四物湯四順理中丸七寶散若壯熱頭痛此乳脈將行用玉露散頭目不清是血暈用清

魂散粥食不美。是胃氣虛。用四順理中丸。

○論產後大補血氣為主

丹溪曰。產後當大補血氣為主。雖有雜證。以未治之。○產後為補虛。用參朮黃耆陳皮歸身尾川芎炙甘草。如發熱。輕則加茯苓淡滲之。其熱自除。重則加乾薑。○凡產後有病。先固氣血。○產後一切病。多是血虛。皆不可發表。○新產後。不可用苦藥。以其酸寒。能伐生發之氣故也。○大抵胎前。母滯。產後。母虛。

○論產後服熱藥之誤

此論出局方發得真。血病治血以下尚有。寒者溫之。熱者清之。疑者行之。虛者補之。血多者止之。五句似不可少。姑識之以便採擇。

丹溪曰。或問新產之婦。好血已虧。汚血或留。彼黑神散。非要藥乎。答曰。至哉。坤元萬物資生。理之常也。初產之婦。好血未必虧。汚血未必積。臟腑未必寒。何以藥為。飲食起居。勤加調護。何病之有。誠有汚血。體怯而寒。與之數帖。亦自簡便。或有他病。當求病起何因。病在何經。氣病治氣。血病治血。何用拘執。此方例令服餌。設有性急者。形瘦者。本有怒火者。夏月坐蓐者。時在火令。薑桔皆為禁藥。生於將護之法。尤為悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先哲具在。訓戒胡為。以羊雞濃汁作糜。而又常服當歸建中湯。四順理中丸。雖是補劑。並是偏熱。臟腑無寒。何處消受。若夫兒之初生。母腹暢寬。便啖雞子。且喫火鹽。不思雞子難化。火鹽發熱。輾轉生證。不知所因。率爾用藥。甯不誤人。予每見產婦之無疾者。必教之以却去黑神散。與夫雞子火鹽諸品肉食。且與白粥將理。間以些少石首養者。令甘澹。食之半月後。方與少肉。若雞子亦須豁開。滯者。大能養胃。却痰。彼富貴之家。驕恣之婦。卒有白帶頭風。氣痛腸築。痰逆口乾。經事不調。髮衰體熱等證。皆是陽盛陰虛之病。天生血氣。本自和平。曰盛曰虛。又烏知非此等謬妄。有以兆之耶。

○論新產三病

仲景云。問新產婦人有三病。一者病癰。二者病鬱。三者大便難。何謂也。斷曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病癰。亡血復汗。寒多。故令鬱。胃亡津液。胃燥。故大便難。產婦鬱胃即今世所謂血暈也。

○產後諸忌

千金云。入產後滿百日。乃可會合。不爾。至死。虛。祇百疾滋長。慎之。凡婦人患風氣。臍下虛冷。莫不由此。早行房故也。

讀此則知癰症亦有外來。不可專主氣血不足。而驟用補劑。反致不救也。