

傷寒津蘊卷之三

金壇 王肯堂字泰輯

陽明病 胃實不大便 自汗 不得汗

譫語 狂亂 循衣摸牀 渴

黃陽明之爲病胃家實是也謂之正陽陽明屬下證輕則大柴胡重則大小承氣此邪自陽明經傳入府者經曰陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿有潮熱者此欲解可攻裏也手足濇然汗出者此是大便已鞭也大承氣主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下謂陽明亦有在經者未全入府猶宜解外縱有大滿大府不通亦不過小承氣微

下之入胃在經猶宜兩審也其陽明一證少有自病多因太陽傳入兼與太陽陽明合病用葛根湯者是也少陽陽明合病用黃芩芍藥湯者是也自少陽傳入陽明及未合病病者亦然陽明經治法有汗吐下溫和解刺

汗

桂枝湯

五苓散

此亦作汗劑

麻黃連軀赤小豈湯

吐

梔子豉湯

下

調胃承氣湯

大承氣湯

抵當湯

麻仁丸

茵陳蒿湯

小承氣湯

溫

吳茱萸湯

四逆湯

和解

白虎湯

白虎加人參湯

猪苓湯

小柴胡湯

蜜導煎

猪膽汁

土瓜根

梔子檨皮湯

刺

熱入血室刺期門

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太

陽陽明者脾約是也

經曰跌陽脉浮而濇浮則胃氣强濇則小
便數浮濇相搏大便則難其脾為約麻仁

九主之太陽病三日發汗不解蒸正陽陽明者胃家實是也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩熱大便難是也宜小承氣湯微

津之益少陽復不可下也按本草大黃酒浸入太陽經酒洗

入陽明經病之高下全在酒之多少以引之耳又按太陽陽明

正陽陽明承氣湯中俱用酒浸惟少陽陽明為下經故小承氣

湯中不用酒浸也以此推之則太陽陽明當用調胃承氣湯蓋

以調胃承氣既附在太陽篇中而大黃下註曰酒浸正陽陽明

當用大承氣其大黃註曰酒洗少陽陽明當用小承氣湯不惟

大黃不用酒浸洗而少陽禁汗下故去芒硝之峻劑而且當少

少與之也書此以駁成氏之誤又須識太陽陽明脾約丸少陽

陽明又不可大柴胡也又問曰何緣得陽明病答曰太陽病發

有說在不大便之條

汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內

實大便難者此名陽明也成本太陽病不解因發汗利小便亡

陽明古人登廁必更衣不更衣者通為不大便不更衣則胃中

物不得泄故為內實胃無津液加之畜熱大便則難為陽明裏

也實傷寒脉浮而緩手足自溫者是繫在太陰太陰者身當發

黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也

成浮為陽邪緩為脾脉傷寒脉浮緩太陰客熱邪在三陽則手

足熱邪在太陰則手足溫邪在少陰厥陰則手足寒今手足自

溫是知繫在太陰也太陰土也為邪蒸之則色見於外當發身

黃小便自利者熱不內蓄不能發黃至七八日大便鞭者即太

陰之邪入府陽明病若能食名中風不能食名中寒成陽明

轉屬陽明也陽明病若能食名中風不能食名中寒成陽明

食別受風寒者以胃為水穀之海風為陽邪陽氣殺穀故陽

中風者能食寒為陰邪陰邪不殺穀故傷寒者不能食陽

明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不

痛按目眩之眩其字从目从玄謂其眼中黑暗也頭眩之眩當

作若藥不瞑眩之眩訓之謂眩憤亂也謂其頭岑岑然憤亂

而不寧也凡書皆當活看不可拘執成陽明病身不重痛但頭

眩而不惡寒者陽明中風而風氣上攻也經曰陽明病若能食

名中風風邪攻胃胃氣上逆則欬咽門者謂之系欬甚則咽傷

故必咽痛若胃氣不逆則不欬其咽亦不痛也胃氣主嘔肺

氣主欬成氏以胃氣上逆則欬恐非益風邪陽明病不能食

侵肺也肺雖不為足經肺主氣風為氣類陽明病不能食

攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱

攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱

攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱

必噦成不能食胃中本寒攻其熱復虛其胃虛寒相搏故令噦

也經曰關脉弱胃氣虛有熱不可大攻之熱去則寒起此
陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲

作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也成陽明病脉遲

化為熱也胃中有寒食難用飽飽則微煩而頭眩者穀氣與寒

氣相搏也寒熱相搏必小便難利者不能發黃言穀熱得泄也

小便不利則穀氣醞釀成熱不得泄出身必發黃疸黃也以其

發於穀氣之熱故名穀疸熱實者下之則愈脉遲為寒故雖下

之祇益其寒腹滿亦不可攻陽明病欲解時從申至酉止
也經曰脉遲尚未可攻
陽明病欲解時從申至酉止燥金

旺於申酉戌向傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也
旺時是為欲解

病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也成合通也陽

赤者熱在經也不可下之下之虛其胃氣耗其津液經中之熱

乘虛入胃必發熱色黃小便不利也張夫陽明病生理必近于

可下但以面赤其熱猶在經故云不可攻若攻之則經中之

熱悉入于胃鬱蓄而發黃色譬如下之太早成結約之類

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

陽明病腹滿者為邪氣入府可下之心下鞭滿則邪氣尚淺未全入府不可便下之得利止者為邪氣去正氣安正氣安則愈若因下利不止者為正氣脫而尚淺淺字不如高字

胃實不大便

大便難

大便鞭

燥屎

成不大便大便難大便鞭燥屎悉屬裏證宜下者多矣然而有表未罷風濕相搏尤宜先解表已而下之可也如經曰傷寒不大便六七日頭疼有熱者小便清知不在裏仍在表是也其證多見于陽明蓋胃土萬物所歸無所復傳自太陽少陽傳入者衆所共知而於三陰傳入者鮮或能識若能熟視其微則三陰有急下之證多矣豈非仲景之微意歟

兼太陽

有汗桂枝

胃實有表者先解表

傷寒

不大便六七日頭痛有熱者與承氣

湯其小便清者知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄

宜桂枝湯

三時羌活湯成不大便六七日頭痛有熱者故宜當

大便必鞭

下若小便清者知裏無熱則不可下經曰小便數者

者不可責邪

在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭痛不已

為表不罷鬱

甚于經迫血妄行上為衄也○丹謹按外證未解

不可下

為逆今頭痛有熱宜解表反與承氣正是責其妄下

之過也

故下文又言小便清者知其無裏邪不當行承氣又繼

之曰當須發汗

曰頭痛必衄血宜桂枝湯反覆告戒論意甚明

而註反直曰故當宜下

想因六七日不大便爾雖不大便

他無所苦

候表解然後攻之正仲景法也註意似未瑩

明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

陽明病脇下鞭

滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液

得下胃氣因和身濺然汗出而解也

得下胃氣因和身濺然汗出而解也

陽明病腹滿不大便

入府可下若脇下鞭滿雖不大便而嘔舌上白胎者為邪熱

府在表裏之間與小柴胡湯以和解之上焦得通則嘔止津液

得下則胃氣因

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及

和汗出而解

久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有

久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有

久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有

潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮者

與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者

不治或脉浮為大陽風在表也弦則為陰風在裏也短氣腹滿脇下及心痛風熱壅於腹中而不通也若寒客於內而痛

者按之則寒氣散而痛止此以風熱內壅故雖久按而氣亦不通陽明病鼻乾不得卧自汗出者邪在表也此鼻乾不得汗而

嗜卧者風熱內攻不干表也一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦者風熱攻于胃也陽明之脉出大迎循頰車上耳過客

主人熱勝則腫此風熱在經故耳前後腫刺之經氣通腫則小差如此者外證罷則可攻若外證不解雖過十日脉續浮者邪

氣猶在半表半裏與小柴胡湯若其脉但浮而不弦又無諸裏證者是邪但在表也可與麻黃湯以發其汗若不尿腹滿加噦

者關格之疾也故云不治難經日關格者不得盡其命而死

口苦咽乾脉浮緊宜和陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡

寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也發熱惡寒表未解也而誤下之則亡陰無陰則

陽無以化故腹滿小便難陽明腹滿脉浮緊口苦咽乾而喘

也許學士云宜小柴胡湯

若發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗忌加燒針忌下

論見

自汗

陽明病脉浮而緊者潮熱發作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖三尺之童亦知可下也殊不知仲景之法雖有胃實證若表未解及有半表者亦先用桂枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

胃實表解無證者忌攻大便鞭者導之陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜根及人猪膽汁皆可導之蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦候可丸以手捻作挺子令頭銳大如指長二寸許乘熱急作之納

穀道中用手急捺住欲大便時乃去之 又猪膽汁方用大

猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀道中如飯時填大便

白去

便鞭無所苦者俟之太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復

惡寒不嘔但心下痞者此以翳下之也如其不下者病人不惡

寒而渴此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所

苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散

成太陽病

浮陰弱為邪在表今寸緩關浮尺弱邪氣漸傳裏則發熱汗出復惡寒者表未解也傳經之邪入裏裏不和者必嘔此不嘔但心下痞者翳下之早邪氣留於心下也如其不下者必漸不惡寒而渴太陽之邪轉屬陽明也若吐若下若發汗後小便數大便鞭者當與小承氣湯和之此不因吐下發汗後小便數大便鞭若是無滿實雖不更衣十日無所苦也候津液還入胃中小便數少大便必自出也渴欲飲水者少少與之以潤胃氣但審邪氣所在以法救之如渴不止與五苓散是也○張或問上條

云小便數者大便必鞭不更衣十數日無所苦也嘗有四五日
六七日不大便者即為攻之今言十日不更衣而不用攻伐何
也曰此非結熱乃津液不足雖十日不更衣亦無所苦也經曰
陽明病本自汗出翳更重發汗病已瘥尚微煩不了了者此大
便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便硬當問其小便數
幾行本小便日三四行今日再行故知大便不久出為小便數
少以津液當還胃中故知不久大便也夫不便者若有潮熱譫
語可下之證者然後可以攻之其不大便而無諸下證者此津
液不足當須自審慎勿以
日數久而輒為攻下也

陽明病本自汗出翳更重發汗病

已差尚微煩不了了者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥
故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再
行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知
不久必大便也

胃實表解有證者隨證攻之陽明病潮熱不大便六七日恐有
燥糞欲知之法少與小承氣湯轉失氣者有燥屎可攻若不轉

失氣者無燥屎不可攻

方論見潮熱

陽明病汗出大便鞭而讞語者

宜小承氣湯

方見讞語

不大便腹滿者宜下之若但繞臍痛者則

為燥屎宜承氣湯

若心下至小腹滿痛者則為結胸宜陷胸

湯論見

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

成註吐後心煩

謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下心煩則是

胃有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱。按陽明一證分為太

陽正陽少陽三等而以調胃大小承氣下之者按本草曰大黃

酒浸入太陽經酒洗入陽明經浸久於洗得酒氣為多故能引

之於至高之分若物在山巔人迹不及必射以取之也故仲景

以調胃承氣收入太陽門而大黃下注曰酒浸及詳其用本湯

一則曰少少溫服二則曰當和胃氣與調胃承氣湯又詳本湯

之證則曰不吐不下心煩者又發汗不解蒸蒸發熱又吐後腹

脹滿是太陽陽明去表未遠其病在上不當攻下故宜緩劑以

調和之也及至正陽陽明則皆曰急下之與大承氣湯而大承

氣湯中大黃下注曰酒洗是洗輕於浸微升其走下之性以治

其中也至少陽陽明則去正陽而逼太陰其分為下故小承氣

湯中大黃不用酒制少陽不宜下故又曰少與曰微瀉之勿令

大泄下此仲景之妙法也東垣不審胃之云者乃仲景置調胃

胃實

胃實

承氣於太陽篇太陽不宜下故又稱胃以別之却踵成氏之謬以承氣治太陽脾約之證以調胃承氣治正陽陽明大承氣之證余故小便不利大便乍難乍易有微熱喘冒不卧者宜不能無辨

大承氣湯

論見不得卧

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏

證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

成諸脉皆屬于目傷

寒六七日邪氣入裏之時目中不了了睛不和者邪熱內甚上

熏於目也無表裏證大便難者裏實也身大熱者表熱也身微

熱者裏熱也針經曰熱病目不明熱不已者死此目中

不了了睛不和則證近危惡也須急與大承氣湯下之○跌陽

脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾

為約麻仁丸主之

成跌陽者脾胃之脉診浮為陽知胃氣強濇為陰知脾為約約者儉約之約又約束之約

內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾主為胃行其津液

者也今胃強脾弱約束津液不得四布但輪膀胱致小便數大便難與脾約九通腸潤燥

麻仁丸方

麻子仁 貳升

芍藥 半斤

枳實 半斤

大黃 去皮 壹觔

厚朴 去麤皮炙 壹尺

杏仁 壹斤 去皮尖 別熬作脂

右六味爲末煉蜜丸如桐子大飲服十丸日三服漸加以知

爲度

成內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜

忘屎雖鞭大便反易去聲其色必黑宜抵當湯主之方見 畜血無表

裏證下後脉數不解消穀易饑六七日不大便者有瘀血宜抵

當湯

許有一士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通

小便如澀神昏而睡診其脉長大而實予用承氣下之而愈
一則陽明自汗大便不通小便利津液少口乾燥其脉亦大
而虛作蜜煎三易之下燥糞得溏利而解其家曰皆陽明不
通何以治之異予曰二證雖相似然自汗小便利者不可蕩
滌五藏爲無津液也然則傷寒大證相似兩證稍有不同宜
仔細斟酌正如格周看命雖乍月日時皆同而貴賤窮通不
相侔者於一時中有淺深故知不可不謹

便初鞭後溏仲景論中有四證內有二證不言小便一證言
小便不利一證言小便少其二證不言小便者陽明病潮熱
不大便六七日與小承氣湯不轉失氣者此但初鞭後必溏
不可攻之此胃中邪熱未作實者也又太陽病下之心中懊