

黃盛傳記

愧先  
收藏

張立才端

萬病回春

增補萬病回春原本目錄

孝集卷之一

萬金一統述

藥性歌

諸病主藥

釋形體

週身臟腑形狀

人身背回手足之圖

十二經脈歌

元補瀉溫涼藥

十二月七十二候歌

卷之三 中風

傷寒附傷

中寒

瘟疫

中暑

中濕

火證

內傷

飲食

鬱證

痰飲

咳嗽

喘急

哮喘

嘔吐

卷之三 瘧疾

痢疾

泄瀉

霍亂

嘔吐

翻胃

呃逆

噎氣

吞酸

嘔吐

諸氣

青筋

痞滿

鼓脹

水腫

卷之四 積聚

五疸

癰冷

斑疹

發熱

補益

虛勞

失血

吐血

瀉血

萬病回春

二目針

卷之五

卷之六

咳血 便血 眩暈 怔忡 厥證 遺溺 體氣 頭痛 口舌 梅核氣 腹痛 腳氣

咯血 麻木 驚悸 濁證 小便閉 脫肛 鬚髮 牙齒 癰痛 腰痛 癰疽 癰疽

惡熱 顛狂 虛煩 遺精 大小 諸蟲 面病 眼目 肺癰 脇痛 痿痺 經閉

惡寒 癰疽 不寐 淋瀝 痔瘡 耳病 咽喉 肺痿 臂痛 消渴 血崩

汗證 健忘 邪祟 關格 癰疽 鼻病 結核 心痛 背痛 疔病 帶下

婦人科 虛勞

求嗣 網經

妊娠

產育

小產

產後

乳病

婦人諸病

卷之七 小兒科

急驚

慢驚

疳疾

癖疾

諸熱

感冒

傷寒

腹脹

嘔吐

泄瀉

吐瀉

痢疾

瘧疾

咳嗽

卷之八

喘急

小兒初生雜病

胎熱

胎寒

臍風

撮口

胎驚

夜啼

中惡

天吊

鵝口

口瘡

重舌

木舌

走馬牙疳

愛吃泥

丹毒

赤腫

喉痺

眼痛

膿耳

鼻瘡

頭瘡

臍瘡

諸蟲痛

尾骨痛

疝氣

盤腸

脫肛

遺溺

尿濁

便血

下淋

吐血

小便不通

大便不

發斑

疔集卷之八

解顧

齒遲

鶴節

寗胸

行遲

龜背

髮遲

痘瘡

語遲

疥疹

癰疽

瘰癧

疥瘡

便毒

下疳

楊梅瘡

廉瘡

疥瘡

癰瘡

瘰癧

癰風

厲風

諸瘡

杖瘡

折傷

金瘡

破傷風

蟲獸

中毒

骨體

五絕

膏藥

通治

奇病

湯火

雲林眼筆凡十三條

龔氏家訓凡三十二條

新刊萬病回春原本卷之三

忠集

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子乃編

瘧疾

同邑後學周亮登元龍校

脉瘧脉多弦弦而數者多熱宜汗之弦而遲者多寒宜溫之弦而緊實者宜下之弦而虛細者宜補之弦而實大者宜吐之弦短者多食弦滑者多痰瘧脉遲緩者病自愈入瘧不愈者脉必虛宜養正去邪致脾胃不和痰留中脘然無痰不成瘧脾胃屬土有信來云不失其時若移時或早或晚者是邪無容堆瘧將好也瘧疾來時呵欠怕寒手足冷發寒戰大熱口渴頭痛腰膀骨節酸疼或先寒後熱或先熱後寒或單寒單熱或寒多熱少或熱多寒少一日一發受病淺也容易治間日發者或二日連發

住一日者皆難痊治宜在表無汗者散邪湯為主有汗者正氣湯為主在半表半裏者柴苓湯為主分利陰陽而未已者人參養胃湯加減後方可截之若用截藥吐出膠水者瘧自愈也不可一二日早截早則邪氣閉塞而成壞症又不可遲截遲則元氣衰憊而成虛怯當在三四日就截為好須待熱退身涼方可飲食也切不可帶熱飲食恐不消而成痞一名瘧母痞散成鼓者有之矣

大升癰初起者散邪正氣為先也無汗要有汗散邪為主  
○散邪湯 治瘧疾初發增寒壯熱頭疼身痛無汗

川芎

白芷

麻黃

白芍

防風 去土

荆芥

紫蘇

羌活 各

錢 甘草 三分

到一劑生薑三片葱白三根水煎去渣露一宿次早溫  
有痰加陳皮○有濕加蒼朮○夾食加枳附 自汗要無

汗正氣為主

○正氣湯

治瘧疾初發增寒壯熱頭疼口

對症

柴胡

前胡

小芎

白芷

半夏

麥冬去心

檳榔

草果土

青皮去穢

茯苓

去皮各一錢

桂枝

甘草各三

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎

先服

瘧發寒熱作渴者宜分利陰陽也

○柴苓湯

治瘧發寒熱病在半表半裏陰陽不分

柴胡

黃芩

人參

半夏

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓

肉桂

甘草

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎服

○無汗加麻黃○有汗

加桂枝○汗多加官桂○熱多加黃芩

虛人患瘧者養正邪自除也

○人參養胃湯

治暴瘧初起服二帖後用人參截瘧飲

高麗人參 治暴瘧初起服二帖後用人參截瘧飲

人參

茯苓去皮

陳皮

半夏姜汁

厚朴姜汁

烏梅

蒼朮

米泔浸

藿香

當歸

川芎

草薢

去壳

甘草

右剉一劑

生薑三片

六棗一枚

水煎溫服

○寒多加官桂

○

熱多加柴胡

○汗多去蒼朮

藿香

川芎

加白朮

黃芪

○飽悶

○

加青皮

砂仁

去人參

○渴加麥門冬

知母

去半夏

○瀉加炒

○

白朮

芍藥

瀉不止

加肉豆蔻

去厚朴

草果

○嘔噦

加白朮

○

藥炒砂仁

炒米

去草果

厚朴

蒼朮

○痰多

加貝母

竹瀝

去牛

○

夏草果

○內熱盛

加炒黃芩

去半夏

○長夏暑熱盛

加香薷

○

扁豆

去半夏

藿香

○人參竹瀝飲

治虛

煩昏倦汗多

痰盛

舌大

語言

○

○

○

○

○

人參

去苦

白朮

去苦

茯苓

去皮

當歸

○

○

○

○

○

○

酸棗仁

炒

麥冬

去心

知母

○

○

○

○

○

○

○

○

右剉一劑

生薑三片

棗一枚

水煎

入竹瀝

半盞

薑汁少許

○

○

○

○

○

風暑入陰在臟者瘡也

○柴胡芎歸湯

治夜間陰瘡引出陽分則散後服人參截瘡飲止之

柴胡

桔梗去芦

當歸

川芎

芍藥

人參

厚朴姜升

白朮去芦

乾薑

茯苓去皮

陳皮

各

紅花

甘草

各三分

右剉一劑生薑一片棗二枚烏梅一箇水煎食遠服

人虛者截補兼用也○人參截瘡飲

治虛人截瘡並一切瘡瘰癧之

人參

白朮去芦

茯苓去

當歸

青皮去穢炒

厚朴

姜升炒

柴胡

黃芩

知母去毛

各

桂枝三分

常山

酒浸

草果

去壳名

鱉甲

醋炙

烏梅

一箇

甘草三分

右剉一劑生薑一片棗二枚桃腦七箇水煎露一宿臨發日

五更空心溫服渣待日午再煎服糖拌烏梅下藥切忌雞魚

豆腐麴食及房勞怒氣戒之即痊

此方俱照前人參養胃湯後開治加減法相同後藥飲加酒  
人壯盛者宜單截也

○不二飲 治一切新久寒熱瘧疾一劑截住神效

常山 賓榔 要一雄一雌者重 知母 貝母

右劉每八錢酒一鍾煎至八分不可過熟熟則不効露一宿  
臨發日五更溫服勿令婦人煎藥

○常山七寶飲 治壯健人瘧疾可截之

常山 草果 去壳 檳榔 青皮 厚朴

知母 蒼米 米泔製 驚甲 一名烏梅 甘草

右劉一劑生薑一片桃腦七箇水煎入酒少許露一宿臨發  
日五更溫服午間渣再煎服○汗多加白朮去蒼米○熱多  
加柴胡黃芩○寒多加桂枝○口渴加麥門冬天花粉○痰  
多加貝母

瘡久不止者先截而後補也

○如聖散 人參三名 常山三錢 丁香二十 甘草三分

右為細末用好酒一鍾烏梅一箇煎熟露一宿臨發日五更

溫服用糖拌烏梅下藥時時可食之

○雄黃截瘡丸 人言一名 雄黃三名 辰砂三名 甘草一名

菉豆粉一兩 右藥各為細末用菉豆粉打糊為丸如白豆

大外用朱砂為衣臨發日五更并花水吞服二九小兒一九勿多服

瘡已後者須調養血氣也

○參歸養藥丸 治瘡疾截住後用此湯藥調養血氣

人參 當歸 茯苓去皮 白朮去蘆 陳皮 熟地黃

砂仁 厚朴炒 山藥炒 蓮肉炒 芍藥酒炒 甘草炙各

右剉一劑大棗二枚水煎溫服○瘡熱虛汗加黃芪去砂仁

腹中有塊者瘡母也 凡瘡發時切不可帶熱飲食恐不消而

成痞塊瘕散成鼓者有之矣○參歸驚甲湯治老瘕腹脇有塊成痞母

人參五分 青皮去穢 黃芪蜜水炒 龍甲醋炙 當歸酒洗

茯苓 白朮去芦 厚朴姜升 香附 撫芎各八分

砂仁 山查去子 枳實蜜炒各五分 甘草三分

右剉一劑生薑一片棗二枚烏梅一箇水煎食前溫服○如製丸藥加阿魏醋煮化和前藥末再用水醋少許打糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心米湯吞下

○十將軍丸 治久瘕不瘥有瘕母者

三稜泡 莪朮生 青皮去穢 陳皮去穢 草果去壳

砂仁 檳榔 烏梅肉 半夏泡七次 常山酒蒸二兩

石先將常山草果二味剉用好酒醋各一碗入瓦器內先浸一宿後入八味藥同浸至晚入瓦器內炭火煮取出曬乾若無日色用火焙乾為末半酒半醋打糊為丸如梧桐子大每

用三四十丸白湯吞下日進三服忌生冷魚腥酸鹹油膩  
食炙煖諸死毒物服至四兩至八兩即除根凡有積聚及煙  
瘴濕地方更宜服之一方加蒼朮香附醋炒各一兩平素虛  
弱兼以勞役內傷夾感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢體倦怠  
之力少氣用補中益氣湯加黃芩半夏芍藥有汗及寒重加  
桂枝倍黃芪熱盛倍柴胡黃芩渴加麥門冬天花粉

大凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒  
脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食戰慄泄瀉  
手足厥冷皆脾胃虛弱但服補中益氣湯其諸症悉愈方見補益

大抵久瘧氣血俱虛而三日一發者用十全大補湯益邪氣在

陽分者淺而易治邪氣在陰分者深而難治方見補益

一婦人瘧後刑體骨立發熱惡寒自汗盜汗胸膈痞滿日飲米

湯少許服參耒蓂益張臥床半年矣余以爲陽氣虛寒用大

劑補中益氣加附子一錢二劑諸症漸退飲食漸進又二劑  
全愈方見補益

痢疾

脉痢脉多滑按之虛絕尺微無陰潛則少血沉細者生洪弦確  
痢疾不分赤白俱作濕熱治之明矣赤屬血白屬氣赤白相兼  
膿血雜痢皆因脾胃失調飲食停滯積於腸胃之間多其暑  
濕傷脾故作痢疾起於肚腹疼痛大便裏急後重小水短赤  
不長身涼脉緩者易治身熱脉弦急者難治痢疾初起一二  
日元氣壯實者先用立白散虛弱者用芍藥湯疎通積滯三  
四日以後元氣漸弱調和飲食加減治之如不止服參歸芍  
藥湯調理脾胃補益元氣久不愈方可服人參養臟湯加減  
治之切不可驟用藥殼等藥止塞太早恐內積氣未盡成休  
息痢亦恐毒攻上胸腹飽悶作疼惡心嘔噦發呃難治因毒

氣攻胃故也先水瀉後膿血者是腎傳譴難愈先膿血後水瀉者是脾傳腎易愈又有痢下鮮血者如塵腐色者如屋漏水者大孔如竹筒者嘔噦發呃煩燥身熱者俱難治也如魚腦髓者身熱脉數大半生半死也大抵治痢疾一二日元氣未虛治宜疎通積滯此通因通用之法三四日後不可疎通恐元氣虛也當清熱解毒調養脾胃為主經云行血則便膿自愈調氣則後重自除若大腸積滯變實而後重法當疏導之若大腸氣虛下陷而後重法當升補之

初下痢者不分赤白皆濕熱也 壯盛人初痢宜利之

○立白散

治痢疾初起裏急後重腹痛膿血窘迫壯盛人二劑即愈

壺牛

赤痢用黑白痢用白赤白相雜黑白兼用半生半炒搗碎

生地黃 赤芍

歸尾

檳榔

枳殼去穢炒

莪朮煨

黃連各二錢

大黃二錢 暑月加香薷二錢

右剉一劑水煎空心溫服以利二三次為度○虛弱人初服宜清之

○芍藥湯 芍藥二錢 木香一錢 當歸一錢 枳殼去穢一錢 檳榔一錢

黃芩去朽一錢 黃連二錢 甘草五分 右剉一劑水煎溫服

下痢稍久者宜調和也○調和飲 白芍三錢 當歸一錢

川芎二錢 黃連二錢 黃芩二錢 薤仁一錢 升麻五分

右剉一劑水煎空心服○如紅痢依本方○如白痢用吳茱

萸一錢 芩連用酒炒○赤白痢加白木茯苓陳皮香附各一錢

痢因熱積而氣滯者宜清熱順氣也

○立効散 治赤白痢疾攪血相兼裏急後重疼痛一服立止

淨黃連西兩酒洗吳茱萸三兩同炒去柴萸不用 陳枳殼二兩去穢

右二味為細末每服三錢空心黃酒調下洩瀉米湯下○白

禁痢疾陳倉米湯送下

下痢發熱不退者腸胃中有風邪也