

本草綱目

草部

卷之六
第七冊

本草綱目草部目錄第十六卷

草之五 隸草類下七十三種

地黃

本經胡
面菴附

牛膝

本經

紫苑

本經

菟葵

本經

麥門冬

本經

萱草

嘉祐

梔胡根

拾遺

淡竹葉

綱目

鴨跖草

嘉祐即
作葉菜

冬葵

本經

蜀葵

嘉祐

兔葵

唐本

黃蜀葵

嘉祐

龍葵

唐本

龍珠

拾遺

酸漿

本經即
燈籠草

蜀羊泉

本經

鹿蹄草

綱目

敗醬

本經即
苦菜

迎春花

綱目

欵冬花

本經

鼠麴草

月華即米
麴佛耳草

決明

本經即
本經

地膚

本經即
落帚

瞿麥

本經

王不留

別錄

剪春羅

綱目

金盞草

綱目

蕘薢

本經

車前

本經

狗舌草

唐本

馬鞭草

別錄
即龍牙

蛇含

本經

芩

別錄

鼠尾草

別錄

狼杷草

開寶

狗尾草

綱目

鱗腸

唐本即
早蓮草

連翹

本經

陸英

本經

葫蘆別錄

水英圖經

藍本經

藍漬綱目

責賈開寶崔
翹附

甘藍拾遺

蓼本經

水蓼唐本

馬蓼綱目

苣草別錄

毛蓼拾遺

海根拾遺

炭母草國經

三白草唐本

蠶蘭草拾遺

蛇蘭草拾遺

虎杖別錄

蕷草拾遺

萹蓄本經

蓋草本經

蒺藜本經

穀精草開寶

海金沙嘉祐

地楊梅拾遺

水楊梅綱目

地蜈蚣綱目

半邊蓮綱目

紫花地丁綱目

鬼鍼草拾遺

獨用將軍唐本留
軍待附

見腫消圖經

攀倒甑圖經

水甘草圖經

右附方舊一百七十一新二百九十一

本草綱目草部第十六卷

草之五

隰草類下七十三種

地黃

本經
上品

薯蕷

音

薯蕷

音

薯蕷

別錄曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾弘景曰爾雅云平地黃郭璞云江東呼為半羅願云半以沈下珍為貴故字從下集解次歷陽近用江甯板橋者為勝作乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此云陰乾恐以蒸作為失乎人亦以牛膝姜蕤作之人不能別頌曰今處處有之以同州者為上二月生葉布地便出如車前葉上有皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短不常種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壘上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之時壇上層層令滿逐日水灌令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斲傷故也得根暴乾出同州者光潤甘美宗奭曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛奶子花莖有微細短白毛時珍曰今人惟以懷慶地黃為上亦各處隨時興廢不同爾其苗初生塌地葉如山白菜而毛濃葉面深青色又似小芥葉而頗厚不久入葉中擴莖稍開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長四五寸細如手指皮赤黃色如羊蹄根及葫蘆根曝乾乃黑生食作土氣俗呼其苗為婆婆奶古人種子今惟種根王夏山居錄云地黃嫩苗摘其旁葉作菜甚益人本草以二月八月採根殊未窮物性八月殘葉猶在葉中精氣未盡歸根二月新苗已生根中精氣已滋於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜禮記云

羊苦豕薇則自古已食之矣

嘉謨曰

江浙壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶山產者稟北方純陰皮有疙瘩而力大

乾地黃

別治

藏器曰

乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物各別蒸乾即濕補生乾即平宣當依此法用時珍曰本經所謂乾

更搗取汁拌前地黃日中晒乾或火焙乾用

別錄曰古權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰厥陰及手太陽之經酒

才曰得清酒麥門冬良惡且母畏無羨權曰葱蒜薤薑諸血令人營衛澀鬚髮白敷曰忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛時珍曰蜜汁浸則不泥膈酒制則不妨鮮用則寒乾用則涼

王治傷中逐血癰填骨髓長肌肉作湯

除寒熱積聚除癰瘍折跌絕筋久服輕身不老生者尤良本經
勇士五勞七傷李傷中胞漏下血破惡血漏利大小腸去中宿食

飽力斷絕補五臟內傷不足通血脉益氣力利耳目別助心胆氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣肺損吐衄鼻衄婦人崩中血運

大產後腹痛久服變白延年甄元權涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕執元素主心病掌中熱痛脾氣痿蹶嗜卧足下熱而痛好古治齒痛

唾血生地黃王治大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮竝折瘀血留血竇衄吐血皆搗飲別解

諸熱通月水利水道擣貼心腹能消瘀血數發明好古曰生地黃入手少陰又為手太陽之劑故錢仲陽濕丙火與木通用以導赤也

戴原禮曰陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬為虛火之證者宜地黃之屬以滋陰退陽宗奭曰本經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱者若與生乾當慮大寒故後世改用蒸曝熟者生熟之功殊別不可不詳時珍曰本經所謂乾地

黃者乃陰乾日乾火乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熟地黃乃後人復蒸晒者諸家本草皆指乾地黃為熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

熟地黃脩治頌曰作熟地黃法取肥地黃三二十斤淨洗別以揀下瘦短者三二十斤搗絞取汁投石器中浸漬令浹覩上浸三四過時時浸漬轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴須瓶器收之以其脂柔喜潤也霞曰采生地黃

去皮剝鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛也時珍曰近時造法揀取沈水肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甑於瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸眼如此九蒸九眼乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟冲和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用

氣味甘微苦微溫無毒元素曰甘微苦寒假酒力晒蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沈也入手足少陰厥陰之經治外治上須酒製忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血

百病時補氣滋腎水真陰除皮膚急痛病後肢股酸痛元半欲起目睭睭無所見好發明元素曰地黃生則大寒而涼血熟者珍補氣滋腎水真陰除皮膚急痛病後肢股酸痛元半欲起目睭睭無所見好發明須用之熟則微溫而補腎無衰者須用

之又臍下痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能益腎水涼心血其脈洪實者宜之若脈虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之為諸藥之首天一所生之源也湯液四物湯治藏血之臟以之為君者癸已同歸一治也時珍曰按王碩易簡方云男子多陰虛宜用熟地黃女子多血熱宜用生地黃又云生地黃能生精血天門冬引入所生之處熟地黃能補精血用麥門冬引入所補之處虞搏醫學正傳云生地黃生血而胃氣弱者服之恐防食熟地黃補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熟地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者也頌曰崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁搜麪作餌飪或冷淘食良久當利出虫長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病二年深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得虫置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餌亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃冷淘食便吐一物可方寸七狀如蝦蟆無足目似有口遂愈冷淘勿着鹽

附方

舊十三新

服食法

地黃根淨洗搗絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸丸如梧子大每晨溫酒送下三十九日三服亦可以青州棗和丸或別以乾地黃末入膏丸服亦可百日面如桃花三年身輕不老抱

朴子云楚文子服地黃八年夜視有光

地黃煎

補虛除熱治吐血唾血取乳石去癰癧等疾生地黃不拘多少三搗三壓取汁令盡以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再煎如錫丸彈子大每溫酒服一丸日二服

千金地骨煎

十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武火煮地黃汁數沸即以酒研紫蘇子

四兩取汁入煎一二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器盛之每空心酒化一七服大補益

同上

地黃粥

二合與米同入罐中煮

之候熟以酥二合蜜乙合同炒

地黃酒

見穀部

常服開心益智髮白返黑齒落重生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽垂血等病乃鐵

香入內再煮熟食臘仙神隱

地黃膏

常服開心益智髮白返黑齒落重生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽垂血等病乃鐵

香入內再煮熟食臘仙神隱

地黃粥

常服開心益智髮白返黑齒落重生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽垂血等病乃鐵

香入內再煮熟食臘仙神隱

地黃酒

常服開心益智髮白返黑齒落重生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽垂血等病乃鐵

香入內再煮熟食臘仙神隱

地黃粥

常服開心益智髮白返黑齒落重生辟穀延年治癰疽勞瘵欬嗽垂血等病乃鐵

沉香半斤熟半各二兩川椒紅一兩為末蜜丸梧

桐子大每空心鹽湯下三十九

普濟方

固齒膏

一治齒痛二生津液三變白鬚其功極妙地黃五斤柳木瓶內以

半兩明目補腎

桐子大每空心鹽湯下三十九

普濟方

固齒膏

土蓋上蒸熟晒乾如此三次擣為小餅每噙嚥一枚

御藥院方

男女虛損

或大病後或積勞後四體沈滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無味多卧少起久者

虛勞

積年輕者百日漸至瘦削用生黃地二斤鷄一斤搗爛炒乾為末每空心酒服方寸匕日三服忌如法

肘後方

地黃一石取汁酒三斗攬

病後虛汗

一盞半分三服一日盡

聖惠方

骨蒸勞熱

張文仲方用生地黃一升搗三度絞盡分兩服

若利即減之以涼為度

外臺秘要婦人發熱成

地黃一石取汁酒三斗攬

勻煎收日服

必效方

病後虛汗

一盞半分三服一日盡

聖惠方

骨蒸勞熱

張文仲方用生地黃一升搗三度絞盡分兩服

若利即減之以涼為度

外臺秘要婦人發熱成

勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾地黃一兩心松地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分為末生薑自然汁入水相和打糊丸斤為末煉蜜丸梧子大每酒服五十九保慶集婦人勞熱梧子大每服三十九用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可日二服覺臟腑虛冷則

晨服八味丸地黃性冷壞脾陰虛則發熱地黃補陰血故也婦人良方欬嗽吐血勞瘦骨蒸日晚寒熱生地黃汁三合煮白粥熟地黃末酒服一升二合白膠香二兩以磁器煎沸入牛皮膠一兩待化入薑湯下或舌上有孔出血生地黃八兩取汁童便

盛入瓶令膠消服之梅師肺損吐血五合同煎熟入鹿角膠炒研一兩分三服心熱吐衄未一兩待成膏丸梧子大每熟水下五丸至十九並

聖惠方鼻衄血乾地黃地龍薄荷等分為末冷水調下孫兆秘寶方吐血便血地黃汁六合銅器煎沸入牛皮膠一兩待化入薑湯下血

汁半盃分三服便止或微轉一行不妨聖惠方月經不止生地黃熱地黃並酒浸五

味子等分為末以煉蜜丸梧子大每酒下七十丸百一選方初生便血以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服之全幼心鑑

蜜一合和服小便血淋生地黃汁車前葉汁各半合分三聖惠方小兒疎瘡生半汁一升二合分三

小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服之全幼心鑑

蜜一合和服小便血淋生地黃汁車前葉汁各半合分三聖惠方小兒疎瘡生半汁一升二合分三

小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服之全幼心鑑

任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研下血不止百一方用生地黃汁一升清酒四合煮三五沸服之

為末煉蜜丸梧子大每服七十九米飲溫酒任下禹講師方妊娠漏胎不止又服崔氏方用生地黃為末酒服方寸匕日一夜一

經心錄加乾薑為末保命集二黃丸用生地黃熟地黃妊娠漏胎不下血不止百一方用生地黃汁一升清酒四合煮三五沸服之

等分為末每服半兩白朮枳殼煎湯空心調下日二服妊娠漏胎一兩微炒為末梧子大每溫酒分三十九許學士本事方妊娠漏胎

動生地黃搗汁煎沸入雞子產後血痛有塊并經脉行後腹痛不調黑神散用熟地黃一斤陳重白一枚攬服聖惠方

產後中風脇不得轉交加散用生地黃五兩研汁生薑五兩取汁交互相浸一夕次日各炒黃浸汁乾乃焙為末每酒服一方寸七濟生方

產後煩悶乃血氣上冲生地黃汁清酒各一升相和煎沸分二服集驗方瑞竹堂方

地黃汁清麪二升淨秫米二斗令發如常釀之至熟封七日取清常服令相接忌生冷鮮蒜雞猪肉一切毒物未產先一月釀成夏月不可造千金翼方

法生地黃七斤剉細瓶中同蒸下以銅器承取汁清旦服至日晡小兒陰腫以葱椒湯緩處洗之唾調地黃末傅之外醫令盡其間當下諸寒澼訖作白粥食之久瘻者作三劑

時後方小兒陰腫熱者雞子清調或加牡蠣少許危氏方小兒熱病煩渴壯熱

頭痛生地黃汁三合蜜半合熟鴟骨泥地黃汁一熱瘡昏迷煩悶飲水不止至危者一服見效生地黃根生薄荷葉等分擂爛取和勻時時與服 普濟方 熟鴟骨泥蓋服之 热瘡昏迷自然汁入麝香少許井華水調下覺心下頓涼勿再服 普濟方 温毒發

班黑膏治溫毒發斑嘔逆生地黃二兩六錢二字半好豆豉一兩六錢二字半以猪膏十兩合之露一
班夜煎減三分之一絞去滓入雄黃麝香如意大攪勻分作三服毒從虛中出則愈忌薰蕕 千金方 血熱生癬之 千金方 疗腫乳癰

地黃搗敷之熱即易性涼 地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎 消腫無不效 梅師方 瘰癧惡肉 地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎

即內消也 丁撲損傷骨碎及筋傷爛用生地黃熬膏裹之以竹簡編夾急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥 類說云許元公過

王袞博濟方才撲損傷搗墮馬右臂臼脫左右急接入臼中昏迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以藥封腫處中夜方甦達旦

痛止痛處已白日日換貼其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即上方也 出肘後物傷睛突 輕者臉胞腫痛重者目睛突出

方中 損傷打撲瘀血在腹者用生地黃汁三升酒一升半煮二升半分三服 出千金方 物傷睛突 但目系未斷者即納入急搗生

地黃綿裹傅之仍以避風膏垂地黃綿裹傅之仍以避風膏垂 痘起良久如常者血熱也卧則歸於肝故熬則目赤腫良久血散故如常也用生地黃汁眼暴亦

藥護其四邊 聖濟總錄 且起目赤 腫起良久如常者血熱也卧則歸於肝故熬則目赤腫良久血散故如常也用生地黃汁眼暴亦

藥護其四邊 聖濟總錄 睛目浸粳米半升晒乾三浸三晒每夜以米煮粥食一盞數日即愈有人病此用之得效醫餘眼暴亦

痛水先生地黃黑豆各二兩搗膏卧時以鹽湯洗目 睛目浸貼 小品方 牙疳 眼膜血口氣生地黃一斤鹽二合末自搗和團

貼之 聖濟錄 牙齒挺長出一分者常咋生地黃 甚妙 張文仲備急方 牙動欲脫生地黃綿裏咬之令汗滑根食蟹眼重肉弩出者生地黃汁一盞牙皂角數條耳中

聖濟錄 牙齒挺長出一分者常咋生地黃 甚妙 張文仲備急方 牙動欲脫生地黃綿裏咬之令汗滑根食蟹眼重肉弩出者生地黃汁一盞牙皂角數條耳中

常鳴生地黃截塞耳中日數易齧髮黃亦 同滓入灌內泥固煅存性為末用鐵器盛末三錢湯調停一日臨卧刷潔鬚髮上即黑 本

常鳴之或煨熟尤妙 肘後方鬚髮黃亦 同滓入灌內泥固煅存性為末用鐵器盛末三錢湯調停一日臨卧刷潔鬚髮上即黑 本

事竹木入肉 生地黃嚼爛罨 方竹木入肉 之 救急方 痘瘍入肉 百日箭出 千金方 猶大咬傷 地黃搗汁飯餅塗

葉生瘡似癩十年者搗爛日塗鹽湯洗 千金方 時珍曰按抱朴子云韓子治用地黃田喂五十歲老馬生三駒一百三十歲乃

死 張鷺朝野僉載云雉被鷹傷卽地黃葉點之虎中藥箭食青泥解之鳥獸知解毒

實生瘡四月採陰乾搗末水服方寸匕日三服功與地黃等 蘇頌 弘景曰出渭城者 有子淮南七精丸用之

花主治為末服食功同地黃

蘇頌

腎虛腰脊痛為末酒服方寸匕日三

時珍附方

新

內障青盲

風赤生翳及墜眼日久瞞損失明地黃花晒黑豆花晒槐花晒各一兩為末猪肝一具同

以水二斗煮至上有凝脂掠盡瓶收每點少許三四次

聖惠方

附錄胡面莽

拾遺藏器味甘溫無毒主去痃癖及

冷氣止腹痛煮服生嶺南葉如地黃

牛膝

本經上品釋名莖廣百倍

本雅經

對莖

救荒對莖菜

弘景曰其莖有節似牛膝故以為名時珍曰本經又名百倍隱語也言其

河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾普見葉如夏藍莖本赤弘景曰今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節莖紫節大者為雄

青細者為雌以雄為勝大明曰懷州者長白蘇州者色紫頌曰今江淮閩粵關中亦有之然不及懷慶者為真春生苗莖高二三尺青紫

色有節如鶴膝及牛膝頭葉尖圓如是兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細以根極長大至三尺而柔潤者為佳莖葉亦可單用時

珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟北土及川中人家栽蒔者為良秋間收子至春種之其苗方莖暴節葉皆對生頗似莧菜

而長且尖八月開花作穗結子狀如小鼠負虫有濡毛皆貼莖倒生九月末取根水中浸

兩宿挾去皮裏暴乾雖白直可貴而挾去白汁入藥不如留皮者力大也嫩苗可作菜茹

根脩

數曰凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿漉出剉焙乾用時珍曰今惟以酒浸入藥欲下行則生用滋補則焙用或酒拌蒸過用

氣味苦酸平無毒

普曰神農甘雷公酸無毒李當之溫之才曰惡螢火龜甲陸英畏白前忌牛肉

氣填骨髓止癓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不調血結別治陰痿補腎助十二經脈逐惡血

氣治腰膝軟弱破癥結排膿止癰產

後心腹痛并血運落死胎大強筋補肝臟風虛

好同從容浸酒服薑竹木刺入肉嚼爛罨之卽出

宗治久瘧寒熱五淋尿血莖中痛下

痢喉痺口瘡齒痛癰腫惡瘡折時珍曰病入虛羸者加而用之震亨曰牛膝能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之凡用土酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘧傷中少氣諸病非取其去惡血之功歟按陳日華經驗方云方夷吾所編集要方予刻之臨汀後痛癰腫惡瘡金瘡折傷喉齒淋痛尿血經候胎產諸病非取其去惡血之功歟按陳日華經驗方云方夷吾所編集要方予刻之臨汀後

在鄂渚得九江守王南強書云老人久苦淋疾百藥不效偶見臨汀集要方中用牛膝者服之而愈又葉朝議親人患血淋流下小便在盆內凝如鴉翁久而有變如鼠形但無足爾百治不效一村醫用牛膝根煎濃汁日飲五服名地龍湯雖未即愈而血色漸淡久乃復舊

後十年病又作服之又瘥因檢本草見肘後方治小便不利或中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今再拈出表其神功又按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石脹痛用川牛膝一兩水二盞煎一盞溫服一婦患此十年服之得效土牛膝亦可或入麝香乳香尤良

附方 舊十三新八 **勞瘧積久** 不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服清早一服未發前一服臨發時一服外臺秘要消渴不止

下元虛損牛膝五兩為末生地黃汁五升浸之日曝夜浸汁盡為度蜜丸倍子大每空心溫酒下三十九

久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生經驗方卒暴癥疾于灰火中溫令味出每服五合至一升隨量飲

凡刺下應先白後赤若先赤後白為陽虛氣不調腹中結瘕癥不散諸病牛膝二兩搗碎以酒一升炒令煙盡各一兩為末生地黃汁一升入石器內慢火熬婦人陰病牛膝五兩酒三升煮取一升

至可丸丸如梧子大每服二丸空心米飲下拔萃方婦人陰病半去滓分三服

千金方生胎欲去牛膝一握搗以無灰酒一盞牛膝塗麝香挿入牝戶中婦人良方胞衣不下牛膝八兩葵子一合水九升煎三升分三服延年方產後瘀血

川牛膝水煎頻喉嚨乳蛾新鮮牛膝根一握艾葉七片搗和人乳

愈無艾亦可一方牛口舌瘡爛牛膝浸酒含漱亦可煎飲

熊氏補遺曰癰乳蛾取汁灌入鼻內須臾癰消從口鼻出即

膝搗汁和陳酢灌之可煎飲

肘後方牙齒疼痛牛膝研末含漱亦可燒灰千金方折傷門肺衛生易簡方金瘡作痛止

梅師方生牛膝搗敷立

得惡瘡人不識者牛膝根搗傅之

千金方癰瘍已潰用牛膝根畱刮去皮插入瘡口中留半寸在外以嫩橘葉及地錦草各一握搗其

及瘡瘍

上牛膝能去惡血二草溫涼止痛隨乾隨換有十全之功也

陳日華經驗方

風瘡癰瘍牛膝末

酒服方寸七日

骨疽癰病方同

三服千金方

老

莖葉氣味 缺 **主治寒濕瘻瘍老瘻淋悶諸瘡功同根春夏通用之**

時附方舊三新一氣濕瘻痛腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於老

瘻不

斷酒氣不節斷更作不過三劑止

肘後方溪毒瘻東間有溪毒中人似射工但無物初病惡寒發熱煩憊骨節強痛不急治生

虫食膩殺人用雄牛膝莖紫色節大者一把以酒水各一盃同搗絞汁溫飲

日三服眼生珠管牛膝并葉搗汁日時後方眼生珠管點三四次聖惠方

紫莞

本經釋名書莞別錄

紫莞別返魂草

綱目夜牽牛

時珍曰其根色紫而柔宛故名許慎

集解

別錄曰紫莞生漢中房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾弘景曰近道處處有之

其生布地花紫色本有白毛根甚柔細有白者名白莞不復用大明曰形似重臺根作節紫色潤軟者佳頌曰今耀成泗壽台孟興國諸州皆有之三月內布地生苗其葉二四相連五月六月內開黃白紫花結黑子餘如陶說恭曰白莞即女莞也療體與紫莞相同無紫莞時亦用之顧曰紫莞連根葉採之醋浸入少鹽收藏作菜辛香號名仙菜鹽不宜多則腐也時珍曰按陳自明云紫莞以牢山所出根如北細辛者為良沂兗以東皆有之今人多以車前旋復根赤土染過偽之紫莞肺病要藥肺本自亡津液又服走津液藥為害滋甚不可

不慎

根

脩治

用東流水洗淨以蜜浸一宿至明控火上焙乾用一兩用蜜二分

氣味苦溫無毒

使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠志畏茵陳

別錄曰辛權曰苦平之才曰欬久為之主

新附方

舊三肺傷欬嗽

紫莞五錢水一盃煎七分溫

服日三次衛生易簡方

火嗽不瘥

紫莞欬冬花各一兩百部

半兩搗羅為末每服三錢蜜三片烏梅

小兒欬嗽聲不出者紫莞末杏仁等分入蜜同研丸芡

全幼心鑑吐血欬嗽吐血後欬者紫莞五味炒為末

一個煎湯調下日二甚佳

圖經本草小兒欬嗽子大每服一丸五味子湯化下

全幼心鑑

吐血欬嗽蜜丸芡子大每含化一丸指南

方產後下血

撮聖惠方

經喉風癆

不通欲死者用返魂草根一莖洗淨納入喉中待取惡涎出即瘥神效婦人小便卒不得出者紫

莞末水服五錢

更以馬牙消津嚥之即絕根本一名紫莞南人呼為夜牽牛

斗門方

婦人小便莞為末井華水

服三撮即通小便血者

服五撮立止

千金方

女莞

本經釋名白莞別錄

女莞別錄

復廣序音柳時珍曰其根

集解別錄曰女莞生漢中山谷或山陽正月二月採陰乾弘景曰比來醫

中品錄

似女體柔婉故名

集解別錄曰女莞生漢中山谷或山陽正月二月採陰乾弘景曰比來醫

中品錄

用重出一条故陶說疑之功與紫莞相似宗奭曰女莞即白莞非一物也唐脩本草刪去白莞
甚合宜時珍曰白莞即紫莞之色白者也雷斂言紫莞白如練色者名羊鬚草恐即此物也

根氣味辛溫無毒

之才曰畏鹹

主治風寒洗霍亂洩利腸鳴上無常處驚癇寒熱百疾

本經療肺傷欬逆出汗寒在膀胱支滿飲酒夜

食發病別發明時珍曰按葛洪肘後方載治人面黑令白方用真女莞三分鉛丹一分為末醋漿服一刀圭日三服十日大便黑十八日
錄發明日面如漆二十一日全白便止過此太白矣年三十後不可服忌五辛孫思邈千金方用酒服男十日女二十日黑色皆從
大便出也又名醫錄云宋興國時有女任氏色美聘進士王公輔不遂意鬱鬱面色漸黑母家求醫一道人用女真散酒下二錢一日二
服數日面貌微白一月如故懇求其方則用黃丹女莞二物等分爾據此則葛氏之方已試有驗者矣然則紫莞治手太陰血分白莞手
太陰氣分藥也肺熱則面紫黑肺清則面白三十
歲以後則肺氣漸減不可復泄故云不可服之也

麥門冬

釋名

麥門冬音門秦名烏韭一名愛韭楚名馬韭越名羊韭

並別錄禹韭

吳禹餘糧

別錄

心冬

普

心凌

吳普

不死草

吳普

前草

弘景曰似穢麥故

謂之麥門冬時珍曰麥鬚曰蘆此草根似麥而有鬚其葉如韭凌冬不凋故謂之麥鬚冬及有諸韭冬夏
冬諸名俗作門冬便于字也可以服食斷續故又有餘糧不死之稱吳普本草一名僕壘一名隨脂
土石間久廢處二月八月十月採根陰乾普曰生山谷肥地叢生葉如韭青黃採無時弘景曰函谷即秦關處處有之冬月作寶如青珠
以四月採根肥大者為好藏器曰出江甯者大白其苗大者如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧頌
曰所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚在根如連珠形四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大
或云吳地者尤勝時珍曰古人惟用野生者後世所用多是種時而成其法四月初採根於黑壤肥沙地裁之每年六月九月十一月三
次上糞及苦灌夏至前一日取根洗晒收之其子亦可種但
成遲爾浙中來者甚良其葉似韭而多縱文且堅韌為異

根鬚

弘景曰凡用取肥大者湯澤抽去心不爾令人煩大抵一斤須減去四五兩時珍曰凡入湯液以滾水潤濕少頃抽去心或
以瓦焙軟乘熱去心若入丸散須瓦焙熱即於風中吹冷如此三四次即易燥且不損藥力或以湯浸搗膏和藥亦可滋補藥
則以酒

浸搗之氣味甘平無毒

別錄曰微寒

普曰神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李當之甘小溫景曰甘微苦微寒陽中微陰降也入手太陰經氣分之才曰地黃車前為之便惡欬冬苦嗽苦寒苦參青蘿木耳伏石鍾乳

主治心腹結

氣傷中傷飽胃絡脈絕靈瘦氣久服輕身不老不饑

本經

療身重負黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹶強陰益精消穀調

中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏有子

別錄

去心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲器治五勞七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾熱

狂頭痛大治熱毒大水面目肢節浮腫下水主泄精

甄

治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經水枯乳汁不下元素父服輕身明目和車

前地黃丸服去濕輝變白夜視有光

藏

心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脈通心之劑與五味

子枸杞子同為生脉之劑元素曰麥門冬治肺中伏火肺氣欲絕者加五味子人參三味為生脉散補肺中元氣不足景曰六七月間濕

宗炳

心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脈通心之劑與五味

子枸杞子同為生脉之劑元素曰麥門冬治肺中伏火肺氣欲絕者加五味子人參三味為生脉散補肺中元氣不足景曰六七月間濕

宗炳

心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脈通心之劑與五味

子枸杞子同為生脉之劑元素曰麥門冬治肺中伏火肺氣欲絕者加五味子人參三味為生脉散補肺中元氣不足景曰六七月間濕

宗炳

心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脈通心之劑與五味

子枸杞子同為生脉之劑元素曰麥門冬治肺中伏火肺氣欲絕者加五味子人參三味為生脉散補肺中元氣不足景曰六七月間濕

宗炳

心肺虛熱及虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脈通心之劑與五味

附方

舊三

新九麥門冬煎補中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚強取新麥門冬根去心搗熟絞汁

宜若氣弱胃寒者必不可餌也

附方

新九

麥門冬煎和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴及成溫酒日日化服之

圖經本草

消渴飲水用上元板橋谷門冬鮮肥者二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭共三五節小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布摩

拭

科之搗末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中搗爛納黃連末和丸並手丸如梧子大食後飲下五十九日

再但服兩日其渴必定若重者卽初服一百五十丸二日服一百二十九丸三百丸四日八十九丸五日五十九丸合藥要天亮晴明之夜

方

浸藥須淨處禁婦人難大見之如覺可時只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細飲

之勿食肉勿入鹽不過三劑平勞氣欲絕麥門冬一兩甘草炙二兩粳米半合棗二枚竹葉

一百

克水二升煎一升分三服

南陽活人書

虛勞客熱

麥門冬煎湯頻

飲本草衍義口吐血効者麥

門冬去心一斤搗取自然汁入蜜刃血不止

麥門冬去心生地黃各五錢水煎服立止

保命集齒縫出血之蘭室寶鑑口噙生瘡脾肺虛熱上攻也麥門冬一

二合分作二服即止

活人心統血

金子大每服二十丸麥門冬去心培為末每用三錢酒磨屑角約

門冬湯下普濟方乳汁不下

錢許溫熱調下不過二服便下

熊氏補遺必效

石藥錄參門冬六兩人參四兩甘草炙二兩為末蜜丸男女血虛過入蜜四之一再熬成膏收每日白湯點服忌鐵器 藥方摘要

萱草

宋嘉祐

名忘憂說療愁目丹棘古今處祐鹿劍土妓女普宣男

時珍曰萱本作護草言樹之背謂憂不能自生故名宣男李九華延壽書云嫩苗為蔬食之動風令人昏然如醉因名忘憂此亦一說也嵇康養生論神農經言中藥養性故合歡蠲忘萱草忘憂亦謂食之也鄭樵通志乃言萱草一名合歡者誤矣合歡見木部

集解

頌曰萱草處處田野有之俗名鹿慈五月採花八月採根今人多採其嫩苗及花跗作俎食時珍曰萱宜下濕地冬月叢生葉如蒲蒜輩面柔弱新舊相代四時青翠五月抽莖開

花六出四垂朝開暮萬至秋深乃盡其花有紅黃紫三色結實三角內有子大如梧子黑而光澤其根與麥門冬相似最易繁衍南方草木狀言廣中一種水慈狀如鹿慈其花或紫或黃蓋亦此類也或言鹿慈花有斑文與萱花不同時者謬也肥土所生則花厚色深有斑文起重臺開有數月唐土所生則花薄而色淡開亦不久嵇含宜男花序亦云荆楚之上號為鹿慈可以薦菹尤可憑據今東人採其花跗乾而貨之名為黃花菜

苗化氣味甘涼無毒

主治煮食治小便赤澀身體煩熱除酒疸消食利濕熱

時珍作道利胸膈安五臟令人好歡樂無憂輕身明目

蘇頌

根

煮沙淋下水氣酒疸色遍身者搗汁服藏

大熱衄血研汁一大盃和薑汁半盃細呷之

宗

吹乳癰腫痛擂酒服以滌封之

時發明震亨曰萱屬水性下走陰分一名宜男蓋無微意存焉

附方

新四通身水腫鹿慈根葉晒乾為末每服二錢入麝香四分

下塵半錢食前米飲服

聖惠方

小便不通飲

杏林摘要

大便後血和生薑

油炒酒衝服

食丹藥毒之事林廣記

聖濟總錄

梔胡根

集解藏器曰生江南川谷陰地苗如萱草其根似天門冬凡用抽去心

氣味甘寒無毒主治潤五臟止消渴除煩去熱明目功如麥門冬

藏器

淡竹葉

細目釋名

淡竹葉

時珍曰竹葉象形碎骨言其下胎也

集解時珍曰處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉

其根一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽莖結小

長穗俚人採其根苗搗汁和米作酒鞠甚芳烈

時珍曰

竹葉象形碎骨言其下胎也

集解時珍曰處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉

其根一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之八九月抽莖結小

鴨跖草

跖音隻

釋名雞舌草

拾碧竹子同竹雞草

細目竹葉菜

同淡竹葉

耳環草

同碧蟬花

同藍姑草

藏器曰鴨跖生江東淮南平地葉如竹高一二尺花

深碧好為色有角如鳥嘴時珍曰竹葉菜處處平地有之三四月生苗紫莖竹葉嫩時可食四五月開花如蛾形兩葉如翅碧色可愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蚕屎巧匠採其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

苗氣味苦大寒無毒主治寒熱瘧疾飲丁腫肉癰癰滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰瘡毒和赤小

豆煮食下水氣濕渾利小便大便明消喉痺時珍附方新竹雞草一兩車前草一兩搗汁下痢赤白

藍姑草即淡竹葉菜煎入蜜少許空心服之

湯日服之

活幼全書喉痺腫痛

鴨跖草汁點耳環草碧蟬兒花按軟納患之袖珍方五痔腫痛處即効危亦林得效方

葵

本經上品校正

自菜部釋名露葵

細目滑菜時珍曰按爾雅翼云葵者揆也葵葉傾日不使照其根乃智以揆之也古人採葵必待移入此

露解故曰露葵今人呼為滑菜言其性也古者葵為五菜之主今不復食之故移入此

集解時珍曰

葵菜古人種為常食今之種者頗鮮有紫莖白莖二種以白莖為

生少室山弘景曰以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵入藥性至滑利春葵子亦滑不堪藥用故是常葵耳術家取葵子微炒輝

煑音畢乍散着濕地遍踏之朝種暮生還不過宿春曰此即常食之葵也有數種皆不入藥用頌曰葵處處有之苗葉作菜始更甘美冬葵子古方入藥最多葵有蜀葵錦葵黃葵紅葵莖葵皆有功用時珍曰葵菜古人種為常食今之種者頗鮮有紫莖白莖二種以白莖為勝大葉小花花紫黃色其最小者名鴨脚葵其實大如指頭皮薄而扁實內子輕虛如榆莢仁四五月種者可留子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年收採正月復種者為春葵然宿根至春亦生按王楨農書云葵陽草也其菜易生郊野甚多不拘肥瘠地皆有之為百菜之主備四時之饌本豐而耐旱味甘而無毒可防荒儉可以菹腊其枯杆可以榜旗根子又能療疾咸無遺棄誠蔬茹之要品

民生之資益者也而今人不復食之亦無種者

苗氣味甘寒滑無毒為百藥毒心傷人

別錄弘景曰葵葉尤冷利不可多食頌曰作菜茹甚甘美但性滑利不益人說曰其性雖冷

留飲吐水凡服百藥忌食其心心有毒也黃背紫莖者勿食之不可合鯉魚來米鮓食害人時珍曰凡被狂犬咬者永不可食之即發食葵須用蒜無蒜勿食之又伏硫黃

王治脾之藥也宣脾利胃氣滑大腸思邈導積滯

妊婦食之胎滑易生

蘇頌

煮汁服利小腸治時行黃病乾葉為末及燒灰服治金瘡出血

甄權除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下

痢丹毒並宜食之

汪

服丹石人宜食

同

張從正曰凡久病大便澀滯者宜食葵菜自然通利乃滑以養竅也

孟潤燥利竅功與子同上發旦時珍曰按唐王燾外臺秘要云天行斑瘡須臾徧身皆戴白漿此惡

毒氣也高宗永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜薑啖之則止又聖惠方亦云小兒發斑用生葵菜葉絞汁少少與服散惡毒氣按此卽今痘瘡也今之治者惟恐其大小二便頻數迫其元氣痘不起發葵菜滑敷能利二便似不相宜而昔人賴之豈古今

運氣不同故治法附方舊四天行斑瘡方見新三天行斑瘡上忍者但食葵菜即愈夏子益奇疾方諸瘡不合先以泔清溫洗拭淨取葵菜微

亦隨時變易與

附方

新

三

行斑瘡上肉錐怪疾人手足忽長倒生肉刺如錐痛不可忍者但食葵菜即愈夏子益奇疾方諸瘡不合火烘暖貼之不過二三百葉引

膿盡即肉生也忌諸魚蒜房事必效方湯火傷瘡葵菜搗汁服

食物本草蛇蠍蟄傷之千金方誤吞銅錢飲普濟方丹石發動口乾欬嗽者每食後飲冬月葵菜搗汁冷

火烘暖貼之不過二三百葉引

本草

根氣味甘寒無毒主治惡瘡療淋利小便解蜀椒毒

別錄

小兒吞錢不煮汁飲之甚妙

甄權治斑瘡出黃汁說利竅滑胎止消渴散惡毒

氣時附方

舊王新七二便不通脹急者生葵根二斤搗汁三合生薑四兩水三大盃煮汁平日服日一服並聖惠方消中尿多日夜尿七八升冬葵根五

斤水五斗煮三斗每日漏胎下血盡子死葵根莖燒灰酒平旦服二升外臺秘要漏胎下血服方寸匕日三千金方療疽惡毒肉中忽生一顆子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其頭有核核有深根應心能爛筋骨毒入臟腑即殺人但飲葵根汁可折其熱毒姚女乳癰葵莖及子為末酒服方僧坦集驗方治乳癰十七日二晉殷產寶身面瘡瘍出黃汁者葵根燒灰和

猪脂塗之食療本草小兒瘡瘍葵根燒末傳外臺塗之聖惠方口

吻生瘡用經年葵根燒灰

葵根搗塗之解防葵毒之

千金方冬葵子

別錄曰十二月採之機曰子

氣味甘寒滑無毒

黃芩為之使

主治五臟六腑寒熱羸瘦五癰利小便久服堅骨長筋內輕身延年

本療婦人乳內閼腫痛

別錄曰十二月採之機曰子

出癰疽頭

孟下丹石毒

弘景

通大便消水氣

滑胎治痢

時珍曰

時珍曰葵氣味俱薄淡滑為陽故能利竅通乳消腫滑胎也其根葉與子功用相同按陳自明婦人良方云乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯奶房脹痛留蓄作癰毒者用葵菜子炒香縮砂仁等分為末熱酒服二錢此藥滋氣脉通

營衛行津液極驗乃附方舊八新

十日至一月者

肘後方冬葵子三升水四升煮取一升

關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

服不瘥更服

聖惠用葵子末人乳汁等分和服立通關格脹滿方用葵子二升水四升煮

取一升納猪脂一雞子頓服

千金用葵子

氣味甘寒滑無毒

之使

大便不通

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

小便血淋

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

不通用葵子

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

不下冬葵子

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

不下冬葵子

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

不下冬葵子

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

不下冬葵子

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

十日者肘後方冬葵子三升煮取一升關格脹滿大小便不通欲死者肘後上葵張不愚方也

附方舊八新

服不瘥更服

蜀葵

宋嘉祐校正

名未用別錄吳葵華

釋名戎葵爾雅

藏器曰爾雅云著音堅戎葵也郭璞注云今蜀葵也葉似葵花如木槿花戎葵

月小滿後五日吳葵華別錄吳葵即此也而唐人不知退入有名未用嘉祐本草重

於葵部出蜀葵條蓋未讀爾雅註及千金方吳葵一名蜀葵之文故也今并為一

集解頌曰蜀葵似葵花如木槿花有五色小花者名

錦葵功用更強時珍曰蜀葵處處人家植之春

葵根搗塗之機曰子

外臺秘要蛇虺蟻傷古今驗方解防葵毒之

千金方冬葵子乃春生不應十二月可採也

氣味甘寒滑無毒

黃芩為之使

葵根搗汁飲

葵根搗塗之解防葵毒之

葵根搗塗之機曰子

氣味甘寒滑無毒

黃芩為之使

葵根搗塗之解防葵毒之

黃芩為之使