

金匱鈎玄

影印古本醫學叢書之八
上海中醫書局發行

R25
4

陸群瑛

金匱鈎奇

●難經古義

日本滕萬卿

鉛印 平裝 一冊 七角

七折

本書之特點凡二。一所註專晰所以立問答之由。不具訓字釋名。蓋重在明理也。二全篇每句以白黑字分解。白以彌縫正文語路。黑以直釋其義。蓋正文簡古。非此不能明也。作者自謂業軒岐之學三十年。講究難經。曰盛一日。因作此書。可以想見其心得。今人譁稱日本漢醫之長。而反以內難經爲不足學。豈真知漢醫哉。

●金匱直解

程雲來

鉛印 平裝 一冊 一元

七折

金匱註本。不易多觀。是書爲清代程雲來詮釋。程氏醫學之外。博覽羣書。曾著聖濟總錄纂要。譽滿杏林。此作更能樸實之理。發揮經旨。不望文生訓。不好奇曲解。名之曰直。可以想見苦心。

●傷寒辨要傷寒翼方合刻

栗園淺田

鉛印 平裝 一冊 六角

七折

本書係栗園淺田所著傷寒辨要傷寒翼方等合刻本。從大處落筆。作傷寒論全書之鳥瞰。語多扼要。方亦親切。凡研究仲景學者。不可不讀之奇書也。

●傷寒撮要

王夢祖

影印 本裝 四冊 二元四角 八折

本書係將古今傷寒學說會通之作。引用書籍一百零一種。證分一百二十四門。方共二百六十有四。論脈論證。論方論藥。別具系統。仲景傷寒論後之第一奇書。

●傷寒論校勘記

秦又安

鉛印 本裝 一冊 一角 七折

傷寒論一書。爲醫家圭臬。惜年遠流傳。不免錯譌。而註釋者。又望文生義。遂使精理反晦。是書參考各家刻本。辨其正誤。亦仲景之功臣也。

丹溪先生金匱鈎玄目錄

卷第一

中風

六鬱

癰

寒

傷寒

暑

注夏

暑風

濕

內傷

火

傷風

發斑

疹

溫病

癰

咳嗽

痰

喘

哮

痢

禁口痢

泄瀉

脾泄

霍亂

乾霍亂

嘔吐

惡心

翻胃

傷食

痞

噯氣

去價散

R254

吞酸

嘈雜

五疸

消渴泄瀉

水腫

鼓脹

自汗

盜汗

吃逆

頭風

頭痛

頭眩

眩暈

眉痛

耳聾

卷第二

心痛

腰疼

脇痛

腹痛

痛風

勞瘵

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風

夢遺

精滑

濁

淋

小便不通

關格

小便不禁

癰

健忘

怔忡

驚悸

瘰

血塊

吐蟲

癥瘕

疔

脚氣

痿

發熱

陽虛惡寒

手心熱

手麻

手木

厥

面寒面熱

喉痺

纏喉風

咽喉生瘡

口瘡

酒查鼻

肺癰

肺痿

天庖瘡

漏瘡

痔瘡

腸癰

結核

脫肛

卷第三

婦人科

經水

血崩

帶下赤白

白帶并痛風

子嗣

胎前

胎動

惡阻

束胎

安胎

胎漏

子腫

難產

催生方

產後

血暈

補虛

消血塊

泄

惡露不盡

中風

發熱惡寒

小兒科

吐瀉黃疸

急慢驚風

疳病

痘瘡

腹脹

夜啼

口糜

脫囊

脫肛

木舌

癰疹

咯紅

喫泥

痢疾食積

解顱

蛇蟲

口噤

風痰

癩頭

赤瘤

鼻赤

丹谿先生金匱鈞玄卷第一

門人戴元禮錄

新安吳勉學校正

中風

大率主血虛有痰以治痰爲先或虛挾火與濕亦有死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從痰治順氣化痰若口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰在左屬死血無血在右屬痰有熱氣虛

病若在左者四物湯等加桃仁紅花竹瀝薑汁在

右者二陳湯四君子等加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當吐

吐法輕用瓜蒂鰕汁皂角重用藜蘆半錢或三分
加麝香灌入鼻內或口內吐痰出一吐不已再
吐之亦有虛而不可吐者

氣虛卒倒參芪補之

氣虛有痰濃參湯合竹瀝薑汁

血虛宜四物湯俱用薑汁炒恐泥痰再加竹瀝薑
汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝

又法以猪牙皂角白礬等分爲末薑湯調下名稀

涎散

血虛者四物湯補之 挾痰者亦用薑汁竹瀝

脉訣內言諸不治證見則不可治筋枯者不治舉動則筋痛者是筋枯以其無血滋潤故也

治痰氣實能食用荆瀝 氣虛少食用竹瀝

此二味用開經絡行血氣入四物湯中必用薑汁助之

肥白人多濕少用附子烏頭行經

初昏倒急搦人中至醒然後用去痰藥二陳湯四物四君子等湯加減用

六鬱

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化也此爲傳化失常六鬱之病見矣氣鬱者胃脇痛脉沉澁濕鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細痰鬱者動則卽喘寸口脉沉滑熱鬱者脊小便赤脉沉數血鬱者四肢無力能食便紅脉沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛者是也

氣血中和萬病不生一有怫鬱諸病生焉

氣鬱

香附子

蒼朮

川芎

濕

蒼朮

川芎

白芷

痰

海石

香附

南星

瓜蒌

熱

青黛

香附

蒼朮

川芎

梔子

血

桃仁

紅花

青黛

川芎

香附

食

蒼朮

香附

鍼沙

醋炒

山查

神麴

炒

春加芎

夏加苦參

秋冬加吳茱萸

越鞠丸

解諸鬱

又名芎朮丸

蒼朮

香附

撫芎

神麴

梔子等分爲

末水丸如菉豆大

凡鬱皆在中焦以蒼朮撫芎藭開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降餘皆倣此

癩

大風病是受得天地間殺物之氣古人謂之癩風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天散取惡物陳蝨於穀道中取出雖有道路之異然皆不外乎陽明一經治此證者須知此意看其疣瘡與瘡上先見者上體多者在上也下先見者下體多者在下也上下同得者在上後

在下也陽明胃經與大腸無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多血氣俱受之者上下俱多也自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫從上從下以漸而來者皆可治人見其病勢之緩多忽之雖按法施治病已痊可若不能忌口絕色皆不免再發發則終於不能救也余曾治五人中間惟一婦人不再發以其貧甚而且寡無物可喫也餘四人三四年後皆再發孫真人云吾嘗治四五十人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病藥外又服百

餘貼加減四物湯半年之上方得經行十分安愈
治法 在上者醉仙散在下者通天再造散後用通
神散及三稜鍼於委中出血但不能忌口絕房者
不治之也

醉仙散

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

各半兩
爲粗末

同炒
紫色

白蒺藜

苦參

瓜蒌根

防風

各半兩

右八味爲細末每一兩半入輕粉三錢拌勻大人
一錢空心日午臨睡各一服淡茶調下五七日間

必於齒縫中出臭涎水渾身覺痛昏悶如醉利下
惡臭屎爲度量大小虛實加減與之證候重而急
者須以再造散下之候補養得還復與此藥喫須
斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果子燒炙等物止可淡
粥及淡煮熟時菜食之茄尚不可食惟有烏稍蛇
菜花蛇可以淡酒煮熟食之以助藥力

再造散

鬱金

半兩
生用

大黃

一兩
炮

皂角刺

一兩黑者
大者

白牽牛

頭末六錢半炒半生用之

右爲末五錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄出蟲