

金石部

水部

火部

土部

本草從新

卷十三  
十四  
十五

本草從新卷十三目錄

金石部 金類八種

金 自然銅 銅青 鉛 鉛丹 蜜陀僧

古文錢 鐵

玉類三種

雲母 白石英 紫石英

石類二十六種

硃砂

水銀

滑石

赤石脂

石炭

石墨

舉白

蠶白

青黛白

赤蕊白

空青

石膽

譽石

砒石

青礞石

花蕊石

石燕

石蟹

鹵石類十二種

食鹽

戎鹽

凝水石

元精石

朴硝芒硝

元明粉

硇砂

硼砂

石硫黃

白礬

綠礬

消石

本草從新卷十三

金石部 金類 玉類 石類 卤石類

金重鎮心用

辛平有毒磨屑頓服不遇三錢而斃能辟除惡祟。金

制木故能治驚癇風熱肝膽之病。銀功用相倣丸散用

鉛爲衣煎劑加入藥煮畏錫水銀遇鉛則碎五金皆畏水銀

自然銅重續筋骨

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛折傷必有死血瘀滯經絡然經之藥銅非煅不可用然火毒金毒相煽復挾香藥熱毒內攻雖有接骨神功頗多燥烈之損大宜慎用產銅坑中火

燬醋淬七次細研甘草水飛

銅青一名銅綠○重去風痰

酸平微毒。內科吐風痰之聚。外科止金瘡之血。女科理血氣之痛。眼科治風熱之疼。殺蟲有效。疳證亦宜。

色青入肝專主東方之病

服之損血。以醋製銅刮用。

頭上生疊銅青明礬末摻之良

鉛

重墜瘻解毒

甘寒屬腎。稟壬癸之氣。水中之金。金丹之母。八石之祖。

丹竈家必

用之。墜痰解毒。安神明目。殺蟲烏鬚。

制爲梳

以梳鬚。

性帶陰毒。傷人。

心胃

解硫黃毒煎  
鉛湯服卽解

鉛丹

卽黃丹○重內用鎮心墜痰外用解熱拔毒

鹹寒沉重味兼鹽礬內用鎮心安魂墜痰消積殺蟲治驚瘧  
瘧痢外用解熱拔毒止痛去瘀長肉性味沉陰損陽氣

黑鉛加硝黃鹽礬鍊成丸用以水漂去鹽硝砂石微火炒紫

色攤地上去火毒

鉛粉主治畧同

亦名胡粉錫粉時珍曰鉛粉亦可代鉛丹熬膏

然未經鹽礬火煅又有豆粉蛤粉雜之只入氣分不能入血  
分人服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還爲

鉛也

蜜陀僧重鎮驚劫痰消積

辛平有小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消積殺

蟲療腫毒解狐臭

油調搽腋或以饅頭蒸熱滅瘢點染鬚鬚  
劈開摻末夾腋下亦佳

療瘧痢五痔金瘡凍瘡

熟桐油調敷

食之令人寒中出銀坑

難得今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時

古文錢重平肝通下行

辛平有毒治目中障癥腐蝕壞肉婦人生產橫逆心腹痛月

隔五淋

或燒醋淬或煮汁

唇脣黑痛痒不可忍于石上磨猪脂汁塗之不過數遍愈目卒

不見石上磨汁注  
首中○腫腫也

鐵

重墜痰鎮驚

辛平有毒鎮心平肝定驚療狂消癰解毒

時珍曰凡諸藥皆忌鐵器而補腎藥

尤忌

畏慈石阜筴

阜筴木作煅薪則金裂

時砧上打落者名鐵落

卽鐵

屑素間用治怒狂研粉敷癬甚效

如塵飛起者名鐵精器物生衣者名鐵鏽

鹽醋浸出者名鐵華

時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也

鍼砂重消水腫

消水腫黃疽散癰瘍烏鬚髮

此是作鍼家磨鑄細末也須

真鋼砂乃堪用

人多以柔鐵砂雜和之飛爲粉人莫能辨

以上金類

雲母

重下氣

甘平色白入肺下氣堅肌續絕治瘧癥癰疽

同黃丹熬膏貼之于金翼用敷

金瘡

有五色以色白光瑩者爲上澤瀉爲使惡羊肉

金瘡出血雲母

粉傅之絕妙

白石英

重潤肺

甘辛微溫潤以去燥

十劑曰溼可去枯白石英紫石英之屬是也

利小便實大腸

治肺痿吐膿欬逆上氣

石藥終燥祇可暫用

潤藥頗多而徐之才取二金石

石英爲潤劑存其意可也。

# 白如水晶者良

紫石英 重鎮心潤養肝

甘辛而溫重以去怯溼以去枯心神不安肝血不足女子血

海虛寒不孕者宜之

衝爲血海任主胞胎經疏云女子係胞於腎及心包絡虛則風寒乘之故不孕

紫石英辛溫走二經散風寒  
鎮下焦爲暖子宮之要藥

色淡紫

石英五色各入五臟瑩徹五稜

火煅醋淬七次研末水飛

二英俱畏附子惡黃連

日華本草方癰腫青

氣紫石英火煅醋淬爲末

生薑米醋煎敷之摩亦得

○以上玉類

硃砂 重鎮心定驚瀉熱

甘涼體陽性陰

內含陰求鄭康成註周禮以川砂雄黃石膽礬石慈石爲五毒

色赤屬火

性反苦而甘者火中有土也

涼者離中虛有陰也味不瀉心經邪熱心經血分主藥鎮心定驚辟

邪清肝明目祛風止渴解毒

胎毒痘

定癲狂止牙疼下死胎

十全博救方水

煮一兩研酒服

獨用多用令人呆悶

辰產明如箭鎗者

良

名箭簇砂

細研水飛三次

若火鍊則有毒  
服餌常殺人

畏鹽水惡慈石忌一切血

水銀

重外用殺蟲

辛寒陰毒功顯殺蟲治瘡疥蟣蟲解金銀銅錫毒

能消五金墮胎

絕孕

性滑重直入肉

頭瘡切不可用恐人經終令人筋骨拘攣皆近男陽陽痿無氣惟以赤金

係患處水銀自出

從丹砂燒煅而出得鉛則凝得硫則結併棗肉

入唾研則碎散失在地者以花椒末茶末收之畏慈石砒霜

輕粉

燥刦痰涎外用殺蟲

辛冷而燥有毒殺蟲治瘡刲痰消積

能消  
涎積

善入經絡癰癧藥

有用之不可輕服

時珍曰水銀陰毒用火煅鍊丹砂而出再加鹽攀鍊爲輕粉輕楊燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能刲風痰溼熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣竄入經絡筋骨血液耗亡筋失所養變爲筋攀骨

痛癰腫瘍漏遂成癰瘤貽害無窮○上下齒齦屬手足陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之處而出

土

茯苓黃連黑鉛鐵漿陳醬能制其毒

粉霜功過畧同

銀硃

燥破積刲痰

辛溫有毒破積滯刲痰涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及疎其性燥烈能爛齶攀筋其功過與輕粉粉霜同

今厨人往往以之染色供

饌宜

去之

雄黃

重解毒殺蟲

辛溫有毒獨入厥陰氣分。搜肝氣而散肝風。殺百毒。辟鬼魅。

治驚癇痰涎積聚。頭痛眩運暑瘧。滯病泄瀉。

夷堅志云。虞雍八道中冒暑泄

病連月。夢至仙居。延之坐。壁中有詞云。暑毒在脾。溼氣連腳。

不泄則病。不病則瘳。獨鍊雄黃。蒸餅和藥。甘草作湯食之。安

樂別作治療。醫家大錯。如方服之而愈。

又能化血爲水。燥溼殺蟲。治勞疳蛇傷。

焚之蛇皆遠去。敷楊梅疔毒。疥癬痔瘻。血虛者大忌。生山之陽。

赤似雞冠明徹不臭重三五兩者良醋浸入萊菔汁煮乾。生山之陰者名雌黃。功用畧同劣者名薰黃。燒之則臭只堪薰。

瘡疥殺蟲蠭陰腫如斗。雄黃礬石各二兩。甘草一尺。水五升。煮二升。浸之。

石膏體重。瀉火氣輕解肌。

甘辛而淡。體重而降。足陽明經胃。大寒之藥。色白入肺。兼入

三焦諸經氣分。寒能清熱降火。辛能發汗解肌。甘能緩脾。生津止渴。治傷寒鬱結無汗。陽明頭痛發熱惡寒。日晡潮熱。陽狂壯熱。

經云陽盛生外熱。小便赤濁。大渴引飲。中暑自汗。能發汗又舌焦無津。

胎厚牙痛。陽明經熱爲末擦牙固齒。又胃主肌肉。肺主皮毛。嘉言曰極能止自任。舌焦

發斑疹之要品。色赤如錦紋者爲斑。隱隱見紅點者爲疹。斑重而疹輕。率由胃熱所致。然亦有陰陽二證。陽證宜用石膏。又有內傷陰證。見斑疹者色微紅而稀少。此胃氣極虛逼其無根之火游行於外。當補益氣血。使中有主。則氣不外游。血不外散。

若作熱治死。生反掌。少壯火熱者功效甚速。老弱虛寒者禍不旋踵。東垣曰立夏前服白虎湯。令人口小便不禁。降令太過也。極能寒胃。胃弱血虛及病邪未入陽明者切勿輕投。成無已解大青龍湯曰風衛陰陽俱傷。則非輕劑所能獨散。必須重輕之劑同散之。乃得陰陽之邪俱去。營衛俱和。石膏乃重劑。而又顯達肌表也。

東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交頸中故日痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二證至爲難辨蓋陰盛極而格陽於外熱而內寒陽盛極而格陰於外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎之淺深胎黃黑者爲熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者舌無芒刺口有津液也急宜溫之誤投寒劑則死矣

軟硬二種望白者良研細甘草水飛近人因其寒或用火煅

則不甚傷胃但用之渺少則難見功

白虎湯以之爲君或味自一兩加至四兩

淡難出

若大煎劑須雞子爲使惡巴豆畏鐵今茶食內俱加先煮數十沸雞子爲使惡巴豆畏鐵石膏粉取其價廉而且清涼可口也害人不少惟病洪大有力舌胎老黃或焦黑全無白色者用之否則

甘草根米

石膏根米

金石部

滑石 通利竅行水體重瀉火

淡滲溼滑利竅寒瀉熱色白入肺清其化源而下走膀胱以

利水通六腑九竅津液爲足太陽經本藥膀胱治中暑積熱嘔

吐煩渴非實止耳。若無溼小便利而渴者內有燥熱宜滋潤或誤

服此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以爲至燥之劑

黃疸水腫腳氣淋閉偏主石淋

水瀉

熱痢痢加乾薑治白痢。吐血衄血諸瘡腫毒爲蕩熱除溼

之要藥時珍曰滑石上利毛腠之竅是除中上之溼熱下利

精溺之竅是除中下之溼熱溼熱去則三焦寧而表裏和闢門通而陰陽利矣河間益元散治表裏上下諸病蓋

是此意益元散一名天水散。一名六一散取天一生水地六

成之之義也滑石六錢甘草一錢或加辰砂消暑降火散結通乳滑胎

凡脾虛

下陷及精滑者禁之病有當發表者尤忌時珍土材俱謂其能發表切卷亦謂

其氣輕解飭。不過以其能利毛竅耳。不知表邪得此滲泄重降之品。必愈陷入裏而成敗證矣。切勿信以爲然。

而潤者良。石葦爲便。宜甘草。

走泄之性宜甘以和之。嘉言曰天水散取其一甘一寒之意也。

○陰下溼汗。滑石一兩。

石膏煅半兩。枯白礬五分研摻之。腳指縫爛方同上。

赤石脂重濇固大小腸。

甘溫酸濇能收溼止血而固下。

經疏云。大小腸下後虛脫非濇劑無以固之。其他濇藥輕

浮不能達下。惟赤石脂體重而濇直入下焦陰分。故爲久痢泄澼要藥。

療腸澼泄痢崩帶遺精。

癰痔潰瘍收口長肉。催生下胞。

經疏云。能去惡血。惡血化則胞胎無阻。東垣曰。胞胎不出

濇劑可以下之。又云。固腸胃有收斂之能。下胞衣無推蕩之峻。

細膩黏舌者良。亦入血分。

白入氣分。

五色石脂研粉。亦有各入五臟研粉服者。水飛畏芫花。惡大黃松脂水。

過多赤石脂故紙等分爲末。米飲下二錢。

禹餘糧重濬固下

甘平性濬手足陽明

大腸胃

血分重劑治欬逆下痢血

癥瘕

崩能固下

李先知活人書括云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂

又能催生

石中黃

粉生於池澤無砂者佳修治同上

身面瘢痕同半夏末雞子黃和敷先以布拭淨避風

日再敷效

震靈丹

治婦人崩漏不止禹餘糧赤石脂

紫石英代赭石乳香沒藥沉香各五克研末

蜜丸

爐甘石

燥溼治目疾

鬆似石脂能點赤銅爲黃

今之黃銅皆其所點

煅紅童便淬七次研粉

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝溼故止血消腫收溼祛痰除爛退赤去翳爲目疾要藥

爐甘石海螵蛸硼砂各一兩爲細末以點諸目病甚妙入硃砂五錢則性不黏也

產金銀坑中金銀之苗也狀如羊脂