

七  
四

金匱玉函經二註卷之十七

趙以德衍義

元和李濤俊春泉重刊

周揚俊補註

長洲葉萬青訥人叅校

嘔吐噦下利病脉證第十七

論一首脉證二十二條方二十三首

夫嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

衍義上卷肺癰證必先咳而久久吐膿如米粥桔梗湯白散皆主之而此不言癰之所在知其非肺癰可知經曰熱聚于胃口而不行胃脘爲壅胃脘屬陽明經陽明氣逆則嘔故膿不自咳出從嘔而出膿亦不

似肺癰之如米粥者也。出胃院從濕化而聚結。若如  
結痰蛤肉者。謂不可治。不必治其嘔。嘔自膿之瘀薰  
蒸穀氣。故嘔。若膿出則嘔自愈。夫癰之在胃院上口  
者。則然。若過半中。在肺之下者。膿則不從。嘔出而從  
大便出矣。

先嘔卻渴者。此爲欲解。先渴卻嘔者。爲水停心下。此屬  
飲家。嘔家本渴。今反不渴者。以心下有支飲故也。此屬  
支飲。

衍義傷寒言嘔多有因。因熱。因寒。因水。因飲。皆屬胃

家病此獨以水飲者分三節言之初一段先嘔卻渴者爲飲而嘔嘔則飲去飲去則陽氣回津液猶未布故渴耳雖渴終以邪去正回而必解也第二段先渴卻嘔者卽前痰飲條中小半夏茯苓湯主之第三段本渴今反不渴亦痰飲條中小半夏茯苓湯主之問曰病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在于上醫反下今脈反弦故名曰虛

衍義凡脈以候病。陽盛則數。陰盛則遲。今言陽微而脈數。數而復胃中冷。其理安在。蓋脈病不可以概論也。此數由藥之遺熱所客。胃中冷由陽不足而致何也。中焦者陰陽之界。汗劑必用辛溫。發散不當汗而汗損其中。膀陽分致令陽微。膈氣虛。藥之遺熱從陰分而變。遂成數脈。古云客熱非陽盛也。雖有客熱。胃中之陽氣不足。故曰胃中虛冷也。醫反以寒劑瀉之。復損陰分之陽。故脈變弦。上下之陽俱不足。雖當日暮行陰之時。陽亦不能入于下。則糟粕不能輸大小。

腸不能輸。將亦不能安于中。必吐而復出也。故曰胃氣無餘。朝入而暮吐也。

寸口脈微而數。微則無氣。無氣則榮虛。榮虛則血不足。血不足則胸中冷。

衍義此條敘脈不敘證何也。上條以脈數爲客熱。此獨言氣血虛又何也。亦承上條而言也。上條以汗下之過而致病脈之若是。此條以上焦榮衛之不逮。亦致反胃之證。故不復敘。惟言脈之本象。陽脈動而健。

陰脈靜而翕。兩者和合。不剛不柔。不疾不遲。今微而

數微乃失陽之象。數乃失陰之體。奚止客熱而已。胸中榮衛之海。榮衛虛而不充于中。故胸中冷矣。夫榮衛之氣出入藏府。健運周身。本生于穀。復消其穀。榮衛非穀不實。穀非榮衛不化。所以胸中冷者亦必致。胃不納穀也。王冰釋內經曰。食入反出。是無火也。雖然。謂之冷。當以正氣不足論之。正氣者。陰陽之精。非寒非熱。冲和純粹。不宜以之爲冷。與寒邪同治。若以熱治寒。不惟反助客熱。且復耗其氣。損其陽矣。所謂客熱者。不獨以上條藥之所遺。若五藏厥陽之火乘。

尅于中土者。皆足以客之。况多得于七情鬱發之所。  
致歟。夫膏梁之變。皆足成客熱。安可復投之以熱乎。  
吁。世人治是病。非丁附則薑桂。孰知正氣果何如。則  
復也哉。

趺陽脈浮而濇。浮則爲虛。濇則傷脾。脾傷則不能磨。朝  
食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脈緊而濇。其病  
難治。

衍義 跌陽者。胃脈之所過。故候胃脈必于是焉。脾與  
胃以膜相連。皆屬於土。土有陰陽。胃爲陽。土爲陰。

土。陽主氣。主動。陰主血。主靜。今謂脾傷不能磨。何哉。  
此陰陽互爲體用之義也。蓋陽參于陰。則陰能動而  
不爲凝結。陰參于陽。則陽能固而不爲飛揚。斯脾動  
則脉不濇。胃固則脈不浮。若浮則胃家虛。而穀不能  
腐熟。濇則脾血傷。而穀不得消磨。所以在朝當陽時。  
食入者。至暮行陰時。反出在暮當陰時。食入者。至陽  
時亦出。以其兩虛。不能參合。莫得轉輸于大小腸也。  
河間云。趺陽脉緊爲難治。胃之上脘血亡。則并膈間  
皆濇不利。食不下入。脾統血。血亡。并大小腸皆枯而

糟粕不化。食雖入必反出也。

病人欲吐者不可下之。

衍義欲吐以其邪在陽也。若下不惟逆其治陽又反傷其無過之陰。豈獨反胃而已。其爲害可勝言哉。

噦而腹滿。視其前後知何部不利利之則愈。

補註噦者無物有聲之謂也。腹滿爲實。實則氣上逆而作噦。故必審其證。視前後何部以利之。則滿去而噦自止矣。

嘔而胸滿者。茱萸湯主之。

茱萸湯方

吳茱萸一升洗

人參三兩

生薑六兩

大棗十二枚

右四味以水五升、煮取三升、溫服一升、日三服。

衍義傷寒以是方治食穀欲嘔、陽明證、以中焦反寒也。吳茱萸能治內寒降逆、人參補益陽氣、大棗緩脾、生薑發越胃氣、且散逆止嘔、逆氣降、胃之陽行、則腹痛消矣。此脾藏陰盛逆胃、與夫腎肝下焦之寒、上逆于中焦而致者、卽用是方治之、若不于中焦、其藏久寒者、則以本藏藥化之。如厥陰手足厥冷、脈細欲絕。

內有久寒者。於當歸四逆加吳茱萸生薑是也。

乾嘔吐涎沫。頭痛者。茱萸湯主之。

衍義此證傷寒厥陰證中成註乾嘔吐涎沫者。裏寒是也。頭痛者。寒氣上攻也。用是溫裏散寒。與上條嘔而腹滿者病異藥同。蓋同是厥陰乘于土故也。

嘔而腸鳴心下痞者。半夏瀉心湯主之。

半夏瀉心湯方

半夏

半斤

黃連

一兩

人參

三兩

乾薑

十二兩

甘草

各三兩

黃芩

三兩

大棗

十二枚

右七味以水六升煮取三升溫服一升日三服

三十六

衍義傷寒論嘔而心下痞者有屬半表半裏亦有屬  
裏半表半裏者瀉心湯治屬裏者則以十棗湯大柴  
胡湯如心下痞腹中鳴有水氣不利則以生薑瀉心  
湯治有下利完穀不化則以甘草瀉心湯治治痞惡  
寒汗出者用附子關上脉浮者用大黃心下痞又不  
獨瀉心湯治或用解表或用和裏或吐或下或調虛  
氣隨

了迄石自今觀之是證由陰陽不分塞而

不通畱經心下爲痞于是胃中空虛客氣上逆爲嘔

下走則爲腸鳴。故用是湯分陰陽、水升火降、而畱者去虛者實成註。是方連芩之苦寒入心、以降陽而升陰也。半夏乾薑之辛熱、以走氣而分陰行陽也。甘草參棗之甘溫、補中而交陰陽通上下也。

乾嘔而利者。黃芩加半夏生薑湯主之。

黃芩加半夏生薑湯方

黃芩

三兩

甘草

二兩

芍藥

各二兩

大棗

十二枚

半夏

半斤

生薑

二兩

右六味水六升、煮取三升、溫服一升、日三服。

衍義傷寒論太陽與少陽合病、自下利若嘔、有黃芩  
加半夏生薑湯主之、成註、太陽陽明合病、自下利爲  
在表、與葛根湯發汗、陽明少陽合病、自下利爲在裏、  
可與承氣湯下之、太陽少陽合病、爲半表半裏、則以  
是湯和解之、論方藥主治、則曰黃芩之苦、芍藥之酸、  
以斂腸胃之氣、甘草大棗之甘、以補腸胃之弱、半夏  
生薑散逆也。

諸嘔吐穀不得下者、小半夏湯主之。

衍義嘔吐穀不得下者、有寒有熱、不可概論也、屬熱

者王冰所謂穀不得入是有火也此則非寒非熱由中焦停飲氣結而逆故用小半夏湯

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓散主之

猪苓散方

猪苓

茯苓

白朮

各等分

白朮味中益

右三味杵爲散飲服方寸匕日三服

衍義傷寒論太陽病發汗後胃中乾欲得水者少少與之令胃中和則愈若小便不利微熱消渴者不可

與以汗多胃中燥。猪苓湯復利其小便故也。蓋嘔吐猶汗之走津液。膈上猶表也。何用藥不同。蓋二方以邪內連下焦。故不用澤瀉滑石阿膠。猪苓之味淡。從膈上肺部滲其積飲。又防水入停腹。白朮和中益津。使水精四布去故就新。奚必味多。但用之得其當爾。嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥者難治。四逆湯主之。

四逆湯方

附子一枚  
生用

乾薑一兩  
半

甘草二兩  
炙