

薛立齋醫案全集

辛酉孟夏中澣
後齋署



吳郡薛 己著

痘疹受病之由

二都吳中府校
武進千鳳岐重校

痘疹之由。因兒在胎。食母五臟血。穢伏於命門。或至天行時氣。或驚駭跌撲。或飲食所傷。因而發之。狀類傷寒。其症面燥腮赤。目胞亦赤。呵欠頓悶。下涼。乍熱。咳嗽。嚏噴。足稍冷。耳冷。尻冷。多睡。睡驚。耳後有紅絲赤脉。此其候也。五臟各具一証。肝藏水。疱。肺藏膿。痂。心藏癰。脾藏疹。歸腎。變黑。蓋以太陽起於右腎之下。前發左腎足太陽。膀胱寒水夾脊上流上頭下額。逆手太陽。丙火不得傳。道逆於面上。故顯是諸症。蓋壬癸寒水。尅丙丁熱火。故也。凡瘡疹初起。一發便出盡者。必重。瘡火疹者。半輕。半重。稀少者。輕。裏外微紅者。輕。外黑裏赤者。微重。外白裏黑者。太重。瘡端裏黑點如針孔者。勢劇也。青乾紫陷。睡昏。汗出不止。煩躁熱渴。腹脹啼喘。大小便不通者。困也。

痘疹正狀

痘疹正病。蒸熱一日稍涼。現癰。一日至三日足心齊。漸大如珠。結成膿。稟飽滿。漸至蒼蠟色。自初紅癰為始。計七日當成。屬結痂。此則言其大略也。人有虛實之不同。病有淺深之各異。脾胃充實。血氣調和。皆依期而愈。若調治失宜。虧損脾胃。或寒暄失度。必致遷延。大抵形勢既正。而無他症。不必用藥。此先哲之格言也。鄭氏云。凡瘡痘欲出先發熱。輕者三日。次五日。速者不過七日。此約法也。一日太陽傳膀胱。二日陽明傳胃。三日少陽傳膽。四日太陰傳脾。五日太陰傳腎。六日厥陰傳肝。七日還經。五臟六腑傳遍。故七日而止也。又有因傷寒至七日以後。或已汗。或未汗。或吐下後熱不除。此毒氣盛而未發。熱毒入胃。發於皮膚。成癰者。狀如蚊蟲所嚙。赤者十生一死。黑者十死一生。及有胃熱發黃。狀如橘色。下利者死。又有成隱疹者。或白泡者。此皆傷寒熱毒不除。多變此疾。故發癰不可用表汗藥也。

痘疹輕重

輕者作兩三次出大小不等頭面稀少胸前眼中皆無根稟紅活肥滿光澤形似水珠不渴瀉不煩躁。重者一齊出密如蠶種頂陷如茱萸樣或平頭灰白色渴瀉煩躁頭溫足冷身熱不除治之如法十全九

輕變重所犯者者七

不忌口味不慎飲食致傷脾胃。○先曾泄瀉裏虛毒氣不能發出。○冒風寒所謂春夏之氣為順秋冬之氣為逆。大忌感冒風寒損表。○犯房室。○餌涼藥宜用滋補血氣壯脾之藥不宜清涼宣利之劑。裏寒則毒氣不能攻出。○穢氣相觸血氣聞香則順聞臭則逆。順則易出易醫逆則難愈。○生人輒至恐外人由生產房室或臨喪而來或帶醉或食腥氣因此穢惡之觸皆為害也。

重變輕所慎者五

謹避風寒及房內有風亦宜避之。惟夏不忌如遇狂風輒寒亦宜避之。○常和煖寒則添衣熱則減去務得中和毋令太過不及。○節飲食忌柿橘西瓜菱角水蜜等冷物恐內傷胃氣尤忌肥肉油膩恐泄瀉忌鹹物恐作渴忌酒葱蒜魚羊等腥物恐致瘡痒務使脾胃充實其瘡易出易醫也。○大便稠飲食調和不致泄瀉。一日二日一次為調日行二三次為利三四日不行為秘。○依方調理避風寒節飲食詳症用藥庶不致輕變為重矣。

不治五症

咳嗽聲啞飲食挫喉。○腹脹氣促悶亂不寧。○渴瀉不止咬牙寒戰。○瘡嫩易破痒塌不止。○紫黑灰色頂陷喘渴。

紅

癰

標

現

之

二日

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一日先退熱放標者必輕又放標後一日身涼稀密已定仍熱煩躁尚未盡有兩三次出熱方定紅現者吉或隱或現者凶


二日如粟米大稀而紅滿者吉二日頂陷灰白色者次之

三日夫滿如珠者吉灰白色者次之

圖之濃灌經瘡標圖

三日必出定已後身反發熱悶亂煩渴者凶
初發○○○○有兩三日出大小不一等先出者先灌漿後出者後灌漿如水珠光澤根窠紅活者吉
如珠○○○○不渴渴悶煩者不必服藥微渴微痒不渴者不妨亦不須服藥若一齊並出稠密灰白
根活○○○○色頂陷煩躁渴躁者急宜治之

收靨之圖



瘡已飽滿如膿窠將收漸至蒼蠟色有等無膿有黃白色自放標一日為始至七日收靨至十日收完
此為正病有遷延八九日方靨至十四五日方完亦有之但不瀉渴悶亂其瘡飽滿無陷手按之堅硬
皆好將收時漸退紅腫或瘡中收靨覺有黃蠟色或外面先靨根下皺皮男從面收至頭背女從面
收至胸腹收後離肉不粘易脫俱好有微渴痒痛有身收完足收遲亦不妨身微熱不能食者亦有之
只怕瘡嫩易破悶亂痒塌者凶

靨後餘症

瘡疹收靨之後預宜調理就有出外不避風寒不節飲食偏無病者莫非胃實體壯亦宜仔細病初
痊臟腑初安脾胃尚弱動止飲食過度復病喘咳腹脹必凶又血氣尚弱動止太早病後皆凶况肌
肉嬌嫩冒風易得感寒頭痛身熱則難治矣

症

腹脹氣促根窠不赤之症

陳丈宿先生云瘡瘡已出未愈之間或瀉渴腹脹氣促其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也先與
十一味木香散以和五臟之氣後與十二味異功散送七味肉豆蔻丸以助臟腑之氣竊謂瘡瘡既出不
光澤不起發不紅活或泄瀉作渴或肚腹作脹或氣促作喘寒戰咬牙或手足指冷肢體孱弱作渴飲湯
陽氣虧損內虛寒而外假熱也用十二味異功散若作渴飲湯手足不冷者脾胃虛弱也用五味異功散

凡痘瘡先出不如式後出而紅活或成片色赤而穢氣者俱無妨

一小兒出痘四日腹脹瀉渴脾胃虛寒也用十二味異功散一劑又用參芪內托散實膿而忽寒熱咬牙此膿實而陽氣虧損也用參附湯獨參湯而愈

一小兒痘四日腹脹瀉渴氣促體倦此脾氣虛也用人參白朮散加木香煎送四神丸一服諸症頓止但膿遲作渴此表裡血氣俱虛用參芪四聖散大補湯而愈

一小兒痘瘡作渴腹脹小便不利此邪氣壅滯也用木通芍藥湯一劑諸症稍愈用參芪四聖散其發漸實用參芪內托散結鑿而愈

一小兒痘瘡將愈腹脹手足或冷或熱此陽氣虛寒也先用十二味異功散手足不冷此陽氣漸復也乃用五味異功散加木香而愈

一小兒痘瘡大便利而小便秘腹脹作喘手足並冷此脾氣虛也先用葶藶木香一劑又用五味異功散加木香二劑而愈後腹脹不食口角流涎仍用五味異功散而痊

一小兒痘瘡將愈忽腹脹泄瀉侵晨為甚飲食不化余謂脾胃虛弱朝用人參白朮散夕用二神丸而瀉止又用參芪內托散兼托裡散而鑿

一小兒痘瘡腹脹泄瀉飲食不化此脾腎氣虛用人參白朮散豆蔻丸而愈

人參 黃芪 炒 當歸 川芎 厚朴 卷 防風 各五 桔梗

白芷 官桂 各三 紫草 各五 木香 甘草 各三 右入糯米一撮水前量服之 其藥

飲水瀉渴亦宜服之

參芪四聖散治痘瘡已出六七日不能長不生膿或痒塌

當歸 芍藥 炒 黃芪 川芎 各五 白朮 茯苓 紫草 如無紅

木通 防風各三 糯米粒百 右水煎母同服

葶藶木香散治大便自利小便澀滯喘嗽腹脹不能食多服為妙

猪苓 渴瀉 茯苓 白朮 官桂各五 滑石錢 葶藶

木通 木香 甘草各五 右水煎量大小服之

木通芍藥湯治痘瘡作渴腹脹小便不利

木通 芍藥 白朮各五 川芎 陳皮 乾葛各三 甘草二 右水煎服

十全大補湯

當歸 川芎 白芍藥炒 熟地黄 人參 白朮 白茯苓

甘草炒 黃芪炒 官桂各等 右水煎量見大小服

參附湯治痘疹陽氣虛寒咬牙寒戰手足並冷或吐瀉不食飲沸湯不知熱用獨參湯加好真附炮如法

者每劑先加一錢未應多加之更不應加至四五錢或等分亦不妨但用之以運其陽氣如已脫者不

治

獨參湯治陽氣虛弱痘瘡不起發不紅活或膿清不滿或結痂遲緩或痘痕色白或嫩軟不固或膿水不

乾或時作痒或畏風寒用好人參一兩生薑五片大棗五枚水二鍾煎八分徐徐溫服嬰兒乳母亦服

胡荽酒

用胡荽一把以好酒二鍾煎一兩沸令乳母含噴兒遍兒頭面并房中須燒胡荽香能辟邪穢氣使痘

疹出快若痘疹已出而飲食少思宜用棗子燃火兒聞棗香尤能開胃進飲食解毒氣若因飲食停滯

未及消導者不宜用

托裡消毒散

托裡散二方見 七味白朮散即人參白朮散 屬陽

十一味木香散

十二味異功散二方見 痘灰

五味異功散方見 痘寒

肉豆蔻

二神丸

四神丸

三妙丸

發熱口渴煩躁不止之症二

陳文宿先生云瘡疹始出一日至十日。渾身壯熱。大便黃稠。是表裡俱實。其瘡必光澤起發。必肥滿。必易壓而不致損傷也。又云瘡疹發熱口渴煩躁不止者。切不可與冷水。蜂蜜。柿子。西瓜等生物。及清涼飲消毒散等藥。恐內損脾胃。以致腹脹喘滿。寒戰咬牙。則難治。竊謂前症若二便自調。飲食溫和。口渴飲湯。手足不熱。是為虛熱。不可食生冷之物。若二便秘結。飲食喜冷。口渴飲水。手足並熱。是為實熱。可與冷水飲之。凡痘出而熱未止者。既出盡則熱自止。

一小兒腹脹發熱。密而根顯不明。色不紅。活潑不滿。先君謂脾氣虛而毒未盡也。用參芪四聖散痘果復出。熱止。紅活分明。又用參芪內托散而壓。

一小兒腹脹作渴。發熱成片。先君謂脾氣虛弱。痘毒未盡。用參芪四聖散二劑。先出者實。藥後出者穢。氣而愈。

一小兒痘腹脹二便自利。手足並冷。先君云脾胃虛寒。用十二味異功散一服。又用五味異功散加木香二劑。却去木香。又一服而痊。

一小兒痘瘡發熱作渴。此痘出未盡。脾胃虛而熱也。用人參麥門冬散一劑。痘復出而熱渴止。用人參白朮散而飲食進。用參芪四聖散而漿潰。用托裡散而瘡壓。

一小兒痘腹脹足冷。內熱作渴。此胃氣虛而津液不足也。余先用五味異功散二劑。又用參芪四聖散腹脹。用人參白朮散而壓。

一產婦出痘。寒戰咬牙。腹脹作渴。足冷身熱。此脾胃內虛寒而外假熱。先用十全大補湯加桂附四劑。乃去附易乾薑。又四劑。却用參芪四聖散五味異功散加歸芪而壓。

一姪婦出痘。發熱足冷。腹脹。此脾胃虛弱而毒未發也。用紫草木香散及用八珍散而實。膿倍加參芪。又

數劑而愈

人參麥門冬散一名麥門冬散治痘瘡發渴

麥門冬兩 人參

甘草

陳皮

白朮

厚朴各半兩

右每服三錢水煎

量兒大小加減

按前方若因熱毒作渴宜用之若因中氣虛弱作渴當用人參白朮散

紫草木香散治痘瘡裏虛痒塌黑陷發熱

紫草

茯苓

甘草

白朮

木香

人參各等分

糯米

右每服三錢

水煎

清涼散方見大便不通

人參白朮散方見發熱屬陰屬陽

托裡散方見痘癰

十全大補湯方見腰膝酸

十一味木香散

十二味異功散方見痘灰白色

參芪四聖散方見腰膝酸

八珍湯方見頂陷灰白色

痘瘡出遲屬各經所主三

陳文宿先生云痘瘡出不快誤言毒氣壅盛用藥宣利解散致臟腑受冷榮衛滯滯則氣血不能充貫其瘡不起發不光澤不充滿不結實不能成痂多致痒塌煩躁喘渴而死竊謂海藏云痘瘡出不快如身後出不快者足太陽經也用荊芥甘草防風湯身前出不快者足陽明經也用升麻葛根湯身側出不快者足少陽經也用防風芍藥甘草湯若便利調和而出不快者熱在表也宜葛根湯微發之又有上中下三部先上部次中部又次下部纔出齊而自愈又有作三次而出者錢氏云三日不快不出用消毒之藥仍不出脉平靜者本稀也不必服藥大凡五六日間當解毒補托以盡發於表七八日間毒氣不能盡出而反入於內必用藥驅出之痘疹方云瘡起遲而小便澀滯咳嗽有痰用仙聖散出而不長隱於肌膚用人參透肌散色赤而出不快用紫草透肌散出而不勻用升均湯出而不長不貫用參芪四聖散出而色不

紅活用紫草快斑湯出而小便赤澁用紫草木通湯出而漿不回用參芪內托散若色赤而兼痒者屬血虛有熱用四物牡丹皮色白而兼痒者屬氣虛有熱用五味異功散加當歸木香若發熱大便秘者用犀角消毒散發熱大便調和者用人參麥門冬飲寒戰渴瀉飲沸湯口不知熱用十二味異功散作渴飲水雪口不知寒用四順飲地黃丸手足不冷飲湯溫和者用五味異功散或托裡散

一小兒發熱痘出身涼根顆紅活余謂表裡血氣皆實而不用藥後果然凡三四日前先發熱而痘出或熱一次涼一次而痘出者毒勢輕也皆不必用藥其血氣實而托裡血氣虛而宣毒者多致有悞

一小兒痘出不快色次紅活此血氣虛弱用參芪四聖散出而色赤再劑色紅活起發又用透肌散而壓一小兒第九日痘將靨而熱不止脉滑而數皆為不治先君謂痘未盡耳非敗症遂用快斑湯一劑果出一番至十七日而痂落

一男子發熱咳嗽噴面燥腮頰目胞皆赤遍身赤爛余謂此心臟痘疹之狀也彼因疑惑而未用藥餌旬餘赤爛皆為膿疱且紅活起發余謂痘疹明矣既紅活起發不必服藥至十七日大便下膿血瘡加而痊

紫草透肌散治痘瘡色赤不快或痒塌

紫草

蟬脫

木通

芍藥

甘草

右每服三錢水煎

人參透肌散治痘瘡虛而有熱雖能出快而不齊整隱於肌膚間者

人參

紫草

白朮

茯苓

當歸

芍藥

木通

蟬脫

甘草

糯米

右每服三錢水一盞半煎半盞徐徐服

紫草木通散治痘疹出不快小便赤澁

紫草

木通

人參

茯苓

糯米

甘草

右每服二錢水煎

防風芍藥甘草湯

防風

芍藥

甘草

右每服一二錢水煎

荊芥甘草防風湯

荊芥

甘草

防風各等

右每服一錢水煎

升均湯治痘瘡已出不均或吐瀉熱渴

升麻

乾葛

芍藥

人參

白朮

茯苓

甘草

紫草草

如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎量服之

四物湯治痘瘡血虛發熱或煩躁不寐作痒色赤

當歸

熟地黃

芍藥

川芎各一錢

右水煎服

仙聖散治痘出不快小便赤澀咳嗽有痰

紫草

枳殼

黃芪

甘草

木通各等

右每服二錢水煎

十二味異功散

葛根湯

參芪內托散二方見腹脹氣促

升麻葛根湯

方見水痘麻症

紫草快癰湯方見大通

四物湯方見通

人參麥門冬散

方見前

參芪四聖散方見腹脹氣促

五味異功散方見寒嗽牙痛

犀角消毒散

清涼散方見大便不通

地黃丸方見熱屬陰虛陽

泄瀉咬牙作渴之症四

陳文秀先生云痘瘡瀉水穀或白色或淡黃者宜服十一味木香散送肉豆蔻丸若瀉多津液內耗血氣不榮其瘡雖起發亦不能結靨如身溫腹脹咬牙喘渴者難治緣津液枯耗而飲水不止瀉散真氣故多死也速與十一味木香散救之如不愈急用十二味異功散竊謂豆蔻丸治陽氣虛寒滑瀉之逆劑蓋腎主大便若因腎氣不固而致前症者宜用十一味木香散或六君子湯送四神丸若欲瀉不瀉脾氣虛而下陷也用補中益氣湯加肉豆蔻飲食不化手足並冷脾氣虛寒也用四君子湯加附子

一小兒出痘泄瀉腹脹煩渴飲沸湯而不知熱先君謂陽氣虛寒用十一味木香散二劑泄瀉頓止飲湯嫌熱此陽氣復也乃用六君乾薑木香歸芪而醫

一小兒痘瘡愈後泄瀉飲食不化此脾腎氣虛用六君補骨脂肉豆蔻瀉止用參芪四聖散接補元氣而痊

一小兒發熱飲冷唇舌皴烈瀉真穢臭先君以為內蘊用前胡枳殼散一劑稍愈又用竹葉石膏湯加漏蘆乳母服之其兒頓安

一小兒痘後作瀉久不愈而肌體骨立此脾腎虛弱也用二神丸五味異功散漸愈因停食吞酸作瀉肚腹重墜此脾氣下陷也先用補中益氣湯為主佐以五味異功散漸愈又用參芪四聖散托裡散治其瘡而痊

一小兒出痘發熱燥渴色黯出血足熱腰痛此脾腎虛熱用聖濟犀角地黄湯一劑却用地黃丸料數劑而貫又用參芪內托散而痊

一小兒痘瘡將愈侵晨泄瀉飲食不化余以為腎瀉朝用補中益氣湯夕用二神丸而愈

四神丸治脾腎虛弱大便不化飲食不思或泄瀉腹疼等症
肉豆蔻_{二兩} 補骨脂_{四兩} 五味子_{二兩} 吳茱萸_{一兩} 右為末用水一鍾生薑八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉九小豆大每服二三十丸食前白湯下去五味子吳茱萸名二神丸

二神丸治瘡瘍因脾腎陰虛泄瀉

補骨脂_{四兩}

肉豆蔻_{二兩}

生用

右為末用紅棗四十九枚生薑四兩水一鍾煮乾取棗肉九桐子大每

服二三十丸白滾湯下

肉豆蔻丸治瀉水穀或白或淡黃不能止者

木香

縮砂仁_{各二兩}

白龍骨_煨

譚子肉_{半兩}

赤石脂_{半兩}

枯白礬_{各半兩}

肉豆蔻研 右為末糊丸黍米大一周歲每服三五十九三歲兒服百丸米飲下瀉甚者前木香散或異功散送下

竹葉石膏湯治痘瘡胸中煩熱小便赤澀口乾作渴兼有赤斑者亦宜服犀角散防心煩

七味白木散即人參白木散春見後

六君子湯

四君子湯

十一味木香散

十二味異功散四方見症灰自色

托裡散方觀症

五味異功散方見寒戰咬牙

前胡枳殼散方見喘渴粘

痘瘡發熱屬陰屬陽之異五

陳文宿先生云痘瘡之症有陽盛陰虛有陰盛陽虛陽盛者飲冰雪而不知寒陰盛者飲沸湯而不知熱陽盛則補陰用木香散加丁香官桂陰盛則補陽用異功散加木香當歸竊謂經云大寒而其熱之不熱是無火也當益火之源以消陰翳大熱而甚寒之不寒是無水也當壯水之主以鎮陽光若前症發熱作渴手足並冷大便自利喜飲熱湯此陰盛也宜用十二味異功散八味丸若發熱作渴大便秘結手足並熱喜飲冷水此陽盛也宜用四順散六味丸若煩熱作渴面赤睛白此為腎經虛熱宜用地黃丸之類治之及時亦有生者京師小兒出痘或作渴喜飲冷水者恣與飲之再不服藥如期而愈亦無痘毒之患蓋北方人臥火坑飲燒酒有熱與水相搏而然也小兒面色目睛多白者乃稟腎氣虛也出痘必作渴用地黃丸煎與恣飲多有生者

一小兒痘寒戰咬牙瀉瀉腹脹手足並冷時當仲夏飲沸湯而不知熱此脾胃虛寒之熱也先用十二味異功散一劑頓安又用六味附子一劑後用五味異功散而愈

一男子出痘色紫作渴飲水腰痛足熱耳聾此稟腎氣不足用加減八味丸料煎與恣飲熱渴頓止佐以補中益氣湯加五味子麥門冬滋其化源而愈

一小兒十四歲出痘色黯兩足及腰熱痛便秘咽乾口渴引飲先君謂稟腎不足用加減八味丸料作大

劑煎與恣飲至二斤。諸症悉退。又佐以益氣湯及八珍湯各十餘劑而痊。

一小兒痘瘡發熱作渴腹脹寒戰咬牙飲冰雪而不知寒。悉似火症。但兩足並冷。此陽氣虛寒也。先用十二味異功散一劑。隨用五味異功散加薑桂漸愈。乃去桂。又二劑而痊。

六味地黃丸治腎虛痘瘡發熱作渴等症。

熟地黃八兩 山藥

山茱萸四兩 潯澤瀉

白茯苓

牡丹皮銘三 右為末入地黃膏量

加米糊丸如小豆大煎服尤好

七味白朮散

一名人參

治胃氣虛弱或因起伐或因吐瀉口乾作渴飲食少思如飲冷者去木香

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草炒

人參

乾葛

右每服五錢

水煎徐徐服

八珍湯

補中益氣湯

十一味木香散

三方見痘

十二味異功散

五味異功散

二方見寒

加減八味丸

即六味地黃丸加五味子肉桂

清涼飲助硯

痘瘡大便不通之症六

陳文宿先生云痘疹四五日不大便以肥猪脰白水煮熟切豆大五七塊與食之滋潤臟腑瘡易落切不可妄投宣利之藥。真氣內虛瘡毒入裡如六七日身壯熱不大便其脉緊盛與三味消毒飲微利之竊謂前症若毒在肌肉而未能盡發脉浮而緊者最宜此藥疎解其毒若脉沉而緊者宜用前胡枳殼散疎通毒氣以絕其源。若口舌咽喉腫痛瘡毒甚也用射干鼠粘子湯若大便既通作渴飲湯脾胃氣虛也用人參白朮散凡燥糞在直腸不能下者宜用猪膽汁導之忌用疎利之劑恐復傷胃氣則瘡未出者不能發出已出者不能貫壓大抵分辨虛實當以手足冷熱或飲水飲湯驗之

一小兒大便不通痘赤作痛發熱作渴手足並熱比餘毒內作用前胡枳殼散一劑大便隨通諸症頓愈

又與六味活血散而愈

一小兒痘瘡發熱作渴嫩赤脹痛大便秘結此熱毒在內先用清涼飲一劑諸症稍退又用鼠粘子湯一劑諸症全退再用紫草快斑湯而貫膿更用消毒飲而痘靨

一小兒痘赤狂喘大便不利此胃經有熱先君治以犀角地黄湯芥菜汁而痊

四順清涼飲治積熱煩赤作渴四肢驚掣大便秘澀

赤芍藥

當歸

甘草

大黃各等

右每服一錢水煎

按清涼飲乃苦甘疎瀉內熱之劑若熱毒在內大便秘不通表無他症宜用之連翹飲乃苦寒發表內疎之劑若表裡實熱煩渴飲冷大便不通小便便秘結者宜用之不可過劑恐妄發則成痘爛妄下則成虛脫也

消毒飲

荆芥錢

防風

牛蒡子各一錢

甘草錢

右水煎量服之

射干鼠粘子湯

方見痘

三味消毒飲

人參白朮散

方見

前胡枳殼散

方見

六味活血散

方見

紫草快斑湯

清涼飲

消毒飲

方見

犀角地黄湯

方見

欲靨不靨欲落不落之症

陳文宿先生云痘瘡自始出至十三日當忌外人恐有卒暴風寒穢惡或狐臭之氣觸之父母仍忌房事若痘欲靨不靨其痘欲落不落若腹脹煩躁忌食水蜜生冷之物若食之轉渴而死急與木香散救之如身熱煩渴者宜服人參麥門冬散身熱大渴人參白朮散如不愈仍服木香散竊謂前症乃脾胃氣虛津液不足所致非實熱為患也如身熱煩躁手足發熱脾胃有熱也用人參麥門冬散身熱作渴手足微冷者脾胃氣虛也用人參白朮散腹脹泄瀉或寒戰咬牙脾胃虛寒也用十一味木香散泄瀉氣促手足並

冷脾氣脫陷也用十二味異功散凡瘡結痂作膿皆由元氣充實而內融也若審見虛弱便與滋補血氣無虧可保終吉若見不屬而投補劑恐不及而誤矣

一小兒十二歲出痘不屬腹脹泄瀉不食手足並冷先君謂脾氣虛寒用十一味木香散一劑諸症頓愈再劑不時索食但惡寒此脾氣猶虛也用木味異功散加木香及六君子湯而諸症愈又用參芪內托散而痂落

一男子三十歲遍身發熱作痛有赤顆旬餘始知為痘用參芪四聖散托裡散各四劑欲屬不屬用十全大補湯數劑而痂脫

一姪婦出痘月餘欲屬不屬面赤晡熱此肝脾血虛而有熱也先用加味逍遙散熱退又用八珍牡丹皮而熱止但氣血皆虛用十全大補湯而痂脫

一小兒出痘貫膿不屬症如實熱余謂血氣虛甚之假熱也用十全大補湯數劑漸愈忽又惡寒余又曰此邪氣退而真氣遂見虛象也仍用前藥內參芪各五錢數劑而愈

十全大補湯治稟賦不足寒熱自汗食少體瘦發熱作渴頭痛眩暈方見氣促

逍遙散加味逍遙散治乳母肝脾有熱致痘瘡欲屬不屬欲落不落

當歸 甘草炙

芍藥酒炒

茯苓

白朮炒

柴胡各一

右水煎母子同服

十一味木香散

十二味異味散方見症

六君子湯方見症

五味異功散方見寒戰咬牙

人參麥門冬散

人參白朮散方見屬發熱

參芪托裡散

托裡散方見症瘡

涕唾稠粘大便堅實之症八

陳文宿先生云痘瘡涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤用人參清膈散如痰實壯熱胸中煩悶大便秘結小便赤澀煩渴飲冷宜便堅實臥則喘急用前胡枳殼散竊謂前症若肺胃實熱氣鬱痰滯或大便秘結小便赤澀煩渴飲冷宜

用人參清膈散表散外邪疎通內熱使邪不壅滯若毒蘊臟腑大便秘結用前胡枳殼散疎導其裡調和榮衛使邪自解散若痰嗽涕唾鼻塞不利宜用惺惺散或參蘇飲發散外邪庶元氣不傷痘瘡而易愈

一小兒痘瘡涕唾稠粘鼻塞不利此風邪所傷肺用參蘇散一劑稍愈又用惺惺散而痊

一小兒痘赤壯熱皮甚煩躁飲冷此脾肺實熱用人參清膈散頓退又用芥菜汁而壓

一小兒痘瘡作渴飲冷痰涎不利此上焦熱毒所致先君用人參清膈散犀角地黃湯各一劑熱退痰清

又用四聖散而痘起漿貫用參芪四聖散漿回痂脫

一小兒涕唾稠粘大便黑屎此胃經熱毒先君用聖濟犀角地黃湯芥菜汁而痊

一小兒痘愈後涕唾口乾飲湯腹脹此胃氣虛熱而津液不足也先用人參白朮散二劑後用五味異功散而愈又用參芪四聖散參芪內托散而痊

一小兒涕唾稠粘痰喘作渴大便不利此熱毒蘊於內用前胡枳殼散一劑諸症頓退又用濟生犀角地黃湯二劑而愈

前胡枳殼散治涕唾稠涎痰實壯熱胸中煩悶大便秘結則喘急

黃湯二劑而愈

前胡 枳殼炒 赤茯苓 大黃炒 甘草炙 右每服三錢水煎如身溫脈微并

瀉者不可服

按前方若肺實胃熱氣鬱痰滯大便秘結小便赤澀煩渴飲冷脈數宜用此方以表散外邪疎通內臟

使邪氣不壅滯且痘瘡輕而易愈

紫草四聖散治痘瘡出遲倒靨或小便赤澀發熱

紫草 木通 甘草炒 黃芪炒 右每服二三錢水煎服加款冬花桔梗等分名

仙聖散

參蘇飲治時氣傷風發熱惡寒咳嗽未明痘疹疑似之間此藥甚為穩當

前胡

人參

紫蘇葉

乾葛

半夏

茯苓

枳殼

陳皮

甘草

桔梗

石水煎服

人參白朮散治胃氣虛弱涕唾稠涎或因起代吐瀉口乾作渴飲食少思方見屬陰屬陽

五味異功散方見屬陰屬陽

人參清膈散方見屬陰屬陽

犀角地黃湯方見屬陰屬陽

四聖散方見屬陰屬陽

參芪四聖散

參芪內托散方見屬陰屬陽

惺惺散方見屬陰屬陽

頂陷灰白瀉渴之症九

陳文宿先生云痘瘡出二三日始出如粟米狀或菜豆大似水珍光澤明淨根窠紅者不須服藥若四五日大小不等根窠光澤明淨者亦不須服藥如陷頂灰白瀉渴者服木香散丹溪先生云痘瘡灰白色靜者怯者作寒看燥者勇者煖發者作熱看若初出之時色白者便須大補氣血參芪芍歸木芍甘草升麻木香丁香瀉者加訶子肉豆蔻若白色將靨如豆殼者蓋因初起飲水過多其靨不齊俗呼倒靨不妨但服實表之劑自愈如毒鬱於裏大小便秘者隨通利之竊謂前症不起發不紅活者此因脾胃氣虛用參芪四聖散頂陷灰白瀉渴者脾肺虛寒用木香散異功散若灰白色或痒而膿不貫用紫草四君木香色赤或痒而膿不貫用紫草木通湯貫而膿清稀用參芪內托散不應加附子緩則不救已出危症如出膿痘多有生者

一小兒色淡白痒塌此脾肺氣虛血弱也用紫草快斑湯參朮各三錢二劑稍應又二劑紅活起發又用托裡散參朮各三錢貫膿而愈

一小兒九歲痘色白手足冷此脾胃虛弱用六君子湯加水香當歸紫草四劑又用參芪四聖散加參芪各三錢而靨至十七日發熱煩渴脉洪大而虛用八珍湯而愈

一小兒十六歲痘色白脉虛浮按之甚微而短形氣倦怠飲息少思此血氣虛弱用紫草木香散內人參