



又方以輕粉為佐又以燈草為佐散腫消毒輕者可杖

清涼膏 治發背 歸芷 木鱉肉 白芨 白斂各一兩 乳香研 膩粉研 白膠研

丹五兩 麻黃十兩 右煎前六味候紫色去之入槐柳枝各七寸再煎入丹臨時入下

三生散 治護腫光色附骨癰如神 露蜂房 蟬退 頭髮各等分

燒灰存性三錢研細酒下 曾用五灰膏敷一宿待惡肉腐以刀去之盡以香油蘸

在錦上鈿乾覆之待好肉如巖合盡狀方可以收口用龍骨白斂乳沒等藥付之

肉疽用四物湯加減服之 有人性急味厚在脇下一點痛每服熟棗之藥脈輕則弦重

則乳知其痛處有膿因作肉疽病治之 甘草乾薑人參治肺痿 甘草四兩 乾薑二兩

參二兩 棗三箇 煎服

小青龍湯 治肺癰先解表之邪也此治腫瘍之法也

葶藶大棗瀉肺湯 治癰疽喘不得卧也 葶藶炒黃研九彈子大水三升入棗先煎二

升去棗入葶藶煎至一升頓服之先進小青龍湯三服後進此

桔梗湯 治咳胸滿唾如米粥當吐膿血 甘草 桔梗各一兩

葶藶湯 治咳有微熱胸中甲錯此治潰瘍之法也 葶藶二升 薏苡仁 瓜瓣仁各半斤

桃仁五十箇 煎服 又方瓜萋連樣不煎

薏以附子敗毒散 治腸癰身甲錯腹皮急如脹本無積聚身無熱脈數者

附炮 敗醬各二錢 薏苡仁十箇 水煎

大黃牡丹湯 治腸癰小腹或偏在膀胱左右大如掌熱小便欲調時自汗脈遲緊未成

膿可下之膿成不可下 大黃四兩 牡丹皮三兩 芒硝二兩 瓜子一箇 桃仁五十箇

水煮頓服

雲母膏有如腹痛百分不治脈滑腹微急脈當沈細今脈清數以雲母膏下之

雲母膏九梧子大一百丸 阿膠洋入酒下之膿血為度可止

青皮當歸丸 治便癰 李先生方 青皮 防風 歸 草稍 空心煎服

桃仁承氣湯 治便癰 張先生方

驗便毒方 葫蘆巴未服 川練反亦好

附骨疽方 青皮 藥 桂枝各加 芩真加 牛膝 甘草 薑汁 麻黃發不動加

又防風過經去硝黃入生犀角浮萍末治骨疽

癭狀多着肩背 如堅硬不可移若石癭 皮色不變名肉癭 如筋脈露結名筋癭

赤脈交錯名血癭 隨憂愁消長名氣癭

瘤狀隨氣凝結 有骨脂肉膿血之瘤

三十八乳癰

證乳房為陽明所經乳頭為厥陰所屬。因厚味濕熱之度亭蓄膈間與乳滯相搏而成

滯乳因兒口氣吹噓而成。有怒氣激其滯乳而成。凡病皆陽明經也。淺者為癰深

者為巖不治。治宜疏厥陰之滯清陽明之熱行汗血散腫結。方 煨石膏清陽明

橘皮 瓜蒞子清腫 甘草節行血 白芷 蜂房 台芎 香附二味鬱氣加之 青皮疎厥陰

葛根酒薑汁飲 又方 大黃 天花粉 歸一兩 甘草節已下一錢五分 瓜蒞子

穿山甲陳壁土炒 酒丸服

二十九瘰

因天抵食味之過鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此。三端變化引換須分虛實實者易治虛

者可憲夫初於少陽一經不守禁戒延及陽明蓋膽經至主決斷有相火且氣多血少

神效方 牡蠣粉五錢和雞胆為膏貼之 又用活石一兩肉桂五錢調湯服之好

證外有蝦蟆螺無核但腫 瘰在陽明少陽經 結核按之走痛 瘰或隱僻處 勞瘵

結核連數箇在耳邊或聚或散也 瘤等亦同 治宜瀉火火散結虛則補元氣實在

瀉陰火補則十全散下則玉燭散化堅湯 升麻一錢 葛五分 漏蘆足陽明

牡丹皮三錢去留血 歸 地黃生熟各三錢 連翹一錢生血脈 芪一錢護皮毛 芍此散三錢 桂散結蒸四熱用三錢 柴八錢

秦粘消腫 薑活一錢 防風 獨活各五分 昆布軟堅 三稜劑堅 廣朮 參 樸腹脹加

連 陳皮 木香氣不順加 大黃使秘加

大黃湯 大黃煨 皂角 甘草炙 煎服以麝香瓜蒌仁付之

法未破核者用火針針其上即用追毒膏點芋綫頭內針孔中 又用杜半膝搗付縛其

上一日一易如膿將盡又用玄參地榆滑石寒水石大黃等末付縛其瘡又用白厄菜

墨草同縛其瘡以寒水石大黃硝龍骨木香檳榔末收口 後又用竹茹亦能長肉白

膏藥收後紅不退用蠟燭窠付如已潰久不收口須用香付燈燒鉄烙烙其腐處盡後

依前治之

治耳接耳邊項上生塊核是 方 五倍子 香白芷 為末蜜調付

猴鼠糞以黃泥爐煨

去瘰癧毒 皂角子五兩 大黑豆一斤 甘草二兩 冬青葉汁一斤

右煮汁乾為度常食不過二料

四十發癩

因治屬表因風挾熱痰通經微汗之下之不可 屬裏者因胃熱助手少陰心火入於手

太陰肺也故紅點如斑生於皮之間耳白虎瀉心調胃承氣從長而用之

四十一丹疹

因熱與痰血熱也 夫斑痘疹丹皆惡毒血熱蘊蓄於命門遇相火合起則發也 外有

赤遊風天蛇漢丹疹癰斑其狀不同因則一也 治張歸之少陽相火 如遇熱之時

以通經平涼解之 如在寒之時以葛根升麻辛溫解之 如遇瘡癰黑陷腹內喘滿

者熱而氣虛也急以白虎解之 熱加參參主喘也主之全以涼膈調之 消湯

升麻根 薑活 藁本 細辛 柴胡 葛根 芩薄 生地黃 連 藥 翹

紅花 歸 蘇木 白朮 蒼朮 陳皮 吳茱萸 防風 甘草 又方 紫草

紅花子 芍 胡荽 歸 付方 剪刀草汁調原蠶沙付之

龍腦丸 治斑瘡倒靨面 豬心血調腦子成膏以紫茸湯化無腦用辰砂

四十二金瘡 附油大刀火等傷

脈至瘡出血太多脈死細者生浮數實大者死

治沒藥散 治刀箭傷止血住痛 定粉 風化皮 兩 枯白礬 錢

沒藥一字即二分半也一銅錢有四字之故另砥和勻搽之

聖愈湯 治出血太多 四物湯 參 芪 煎服

金瘡刀傷見血方 降真香末細貼之 石灰和入血伴餅旋乾貼之 煨大黃

乳香 五分 另研

石膏細研桐油二分水一分拌抹上 又淹灰搽竹亦良
救苦散 治熱油刀斧傷火傷犬咬傷 寒水石油調塗上

四十三傾僕

辱傾僕內有血腹脹滿脈堅強者生小弱者死 證瘀血為病成疾涎發於上 治同中

風證惡血歸內留於汗經脇痛自汗治宜破血行經 張論墜墜便生心恙痰涎發於

上也治宜補之 凡杖打閃胸疼痛皆血滯證可下之惡痛則傷血

神應散 治瘀血大便不通 大黃酒浸一兩 桃仁 紅花二錢 歸三錢 瓜蒞根二錢

炮穿山甲二錢 柴胡引經 麝透 熱酒下

紫金丹 治骨節折傷疼痛 炮川烏 炮草烏各一兩 五靈五錢 木鱉子去殼 黑牽牛各五錢

威靈仙 金毛狗脊 骨碎補 沒藥 麝香 紅娘子各二錢五分 地龍 烏藥

青皮 陳皮 茴香各五分 防風 自然銅燒淬四兩 禹餘糧燒四兩 酢糊丸 梧子大每十九酒下

三聖散吐之 治痰壅

四十四百藥中傷

脈浮澁而疾者生 微細者死 洪大而遲者亦生 治法在上治之

解毒丸 治食毒物殺人於必死 乾板藍根四兩 貫眾去土一兩 青黛 甘草蜜丸青黛良

服傾仆肉

秘傳方 續隨子 甘草 五味子 茶清下一二椀

四十五癩狂 附癩

脈大堅疾者癩病 脈大滑自己 脈小急實者死 循衣縫者死 虛而弦急者死

脈虛弦為驚 脈沈數為痰熱

因痰火驚 血氣者身之神也 神既衰之邪因而入 夫血氣俱虛痰客中焦妨礙不得用 以致十二官各失其職神聽言動皆有虛妄宜吐之而安 肺入火為譫語 肺主諸氣

為氣所鼓舞火傳於肺為之尋衣撮空胃中大實熱薰于心肺亦能譫語宜降火之藥 驚其神血不得寧也積痰鬱熱隨動而迷亂心神無主有似邪鬼可先吐之後以安神丸主之佐以平肝之藥膽王驚故也

證狂言譫語鄭聲辨 狂者閉目與人語語所未嘗見之事為狂也 譫語者合目自言 日用常行之事為譫也 鄭聲者身動無力不相接續造語出於喉中為鄭聲也 又蓄血證則重復語之

治痰者吐之 三聖散 火者下之 承氣湯 驚者平之安神丸 方總治 連

辰砂二味降火 瓜薑 星 半夏三味行痰 青黛 柴胡 川芎三味平肝

桃仁承氣湯 治熱入血室發狂

犀角地黃湯 治瘵血狂妄因汗不徹吐衄不盡瘵血在內面黃唇白便黑脚弱氣喘甚

則狂悶 犀角二兩 生地二兩 芍藥三兩 丹皮 大黃二兩

脈大遲腹不滿為無熱減之煎服 洪長伏三脈諸癩發狂以局妙香丸以針透眼

子冷水浸服之 弦細緩三脈諸癩李和尚五生丸

治癩方 黃升 白礬等分 研細用楊樹火燉過曲丸 又方 川芎二兩 防風一兩 豬牙

皂角 鬱金各一兩 明礬一兩 黃赤腳蜈蚣各一條 細末蒸餅丸梧子大空心茶清下十五丸

四十六驚悸

脈寸口脈動而弱動無弱為悸 跌陽脈微而浮浮為胃氣虛微則不能食此恐懼之脈

憂迫所作也 寸口脈緊跌陽脈浮胃氣則虛是以悸 肝脈驚暴有所驚駭

證悸有三驚悸忪悸疾飲閉於中腕其證短氣自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧

不安 悸心築然而動

治因血虛肝主血無血養則不盛故易驚心神忡亂氣與涎結遂使驚悸血虛治宜硃砂

安神丸 氣涎相結宜溫膽湯在心膽經 小兒驚搐涎潮如死乃母胎時受怖為腹

中積熱可墜之涎鎮火清心等是也悸因失志氣鬱涎聚在心脾經治宜定志丸失志

者或事不如意久思所愛 少陰心悸乃邪入於腎水乘心唯腎欺心火懼水也治在

於水以茯苓導其濕四逆散調之枳實柴胡芍藥甘草是也與驚悸不同名亦謂之悸故以別之 發搐疾飲為證脈必弦痰滯皆用下之 外有肝痺心肺瘡心虛寒皆驚

硃砂安神丸 治血虛驚悸 硃砂一兩 連一錢 歸五分 甘草五分 生地三錢 炒餅丸

溫膽湯 治心膽性易驚 半夏 竹茹 枳實二兩 芩三兩 陳皮三兩 甘草一兩

寒小石散 治因驚心氣不行鬱而生疾結為飲 寒水石煨 滑石水飛各二兩 甘草一兩

龍腦少許 熱則水下寒薑下

四十七疝癩

脈寸口弦緊為寒疝弦則衛氣不行衛氣不行則惡寒緊則不欲食 寸口遲緩遲則為

寒緩為氣之虛虛寒相搏而痛 脈沈緊豁大者為虛 脈滑為疝 急為疝 搏為

疝 見於何部而知其何臟

因證蓋全在肝經因濕熱在經抑遏至久又感外寒濕被鬱而作痛或大勞則火起于筋

醉飽則火起于胃房則火起于腎大怒則火起于本經 火鬱之甚濕熱便感濁液凝

聚并入血隧流于肝經為寒所束宜其痛甚 因痰飲積流入厥陰聚結成核 因痰

結其本經 因虛而感或內火外寒鬱之肝經與衝任督所會聚於陰器傷於寒則陰

縮入傷於熱縱提不收屬木性速急火性暴而痛亦暴矣

張論七疝 寒疝因濕地雨水風冷處使內過多其狀囊結硬如石陰莖不舉或控舉丸而痛宜以溫劑下之久而無子 水疝因醉過內汗出遇風濕之氣聚於囊中其狀腎囊腫痛如水晶或痒搔出黃水小腹或按之作水聲陰汗治宜逐水 筋疝因房勞及邪術所使陰莖腫或潰膿或痛而裏急筋速縮或挺不收或白物如精或莖痛之極則痒宜降火下之 血疝因使內氣血流溢滲入睪囊留而不去結成癰膿多血狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨約中俗云使癰治宜和血 氣疝因號哭忿怒氣鬱而脹哭怒罷則散其狀上連腎區下及陰囊宜以散氣藥下之小兒有此因父精怯故不治 狐疝與氣疝大同小異狀如仰瓦卧則入小腹行之則出入囊中宜逐氣流經之劑下之 癰疝因地卑濕江淮間所生其狀如升斗不痒不痛宜去濕之藥下之女子陰戶突出雖出類乃熱不禁固也

三因有四癰 腸癰因房室過度元臟虛冷腸邊管系不收墜入癰中上下無定此難治也 氣癰因七清臟氣不墜陰癰腫脹急痛易治之 小癰因濕氣得之則腫脹具陰易治也 卵癰因勞役坐馬致卵核腫脹或偏有大小上下無常此難治也

外有婦人陰門挺出亦名癰病

丁香練寶丸 已下出李 歸_瀉 炮附 川練 茴香_{已上各一而} 剉好酒三升同煮酒盡焙

乾作末入下藥 丁香 木香分五 蝎十箇 玄胡索五錢

右同為末酒糊丸梧子大每服三十九至百丸溫酒下

參朮湯 治虛痲氣器大者是 參 朮 梔 香附

倉卒散 治寒痲入腹卒痛小腸膀胱氣絞腹冷重如石出白汗 山梔四十九箇 燒半過 生附子

酒煎二錢 又一方 烏代附

神應散 治諸痲心腹絞痛不忍此方能散氣開結 玄胡索 胡椒 或加茴香酒煎二錢

牡丹丸 治寒痲心腹刺痛及血 川烏炮去皮共 牡丹皮四兩 桃仁炒去皮共 桂各五兩 青皮蜜丸酒下

桃仁湯 治癩出 大桃仁如法 茱萸 桂枝 蒺藜 青皮 白茯苓 檳榔 木香

海藻 三稜 莪朮任意加散 張用導水禹功豬腎通經等散下之

秘方 治諸痲 枳實治痛 梔 茱萸 橘子 山查去核積 桃仁藥血加之 川烏同梔

桂枝不定必用 荔枝核濕則加之 青皮

守九 治癩要藥不痛 蒼朮 星 牛 白芷散水 川芎 枳實 山查

應痛丸 治敗精惡物不出結成痲痛不忍 阿魏二兩酢和蕎麥麵裹火煨熟 檳榔

大者二箇刮空的乳香滿盛將刮下末用蕎麥拌作餅慢火煨 右細末入硃砂一錢

赤芍一兩同為末麵糊搜和丸如梧子大鹽酒下

雄黃散 治陰腫大如拳核痛不治 雄黃一兩 礬石二兩 甘草五錢 煎洗
又方 天蘿筋燒灰治疝妙

四十八脚氣

脈浮弦者風 濡弱者濕 洪數者熱 遲澀者寒 微滑者虛 牢堅者實 結則因

氣 堅則因怒 細則因悲 入心則恍惚妄謬嘔吐食不入眠不安左寸脈乍大乍

小者死 入腎則腰脚俱腫小便不通呻吟目額皆黑衝而喘左尺脈絕者死

因濕之病南方之人自外而感北方之人自內而致南方之人當風取涼醉房久坐濕地

或履風濕毒氣血氣弱邪氣併行虛膝邪氣盛正氣少故血氣滲溢則脾氣虛虛則弱

病發熱 四肢酸痛煩閉者因暑月冷濕得之 四肢結持弱者因寒月冷濕得之

北方之人因漣酪醇酒之濕熱下注積久而成腫滿癢痛也治宜下藥泄越其邪

證治因病脰腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時寒熱便澀不通甚者攻心而勢迫治之

不可後也 此壅之痰壅未成當宜通之調以黃蘗蒼朮類 壅既成當砭惡血而後

以藥治之 攻心脚氣乃血虛而有濕熱也治宜四物以加藥 筋動轉而痛者乃血

受實熱也治加桃仁苓連 有痰流注加竹瀝薑汁南星是也

李曰濕淫所勝治以苦溫以苦平發之透關勝濕為佐以苦寒泄之流濕清熱為臣故主

當歸拈痛湯一方治之 中脚膝論自內喜怒憂思寒熱邪毒之氣注於脚膝狀論諸
風謂之脚氣也 自外風寒暑濕皆有不正之氣中於脚膝謂之脚氣也實者利之虛
者益之六淫隨六法以治之七情隨六氣以散之

三因論乃風寒暑毒氣襲之也風則脈浮寒則脈緊濕則脈細表則脈浮裏則脈沈寒則
痛濕則重暑則煩風則行隨其所中經絡而治之 太陽經則頭項腰脊皆痛六淫中

之論同前宜以麻黃佐經湯 麻黃 乾葛 細辛 白木 茯苓 防風 防己

薑活 桂 甘草 陽明則寒熱呻欠鼻乾腹脹膝膈蹇中履外皆痛六淫亦然宜大

黃左金湯 大黃 細辛 茯苓 防己 薑活 黃芩 前胡 枳殼 樸 杏仁

少陽則口苦脇痛面垢體無膏澤頭目領銳痛六淫亦同宜半夏左金湯 半夏

乾葛 細辛 白朮 茯苓 桂 柴胡 麥冬 三陽合病寒熱關節重痛手足拘

攣冷痺緩氣嘔吐下利脈必浮弦緊數合前三方以發之 太陰腹滿咽連舌急胸膈

痞滿骨節煩疼四肢拘急浮腫宜六物附湯 炮附 桂各四兩 甘草二兩 茯苓三兩

防己四兩 白朮三兩 少陰土氣喘急小腹不仁腰脊足心脰膈皆痛六淫亦然宜八味

丸主之 牡丹皮 澤瀉 茯苓 桂 附 山藥 山茱萸 熟地黃 厥陽脇腰

偏疼陰氣抵小腹夾臍諸處脹痛一如中風宜神應養真丹 歸 天麻 川芎

薑活 木瓜 熟地 芍 三因元併藏府不同故也

當歸拈痛湯 治濕熱肢節煩痛肩背沈重胸膈不利身痛肝腫 薑活 炙草 芩酒炒

茵陳葉酒炒 歸各五錢 參 苦參酒洗 升麻 葛根 蒼朮各二錢 知母酒洗 防風

澤瀉各三錢 豬苓 白朮各五分 煎服

薑活導滯湯 治前證便溺阻隔先以藥導之服前方及治此方 薑活 獨活五錢

防己三錢 大黃酒煨一兩 歸三錢 麩炒枳實三錢

除濕丹 治諸濕 檳榔 甘遂 赤芍 威靈仙 葶藶 澤瀉各兩 乳香另研

沒藥各錢 黑丑炒三錢 大戟炒一兩半 陳皮二兩

腳氣方 治濕熱 生地 藥酒炒 蒼朮鹽酒炒 朮 芎 防己 檳榔 犀角 甘草

木通 黃連 黃芩二味熱加之 竹瀝 薑汁二味痰加之 石膏熱時加之 桃仁便實加之 牛膝溺溢加之

食積流注方 蒼朮 藥 防己 南星 川芎 白芷 犀角 檳榔 龜板血虛加之

血積轉筋方見論 治攻心脚氣 阮氏方 治膝痛脚骨熱或赤腫行步難

蒼朮四兩 泔浸一日 夜鹽炒 薑四兩 酒浸一日 夜炙焦 吹咀服

四十九蟲 附狐惑

脈虛者 蝕陰症 脈虛小者生 急緊者死

因證濕熱之生臟腑虛則侵蝕 腹內熱腸胃虛蟲行求食 上唇有瘡曰惑蟲食其臟

下有瘡曰狐 蟲食其疔 亦有口瘡非狐惑也

治集効方 木香 鷄虱炒 檳榔 訶子煨 蕪荑炒 炮附 乾薑各七錢 大黃一兩 五錢

烏梅或加連柏 右蜜丸 陳皮湯酢湯任下

化蟲丸 治蟲即化水 硫黃一兩 木香五錢 蜜陀僧三錢 炮附一箇

右先附末酢一升熬膏入藥和丸 菴豆大 荆芥茶清下二十九

秘方 治吐蟲 黑錫炒成灰 檳榔末 茶飲下 又方 川椒 酒糊丸治蟲 又方

炒雞子 白蠟塵 治寸白蟲酒糊丸妙 瀉心湯 治惑 苦參湯洗之 治狐

五十喉痺

因熱內結雖有蛾閉木舌纏喉走馬之名火則一也論咽與喉會厭與舌同在一門而用

各異喉以候氣故通於天咽以納食故通於地會厭管乎其上以司開闔掩其咽其食

下不掩之其喉錯必舌抵上齶則會厭能閉其咽矣四者相交為用缺一則飲食廢而

死矣及其為病皆火也夫 手少陰君火心主之脈手少陽相火三焦之脈二火皆主

脈並絡于喉氣熱則內結結甚則腫脹腫脹甚則痺甚痺甚則不通而死矣 至如噎

乾痛咽領腫古本強皆君火之為也唯喉痺急速相火之為也

證咽噤物之處咽腫則不能噤或嘔吐咯傷或多飲啖痰熱皆至咽系乾枯也 喉聲音

出入之處藏熱則腫其發暴腫閉塞或虛寒有懸癰生在上齶俗名鵝也咳而聲嘶喉

俗名聲散也 治法微以鹹藥之甚以辛散之痰結以苦吐之否則砭出血入火以涼

治之龍火以火逐之涼劑以熱服之是也宜刺少商出血

秘方 撲硝 各研 牙硝 各研 青魚膽 右以膽放二硝上乾方研為末竹管吹入喉中痰出

即愈

五匙散 治風熱喉痺及纏喉風 撲硝 一兩 礞砂 錢 腦子 三錢 鹽蠶以竹吹末入喉中

神効散 治熱腫語聲不出 荊芥穗 蓖麻 生去皮另研各一兩 蜜丸皂子大嚼含化

雄黃解毒丸 治纏喉風及喉痺倒僕失音牙關緊急不省人事 雄黃 錢 鬱金 錢

巴豆 去皮油十四箇 酢糊丸棗豆大熱茶清下丸吐則止

蜜附子 治膈寒咽門閉不能噤 大附去皮臍切大片蜜塗炙黃含噤津

又方 龍膽礬包烏梅肉內以棉裹含

龍火拔毒散 治纏喉急證先以鍼出血為上策緩以丹敷 陽起石 一錢 伏龍肝 各三錢 新

水掃之 又方 白瑞香花根研水灌之 秘方治痰其證皆因痰也 以鵝毛刷桐

油探吐之皂莢亦可吐 殭蠶研薑服亦可 生艾汁亦可