



THE
PICTURE
ENCYCLOPEDIA
OF ANIMALS

世界動物百科

世界動物百科

發行—廣達出版有限公司

代理—廣達書局

台北市士林區福國路19—3號9樓

電話—8352158 • 8352159

劃撥帳號—584966

局版臺業字第 **3085** 號

中華民國73年1月再版

版權所有 • 翻印必究

Q95-64

41

哺乳動物 (I) ——袋鼠・鼴鼠・蝙蝠・猴・兔等

目 錄

鴨獺	6
鴨獺的生活形態	7
針鼴	8
針鼴的生活形態	9
袋鼠與有袋類	10
袋鼠的生活形態	11
袋鼠的生產方式與育兒方式	12
各種袋鼠	13
有袋類在分類系統上的位置	14
各種有袋類動物	15
鼴	16
鼴的生活形態	17
斑袋貓、袋狼、袋獾	18
斑袋貓的生活形態	19
袋熊	20
袋熊的生活形態與習性	21
考拉	22
考拉的生活形態	23
食蟲類	24
原齋的同類	25
原齋	26
原齋的生活形態	27
原齋及爬蟲類在分類系統上的位置	28
鼴	29
刺齋	30
刺齋的生活形態	31
刺齋的種類	32
鼴齋的種類	33
尖齋	34
尖齋的生活形態	35
尖齋的種類	36
尖齋的生活形態	37
鼴齋的生活形態	39
鼴齋的種類	41
俄國水鼴	43
鼯猴	44
鼯猴的生活形態	45
蝙蝠	46
蝙蝠的生活形態——雷達使用法	47
蝙蝠的生活形態	48
蝙蝠的種類	50
小蝙蝠類——以昆蟲為主食的昆蟲	51
大蝙蝠	52
大蝙蝠的身軀與特徵	53
鼴蝠	54
各種鼴蝠的臉	55
吸血蝙蝠	56
吸血蝙蝠的生活形態	57
獮猴	58
獮猴棲息的地方	59
猴類進化到樹居生活的情形	60
適應樹上生活的二要素	61
原猿類（樹鼴）	62
樹鼴被稱為「有生命的化石」的原因	63
原猿類	64
狐猴的生活形態（節尾狐猴）	65
狐猴的生活形態	66
指猴	67
懶猴	68

猿	69
眼鏡猴	70
眼鏡猴的生活形態	71
蛛猴（卷毛猴）	72
蛛猴的生活形態	73
吼猴	73
夜猴	74
夜猴的生活形態	75
伶猴	75
狨、長獠牙狨、短獠牙狨	76
絨毛猴	78
絨毛猴的生活形態	78
松鼠猴	79
禿頂猴	80
禿頂猴的生活形態	81
長尾猴	82
長尾猴的生活形態	83
赤猴	84
獮猴	85
獮猴的社會組織	86
獮猴的各種類	87
狒狒	88
生活在熱帶草原的狒狒	89
熱帶草原狒狒的生活形態	89
山魈、鬼狒、獅尾狒狒	90
黑狒	91
黑狒的種類	91
鬚猴	92
葉猴、長鼻猴、金絲猴	93
類人猿	94
長臂猿	96

猩猩	98
猩猩的生活形態	99
黑猩猩	100
黑猩猩的生活形態	101
大猩猩	102
大猩猩的生活形態	103
人類	104
犰狳	106
九絆犰狳的生活形態	107
各種犰狳	107
樹懶	108
樹懶的生活形態	109
食蟻獸	110
大食蟻獸的生活形態	111
食蟻獸的種類	111
穿山甲	112
穿山甲的生活形態	113
兔	114
鳴兔	115
古兔	116
古兔的生活形態	117
穴兔	118
野兔	120
野兔的生活形態	121
各種野兔——美洲的野兔	122
雪兔	123
哺乳動物（I）	126
本文解說	128
用語說明、參考地圖	143
分類表	144

世界動物百科編譯人員

企劃

廖明志

編譯

沈永嘉

林德娜

余光華

陳玲珠

林淑女

陳蒼杰

高淑玲

吳珠美

王芝芳

李惠如

林淑堯

李春金

黃小紅

李家珍

編輯

周怡倩

馮屏

美工

洪曉春

李佳蕙

王薇薇

林青玲

《閱讀本書之前——應先瞭解本書閱讀方法》

在讀本書之前，希望您能先瞭解書中所使用的固定方法及形式。

* 本書的編排結構

原則上，打開的左右 2 頁中，都舉出 1 種動物來說明。

在這 2 頁中，依它的需要性，將下列事項分別加入說明，如：

《食物》 ■ 生活形態 分布 ■ 種類

* 動物小字典 * 等

在每 2 頁動物名稱之前的標題，所使用的圈圈記號，共分為下面這 3 種類：

◎……標題如是大科的動物時使用（本書中，大致相當於「目」）。

●……標題內的動物，比上述◎的種類稍少時使用（本書中大致相當於「科」）。

●……標題內的動物，比上述◎、●的種類更少時使用（本書中，大致相當於「種」）。

另外，根據動物的種類，有時不只 2 頁，還會繼續

說明下去，也有些會在 1 頁之內結束的。

* 動物種類名稱的表示法

列舉出世界代表種的這本圖鑑，對於動物的種名，是以中文和學名表示之。

* 測量動物大小的方法

根據動物的種類、形態差異，測量大小的方法也會有所不同。本書所列舉的動物，關於其身軀大小的測量法，在 143 頁皆有說明。

* 專門用語

在解釋中所使用的專門用語，也都在「用語說明」中加以詳細地說明。

* 分布圖

分布圖中出現的主要大陸和海洋名稱，亦在 143 頁的「參考地圖」表示出來。


另外，有關無法在圖上表示的地區所分布的動物，都分別詳細地在說明文中解釋（如圖片說明、「動物小字典」、「本文解說」等）。

哺乳動物(I) —— 袋鼠・鼴鼠・蝙蝠・猴・兔等



◎ 鴨獺

鴨獺
Ornithorhynchus anatinus
身長45公分，尾長15公分



鴨獺像鴨般具有扁平的嘴，只棲息在澳洲東部、和南部的塔司馬尼亞島，是一種十分稀有的動物。

具有爬蟲類產卵的特徵，可能是遠古時代地球上初次出現動物時，就一直存留下來的。

棲息於河流或沼澤邊，尋找水中的食物維生，四足有蹼，可以適應水中的生活。

■ 鴨獺的生活形態

鴨獺是像水鴨般具有扁平嘴的動物（哺乳動物），從同一個孔道排洩尿與糞。這是爬蟲類的特徵，在獸類中，只有鴨獺和針鼴具有此種特徵。

► 鴨獺在河、湖、沼澤邊，挖洞穴居。

傍晚與黎明時，便潛游水中覓食，其餘的時間都躲在窩穴之中。


除了生產時期，都是過著獨身的生活。



■ 鴨獺的同類



► 生產時，雌鴨獺會在窩穴中舖一層草。



鴨獺是卵生動物，但與其它的獸類一樣，都是以哺乳來養育幼兒。



► 鴨獺並非胎生動物，而是卵生動物，每次產卵 1 ~ 3 個。



► 經過十天以後，便可以孵出身長 2.5 公分的幼鴨獺。

剛孵出的幼鴨獺，眼睛仍看不見任何東西。



► 雌鴨獺沒有乳頭，乳汁都從腹部的皮膚滲出，附在毛上，幼鴨獺便舔食這些乳汁成長。



鴨獺的分佈

* 動物小字典 *

鴨獺 鴨獺
哺乳綱 單孔目 鴨獺科

由於消化管的末端，集中了生殖管與輸尿管，不論是糞便、尿液和卵都由同一孔道排出，這是單孔類動物的特徵。現存的單孔目動物，只有鴨獺和針鼴。鴨獺是卵生，生產方式為盤

割（與爬蟲類、鳥類的生產方式相同），沒有牙齒，具有變溫性，這一切都是爬蟲類的特徵。

然而，牠的體表面有毛，幼鴨獺以舔食母鴨獺乳腺所分泌的乳汁來成長，卻是哺乳類的特徵。因此，鴨獺是屬於此二者的中間性動物。

◎針鼴




針鼴分佈於澳洲與其鄰近地區，生活在乾燥的草原和森林中，大部份的時間都在睡覺，到了夜晚才出來活動、尋覓螞蟻等的食物。

針鼴具有十分尖銳的爪，和長長的吻（嘴尖），可以挖掘螞蟻的洞穴，此外，為了便於捕捉螞蟻，還有蚯蚓般的長舌頭。


《針鼴的成長形態》

► 針鼴和鴨獺一樣沒有乳頭，乳汁從母針鼴的腹部滲出，幼針鼴就舔食這些乳汁。

然而，針鼴卻比鴨獺更為進化。母針鼴的下腹部，有一個育兒囊，用來孵化卵子和養育幼兒，通常其中只有一個卵，幼針鼴可以得到最週全的保衛。



■針鼴的生活形態



◆針鼴的足趾強而有力，2～3分鐘內便可挖出足可容身的洞穴。



◆遇到危險時，就會豎起全身短而尖銳的刺，保護自己。




◆針鼴沒有牙齒，但卻能伸出很長的舌頭，來舔取昆蟲。



◆到了寒冷的季節，針鼴就會進入冬眠的狀態。

可是，由於其皮下脂肪肥厚，即使不出外覓食，也可以生存一個月左右。

針鼴的分佈



①長鼻針鼴屬（三趾針鼴等）。

②針鼴屬（針鼴等）

《鴨頸和針鼴（單孔類）在生物學上的位置》

〈爬蟲類〉



◆產卵性

◆全身有鱗覆蓋著，到了寒冷季節，就進入冬眠狀態。

〈單孔類〉

◆鴨頸和針鼴雖是卵生，卻舔食母體腹部所滲出的乳汁而成長。



〈哺乳類〉

◆身體雖然有毛覆蓋著，但一到寒冷季節，也會冬眠。



⑦◆生產方式為胎生，從母體乳頭吸吮乳汁成長，全身有毛覆蓋著，十分溫暖，通常不會冬眠。

動物小字典

鴨頸，針鼴

哺乳綱 單孔目

鴨頸、針鼴和爬蟲類一樣，都屬於總排出孔，也就是排洩、產卵都在同一孔道進行，稱為單孔類。

然而，根據哺乳類的身體不長鱗，而由毛覆蓋，以及其心臟、下顎骨的構造等特徵，可以推定單孔類是最原始的哺乳類動物，也是從爬蟲類進化到哺乳類的時期中所出現的動物。

◎袋鼠和有袋類



將產下的幼兒，放在腹部袋囊中撫育的動物，稱為有袋類動物。袋鼠，是有袋類中最著名的動物。

分佈於澳洲大陸，生活在廣闊的森林或草原中，以草或樹葉為食。

具有短小的前腳、強而有力的後腿及粗長的尾巴。

紅大袋鼠

Macropus rufus

身長132.5~161公分（雄），83.3~110公分（雌），尾長87.5~106公分（雄），66.5~78.5公分（雌）

■袋鼠的生活形態

►袋鼠喜群聚，通常以雌雄一對，以及數隻小袋鼠組成一個群集，總數約十來隻，沒有特定的領袖。



►袋鼠在一天中最悶熱的時間休息、到了涼爽的夜晚，就出外覓食。



►有時候，袋鼠可以跳躍到三公尺高的地方。

《食 物》（紅大袋鼠）



►到了繁殖季節，為了爭奪雌袋鼠，雄袋鼠會發生激烈的爭鬭。

這時候，牠們會用強而有力的後腿，猛烈地踢對方。

■袋鼠的生產方式與育兒的方式

►剛出生的袋鼠非常小(體重0.9公克，身長2公分)。眼睛看不見，也沒有長毛。



►交配後約三十三天，就會生產。




►在生產之前，母袋鼠先以舌頭舔弄袋囊的內側。




►►接著，再舔弄產道的出口到袋囊入口的毛，整理成一條平順的路，產出的幼袋鼠就抓住母體的毛，向上爬入育兒囊中。



進入育兒囊中的幼袋鼠，便含住其母四顆乳頭之一，在裡面生活八個月。



►幼袋鼠大約在囊中生活一年，離開育兒囊後的六個月內，仍然會把頭鑽進囊中，繼續吸乳。



■各種袋鼠



灰大袋鼠
Macropus giganteus
身長105~150公分
尾長73~100公分



長毛袋鼠
Macropus robustus
身長76~130公分
尾長60~90公分。

叢腿
Macropus irma
身長73~79公分
尾長86~108公分



大袋鼠

袋鼠

跳

岩跳
Petrogale xanthopus
身長65~80公分
尾長60~65公分



兔跳
Lagorchestes leporoides
身長45~49公分 尾長30~32公分



南麝鼠
Bettongia cuniculus
身長36~39公分 尾長31公分

袋鼠的分佈



黑臉袋鼠
Dendrolagus lumholtzi
身長51~53公分
尾長51~53公分



長毛袋鼠
灰大袋鼠
紅大袋鼠

動物小字典

有袋類


哺乳類 有袋目

有袋類動物是具有育兒囊的哺乳動物，和單孔類同屬於較原始的哺乳類動物。通常狗、貓等動物是屬於真獸類，有袋類的大腦比真獸類的大腦小，智能較低，齒數較多，行動遲頓而缺少變化，具有無法組成羣體的特徵。

有袋類和真獸類一樣是胎生，有乳頭，但由於大部份都沒有胎盤，所以雌性的有袋類動物，腹部都有育兒囊，產下的未成熟胎兒，可以在囊中繼續成長。

在白亞紀（約1億4000萬~6500萬年前）時期，有袋類在北美洲，歐洲大陸十分活躍，後來被真獸類所滅。可是，有袋類在被滅亡之前，已經有一部份進入後來與歐亞大陸及北美洲分開的南美，因此，牠們就繼續在連接著南美的澳洲大陸繁殖、生存，並且出現了許多不同的種類。

● 有袋類在分類系統上的位置



► 獸形目是具有爬蟲類、和哺乳類兩種性質的爬蟲類動物。

全獸類是已經進化成有胎盤的哺乳類動物。

有袋類是從真獸類的祖先中所分出來的哺乳動物。

，雖然有類似真獸類的地方，但也具有單孔類（鴨嘴獸和針鼴）的特徵。

有袋類動物分佈於澳洲、紐西蘭、北美洲、中美洲及南美洲。

■ 各種有袋類動物

鴟，△16頁



斑袋貓，△18頁



袋狼，△18頁



袋鼴



短皮袋狐



袋鼴



袋貓 (食蟻獸)



袋貓



袋獾，△18頁

袋熊，△20頁



負鼠



袋鼴



考拉，△22頁



羽尾袋鼴



袋鼴