

伤寒悬解

福建中医学院图书馆

地址：福州市模兜

太陽經中篇 五十六章

太陽壞病

太陽風寒有正治之法桂枝麻黃是也陽偏盛者恐異日之入陽明則有大青龍白虎湯早清其燥熱陰偏勝者恐異日之入三陰則有小青龍五苓散預去其濕寒處治不差病在太陽一經自當應藥而解不成壞病醫不知此實其實而虛其虛若汗若吐若下若溫鍼補瀉異施遂成壞病非復太陽本色矣壞病者卽後日之陽明與三陰也陽盛而泄其陰則入陽明陰盛而亡其陽則入三陰桂枝麻黃之證變爲亢陽孤陰是以曰壞至於陽明俟其府熱內實一下而愈猶爲逆中之順然而府邪傷陰失於急下亦伏死機則順中之逆正自不少若夫三陰陰盛陽負動懼危亡則逆居強半而順不十三仲景於是有救逆之法隨證處治轉逆爲從元通微妙良工苦心矣

太陽壞病提綱一 太陽五十四

桂枝麻黃太陽風寒主方也若至三日之久正將入陽明太陰之期業經汗下溫鍼而病仍不解則事當大壞未必猶在太陽卽太陽未罷而亦未必尙屬太陽桂麻之證是宜審觀脈證另立新法故總立壞病之綱詳開救逆之門也

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之太陽病治之得法當解於本經不至入府傳藏而成壞病若至三日之久已經發汗吐下溫鍼諸治而病不解則不在太陽定緣誤治入別經而成壞病當觀其脈證知其所犯何逆隨證治之曰壞病者非太陽

之本病故也

壞病提綱二 太陽五十五

本發汗而復下之此爲逆也若先發汗治不爲逆先本下之而復汗之爲逆若先下之治不爲逆

申明上章逆字之義風寒外閉宜辛溫發散而不宜下燥熱內結宜苦寒攻下而不宜汗若表邪未解裏邪復盛則宜先汗而後下若裏邪急迫表邪輕微則宜先下而後汗錯則成逆矣若治法得宜先後不失不爲逆也

太陽壞病入陽明去路 十五章

陽明從燥金化氣陽旺之人表鬱則燥動然不經誤治津液未耗燥氣之作何至遽盛及其汗下溫鍼傷津亡液燥氣大發經府合邪乃成下證雖不如三陰之險然陰虧陽亢亦伏危機未可率然也

太陽壞病入陽明桂枝證一 太陽五十六

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈桂枝湯主之 方在太陽五

太陽病先發汗不解而復下之設有府熱則下之當愈若使脈浮則表邪未解必不能愈以浮爲邪在表遣其外邪而反下之故令不愈當須解外則愈宜主桂枝也 此太陽表證未能而內有府熱固當下也然必外解而後可下若發汗未解而反下之設脈猶見浮則外必不愈故仍以桂枝解外

發汗亡津證二 太陽五十七

大下之後復遽汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣土濕金鬱 水土濕木鬱不能行水皆令小便不利小

青煎五苓散證之小便不利悉緣土濕而水停則小便之不利必因濕旺若汗下之後而見小便之不利是津液亡泄燥而非濕也然別無熱渴之證則其燥未甚勿用治之俟其津液續復得小便一利必自愈也汗下之後小便不利陽虛之人則陽亡而病濕陰虛之人則陰亡而傷燥此不見陽亡濕動之證故知是亡津傷燥也此亦人參白虎證而燥熱未作則病勢最輕故不須治之

麻杏甘石證二 太陽五十六

發汗後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯主之

汗後表寒未解鬱其肺氣熱蒸皮毛竅開而不能透泄故汗出而喘表得汗泄故外無大熱麻黃發表杏仁降逆石膏清金甘草培土則表裏俱解矣此亦大青龍證之輕者以在汗後故不用青龍汗後不可行桂枝亦大概言之他如發汗已解半日許復煩可更發汗宜桂枝湯未嘗必禁桂枝也

麻黃杏仁甘草石膏湯 十七

麻黃 四兩 杏仁 五十枚 甘草 二兩 石膏 半斤 碎

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

汗後作喘證四 太陽五十九

發汗後飲水多者必喘以水澀之亦喘

推原上章喘字之義汗出亡津液燥渴飲水飲水太多而汗後陽虛不能消散水停則肺氣壅遏故必喘以水澀之皮毛外閉肺氣鬱阻故亦喘也

麻杏甘石證五 太陽六十

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏主之

下後表寒未解鬱其肺氣肺鬱生熱蒸發皮毛而不能透泄故汗出而喘表寒裏熱宜麻杏甘石雙解之可也

下後不可行桂枝亦大概言之他如傷寒醫下之續得下利清穀章救表宜桂枝湯文傷寒大下後復汗心下痞章解表宜桂枝湯太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不愈章常須解外則愈桂枝湯主之未嘗必禁桂枝也

人參白虎證六 太陽六十一

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之 方在太陽三十九

服桂枝湯後汗出表解而津液亡泄裏熱則增是宜白虎清裏而大汗之後大作煩渴而脉又洪大是亡津而氣亦泄也津由氣化靈樞決氣上焦開發宜五穀味靈膚充身澤毛若霧露之既為氣此當益氣以生津故加人參素問評熱論脉燥疾不為汗裏者死以精氣消亡無以膠灌其枯燥也白虎而加人參使清氣降灑化而為露滋潤枯涸滌洗煩燥莫善於此矣

人參白虎證七 太陽六十二

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之 方在太陽三十九

吐下之後氣奪津傷七八日不解燥熱內盛而自裏達表表裏俱熱熱蒸發泄時惡風舌上乾燥而心內焦煩欲飲水數升之多主以人參白虎清金而泄熱化氣而生津也

表裏俱虛證八 太陽六十三

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出則自愈所以然者汗出表和故也

得裏未和然後下之

太陽病先下之而不愈傷其陰液因復發汗傷其陽津表陽裏陰以此俱虛表陽虛則陰氣外束裏陰虛則陽氣內鬱陽氣內鬱而不外達其人因致昏冒冒家汗出則自愈所以然者汗出則衛氣外達經脈和暢陰退而陽宣也表和之後得裏未和然後下之

調胃承氣證九

太陽六十四

發汗後惡寒者虛故也不惡寒反惡熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

方在陽明二十

陽虛之人汗則亡陽陰虛之人汗則亡陰汗後惡寒者氣泄而陽虛故也故防入少陰不惡寒反惡熱者津傷而陽實故也是已入陽明將成大承氣證宜早以調胃承氣和其胃氣預奪其實也

陰陽俱虛證十

太陽六十五

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸床小便利者其人可治

太陽中風以火劫發汗邪風一被火熱血氣流溢而失其常度外劫之火與內鬱之陽兩相熏灼其身發黃上之陽盛則欲衄下之陰虛則小便難陰液陽津俱至虛竭身體則枯燥不潤陽氣上燿但頭汗出劑頸而還裏氣臑鬱而爲脹滿肺氣壅阻而爲微喘火炎於上口乾而咽爛其時或不大便久則衛鬱莫泄頭氣薰心而爲譫語甚者胃氣衝逆而爲嘔噦或手足躁擾捻衣摸床凡此諸證總以表裏壅遏熱無泄路故鬱悶懊憹煩亂如是宜以辛涼之藥雙泄表裏若小便利者是陰氣未絕其人可治也 此證濕熱鬱蒸宜以麻黃石膏泄其表熱大黃芒硝泄其裏熱半夏生薑降其逆豬苓滑石瀉其濕表裏雙清則神

氣慧爽矣

火熱入胃證十一 太陽六十六

太陽病二日反躁反熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者此爲欲解也故其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞭小便當數而反不數及大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

太陽病皮毛被感表鬱爲熱內尚無熱俟其表熱傳胃日久失清乃見煩躁今二日之內方入陽明不應躁而反躁其胃陽素盛可知乃不用清涼反熨其背而大汗出火熱就燥邪熱入胃胃中水竭乃生煩躁燥熱薰心必發譫語若十餘日後微陰內復忽振慄而自下利則胃熱下泄此爲欲解也方其裏背取汗火熱蒸騰上雖熱而下則寒故從腰以下絕無汗意外寒鬱其內熱故膀胱閉澀欲小便而不得陽氣升泄不根於水膀胱無約時欲失溲如此則小便當數而反不數者津液枯也水枯則大便乾鞭便乾腸結胃熱不得下達故氣逆作嘔火熱上逆故足下逆冷而惡風寒及振慄下利大便已行則穀氣宣暢四達頭痛而火從上散足熱而陽從下達胃中燥熱解散無餘緣穀氣以便通自下流故也便通而頭痛者如爐底壅塞火焰不升一通則火卽上炎也

火邪圖血證十二 太陽六十七

太陽病以火薰之不得汗其人必躁到經不解必清血名爲火邪

清與圖同

太陽病當以汗解乃以火薰之又不得汗內熱愈增其人必躁到經盡之期當解而不解熱傷血分必當圖血此名火邪也

火逆助邪證十三 太陽六十八

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也

脈浮宜以汗解乃以火灸之邪無從出因外火而更盛病從腰以下必重濁而痺塞此名火逆

火逆吐血證十四 太陽六十九

脈浮熱甚反灸之此爲實實以虛治因火而動故咽燥吐血

脈浮熱甚當汗之以泄其熱反灸之此爲實症實症而用灸是實以虛治也內之實熱因外火而大動必

傷陰氣故咽燥而吐血

火邪內攻證十五 太陽七十

微數之脈慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

微數之脈榮血虛虧慎不可灸誤灸而因火爲邪則爲煩躁而氣逆追陰氣之已虛逐陽火之原實因令

血散脈中耗亡失守一灸之火雖微而其煎熬內攻則甚有力焦骨傷筋日就枯槁榮血消鑠終難復舊

也

太陽壞病入太陰去路 二十一章

太陰以濕土主令陰盛之人病在太陽表鬱則濕動然不經誤治則胃陽未虧濕氣之作猶俟漸成及夫

汗下溫鍼陽亡陰旺濕邪勃興十敗水侮危證疊出防微杜漸之法不可不亟講也

太陽壞病入太陰五苓散證一 太陽七十一

太陽病發汗後大汗出胃中乾燥煩不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣和則愈 此太陽入陽明去
論將成白虎證者 若脈

浮小便不利熱微消渴者五苓散主之 方在太陽
四十一

發汗後陽盛之人陰亡土燥則入陽明而成白虎證陰盛之人陽亡土瀉則入太陰而成五苓證如汗後

胃中乾燥煩不得眠欲得飲水此將來之人參白虎證也宜少少與飲以在大汗之後陽氣新虛也設燥熱已甚少水不救盛火則用白虎若燥熱未甚得少水和胃則煩渴自愈無事白虎也若汗後脈浮小便不利熱微消渴則太陰之象已見端倪宜以五苓燥土而行水蓋陽格於外表證未解是以脈浮濕動於內木氣不達是以小便不利木鬱風動耗傷肺津是以消渴此之消渴消少水而頻飲不能大消以其瀰盛而熱微也

五苓散證二 太陽七十一

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之 方在太陽四十一

發汗已熱隨汗散乃脈見浮數而證見煩渴是汗出陽虛土濕而火升也蓋火祕陽蟄全恃乎土陽亡濕動肺胃不降君火升炎故脈證如此宜以五苓燥土滲濕若未汗而見浮數煩渴之脈證則宜大青龍而不可宜五苓矣

甘草乾薑證三 太陽七十三

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾燥煩吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讎語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之 方在太陽證三

脈浮自汗裏熱外泄也小便數則大便必鞭心煩者胃熱之薰衝也陽明病雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱微惡寒者表未全解自汗雖出而未能濇發也亦是調胃承氣證 陽明篇上太陽篇若吐

數大便因硬與小承氣湯和之愈陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯即此症 醫以脈浮自汗病在太陽中風證反與桂枝湯加附子而增桂枝以攻其表此大誤也得之汗多陽亡使手足厥冷咽乾燥腸氣離根而生煩躁胃氣上逆而作吐

嘔作甘草乾薑湯與之甘草培土而補中乾薑溫胃而降逆陽回肢煖是以厥愈足溫其脚之繫急緣其木燥而筋縮也更作芍藥甘草湯與之甘草舒筋而緩急芍藥清風而潤燥其脚自伸若胃氣不和土燥識語少與調胃承氣則胃氣調和矣桂枝發汗是爲一逆若不以薑甘回陽而重發其汗或復加燒鍼以大亡其陽是爲再逆當速用四逆以回陽薑甘加附子水土雙溫也

甘草乾薑湯十八

甘草四兩 乾薑二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

芍藥甘草湯十九

芍藥四兩 甘草四兩

右咬咀以水三升煮取升半去滓分溫再服

甘草乾薑湯證四 太陽七十四

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而識語師言夜半手足當溫兩足當伸後如謬言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則爲風大則爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結識語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當溫脛尙微拘急重與甘草芍藥湯兩脛乃伸以承氣湯微澹則止其識語故知病可愈

此復述上章設爲問答證象陽旦卽證象桂枝之互文

金氏產後中風數十日不解頭痛惡寒時時發熱乾嘔汗出雖久陽且證續在耳可與陽且湯林億

以爲卽桂枝湯按證是桂枝湯無疑以法治之卽上章以桂枝攻其表及此章因加附子增桂令汗出也寸口脈浮而大浮則爲風大則爲虛載在脈法脈法寸口脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒脈弦而大大則爲乳乳則爲虛也所爲風則浮虛也脈法風則生其微

熱虛則兩脛攣急病與桂枝湯證形象符合而熱微足攣又似陽虛因增桂枝而加附子以發其表附子

濕經汗多亡陽是以厥逆咽乾而生煩躁汗出津枯胃府燥結是以讖語煩亂不知寸口脉浮大是陽明

之真實陽明篇大便硬者浮而緩為陽明病傷寒三日陽明病大三陽合病浮而大而非太陽之表虛誤以桂附發汗重亡其陽裏實變而

為裏虛更飲甘草乾薑湯回足溫重與芍藥甘草湯即脛伸少與調胃承氣變結糞為微瀉止其讖語藥

良法精應手愈矣何不可知之有喻嘉言誤會陽且陰且二湯謂桂枝加黃芩為陽且湯加桂枝為陰且

桂枝之法增桂枝令其汗出更加附子溫經停譯極矣嗣後醫書俱襲其說皆載陽且陰且二方不通之至

方不通之至汗後吐逆證五太陽七十五

發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止

汗出陽泄土敗胃逆水藥不得入口是謂逆治若更發汗陽敗土崩太陰吐利之證必將俱作無有止期

矣

汗後吐逆證六太陽七十六

病人脉數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脉乃數也數為客熱不能消穀以胃

中虛冷故吐也

陰陽互根陽虛脫根升浮於上是以脉數數為客熱升浮不能消化水穀故作嘔吐緣其陽亡而胃中虛

冷也

吐後生煩證七太陽七十七

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也

太陽病傷寒中風表邪外閉藥衛不達當見惡寒吐傷胃氣裏陽上逆外達皮毛故反不惡寒而欲去衣

被此爲吐之令陽火離根而內煩故也

吐後作吐證八 太陽七十八

太陽病當惡寒發熱今身自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆

吐傷於陽虛浮無根故關脈細數一二日胃病尚淺吐則傷輕胃中虛餒故饑而胃氣上升故不能食三

四日胃病頗深吐則傷重陽火虛浮故不喜糜粥欲食冷食而胃中虛冷不能化穀故朝食暮吐此亦過

吐傷胃是謂小逆遲則微陽續復逆氣乃下也汗吐下溫鍼諸逆之中惟吐爲輕凡胸腹之內腐敗墮塞

隔礙真陽鬱悶懊憹頭痛心煩吐之清氣通暢卽刻輕安最妙之法也卽吐之過當中虛內煩亦無汗下

亡陽諸禍一溫中氣虛煩立止最易治療故曰小逆也

身疼下利症九 太陽七十九

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯 在方

三 太陰 救表宜桂枝湯 方在太陽五

傷寒表病下之敗其裏陽續得下利清穀不止已成太陰自利而身體疼痛表證未解是表裏皆病然急當救裏不暇及表也救裏之後利止便調然後表之身疼痛者急當救之蓋表邪不解恐裏陰復鬱而生

寒故救之宜急救裏宜四逆以溫中救表宜桂枝以解外傷寒而不用麻黃者裏陽既虛不敢過汗也 此與

太陰下利腹脹滿卒彼五互文救表即攻表攻表即發表

新加湯證十 太陽八十

覆汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之

汗泄血中溫氣陽虛肝陷故脈沉遲經脈凝滯風木鬱遏故身疼痛新加湯甘草補其脾精桂枝達其肝氣芍藥清風木之燥生薑行經絡之瘀人參補肝脾之陽以溫營血而充經脈也

新加湯 二十

桂枝 三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 芍藥 四兩 生薑 四兩 人參 三兩

於桂枝湯內加芍藥生薑各一兩人參三兩餘依前法

葛根連芩證十一 太陽八十一

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯主之

太陽病桂枝證有表邪而無裏邪醫反下之敗其中氣利遂不止此當溫裏若脈促者是表未解也蓋病

在經絡不解表而攻裏表陽乘裏虛而內陷為裏陰所拒不得下達表裏束迫故見促象脈來數時止復來者曰促若

喘而汗出者是胃氣上逆肺阻而為喘肺鬱生熱氣蒸而為汗也雖內有四逆證外有桂枝證而熱在胸

膈二方俱不能受宜葛根連芩湯主之葛根達陽明之鬱芩連清君相之火胸膈肅清然後中下之寒徐

可讖溫也 桂枝證解表而用葛根以喘而汗出胸膈鬱蒸宜葛根之辛涼不宜桂枝之辛溫也

葛根黃連黃芩湯 二十一

葛根 半斤 黃連 三兩 黃芩 二兩 甘草 二兩

右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升去滓分溫再服

桂枝去芍藥證十二 太陽八十二

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

下後脈促表邪未解是宜桂枝而益以胸滿則陽衰胃逆濁氣衝塞去芍藥之酸寒以解表邪若微惡寒

者則不止脾陽之虛而腎陽亦敗加附子之辛溫以驅裏寒也

桂枝去芍藥湯 二十二

桂枝 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩 大棗 十二枚

於桂枝方內去芍藥餘依前法

桂枝去芍藥加附子湯 二十三

桂枝 三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 生薑 三兩 附子 一枚 去皮炮

於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚去皮破八片餘依前法

桂枝厚朴杏子證十三 太陽八十三

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯主之

表病而攻其裏裏陰上逆而表邪未解肺氣鬱阻是以發喘桂枝加厚朴杏子證逆而破壅寒也

桂枝加厚朴杏子湯 二十四

桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 生薑 三兩 厚朴 二兩 杏仁 五十枚 去皮尖

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十枚去皮尖餘依前法

桂枝厚朴杏子證十四 太陽八十四

喘家作桂枝湯加厚朴杏子仁

平素喘家胃逆肺阻作桂枝湯解表宜加朴杏降逆而破壅也

桂枝去桂加茯苓白朮證十五 太陽八十五

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

服桂枝湯後或又下之仍復頭項強痛發熱無汗甚似表症未解而加以心下滿痛小便不利是非風邪之外束實緣濕邪之內動也蓋土虛濕旺脾陷而肝鬱不能泄水故小便不利胃逆而膽鬱不能降濁故心下滿痛濁氣衝塞故頭痛發熱桂枝去桂枝之解表加茯苓白朮泄濕而燥土也

桂枝去桂加茯苓白朮湯 二十五

芍藥 三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 生薑 三兩 茯苓 三兩 白朮 三兩

於桂枝湯方內去桂枝加茯苓白朮各三兩餘依前法煎服小便利則愈

厚朴薑夏參甘證十六 太陽八十六

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

胃不偏燥脾不偏濕脾升胃降中氣轉運胸腹冲和故不脹滿汗泄中氣陽虛濕旺樞軸不運脾陷胃逆則生脹滿厚朴生薑甘草半夏人參湯人參甘草補中而扶陽朴夏生薑降濁而行鬱也

厚朴生薑甘草半夏人參湯 二十六

厚朴 一斤 生薑 半斤 甘草 二兩 半夏 半斤 人參 一斤

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

梔子厚朴證十七 太陽八十七

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之

下傷中氣樞軸不運是以腹滿陽明上逆濁陰不降腐敗壅塞宮城不清是以心煩癩極則臥起不安梔子厚朴湯厚朴枳實泄滿而降逆梔子吐濁痰而除煩也

梔子厚朴湯 二十七

梔子十四厚朴四兩枳實四枚水浸去穢炒

以上三味以水二升半煮取一升半去滓分二服温進一服得吐者止後服

梔子乾薑證十八 太陽八十八

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

大下敗其中氣濁陰上逆瘀生腐敗阻格君火不得下行故身熱而心煩梔子乾薑湯乾薑降逆而温中

梔子吐瘀而除煩也

梔子乾薑湯 二十八

梔子十四乾薑二兩

右二味以水三升半煮取升半去滓分三服温進一服得吐者止後服

梔子香鼓證十九 太陽八十九

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子鼓湯主之

汗下敗其中氣胃土上逆濁氣攪瘀君火不得下行故心宮煩熱胸中窒塞梔子鼓湯香鼓調中氣而開

窒塞梔子吐濁瘀而除煩熱也

梔子鼓湯 二十九

梔子十二香鼓四兩
枝劈 綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內鼓煮取一升半去滓分二服温進一服得吐者止後服

梔子香鼓證二十 太陽九十

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣者梔子鼓湯主之若少氣者梔子甘草鼓湯主之

若嘔者梔子生薑豉湯主之

發汗吐下土敗胃逆君火不降故虛煩不得臥眠劇則陳亮壅塞濁氣靈心故反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯吐其痰濁則陽降而煩止矣若少氣者加甘草以益氣若嘔者加生薑以止逆也

梔子甘草豉湯 三十一

梔子 十四 香豉 四兩 甘草 二兩

於梔子豉湯內加甘草二兩餘依前法得吐者止後服

梔子生薑豉湯 三十一

梔子 十二 香豉 四兩 生薑 五兩

於梔子豉湯加入生薑五兩餘依前法得吐止後服

忌梔子證二十一 太陽九十一

凡用梔子湯病人舊微瀉者不可與服之

梔子苦寒之性泄脾胃而滑大腸凡用梔子諸湯設病人舊日脾陽素虛大便微瀉者不可與服也

太陽壞病入少陰去路 十七章

少陰以寒水而化君火平人水火交則腎水溫陰盛之人水旺火衰腎氣原寒病在太陽表陽外鬱內寒

已動一有汗下溫鍼之逆陽亡土敗寒水無制水邪泛溢死不旋踵扶陽明而抑少陰良工當思患而預防也

太陰壞病入少陰桂枝附子證一 太陽九十二

太陽病發汗遂瀉不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之