

六
醴
亦
匡
書
三

備
急
方

仲
秋
堂

第三冊

卷三

治寒熱諸瘧方第十六

治卒發癲狂病方第十七

治卒得驚邪恍惚方第十八

治卒中風諸急方第十九

治卒風瘖不得語方二十

治風毒脚弱痺滿上氣方第二十一

傷寒
治服散卒發動困篤方第二十二

治卒上氣咳嗽方第二十三

治卒身面腫滿方第二十四

葛仙翁肘後備急方卷之三

瘦樵程永培校

治寒熱諸瘧方第十

福

治瘧病方鼠婦豆豉二七枚

瘧疾發時

服二丸欲發時服一丸

又方青蒿一握以水二升漬絞取汁盡服之

又方用獨父蒜於白炭上燒之末服方寸七

又方五月五日蒜一片去皮中破之刀割令各巴

豆一枚去心皮內蒜中令合以竹挾以火炙之
取可熱搗爲三丸未發前服一丸不止復與一
丸

又方取蜘蛛一枚蘆管中密塞管中以縮頸過發
時乃解去也

又方日始出時東向日再拜畢正長跪向日叉手
當閉氣以書墨注其管兩耳中各七注又丹書
舌上言子曰死畢復再拜還去勿顧安臥勿食

過發時斷卽差

又方多煮豉湯飲數升令得大吐便差

又方取蜘蛛一枚著飴中合丸吞之

又方臨發時搗大附子下篩以苦酒和之塗背上

又方鼠婦蟲子四枚各一以飴糖裹之丸服便斷

卽差

又方常山搗下篩成末三兩真丹一兩白蜜和搗
百杵丸如梧子先發服三丸中服三丸臨臥服

三九無不斷者常用効

又方大開口度上下唇以繩度心頭灸此度下頭
百壯又灸脊中央五十壯過發時灸二十壯

又方破一大豆去皮書一片作日字一片作月字
左手持日右手持月吞之立愈向日服之勿令
人知也

又方皁莢三兩去皮炙巴豆二兩去心皮搗丸如
大豆大一服一枚

又方巴豆一枚去心皮射蔞如巴豆大棗一枚去皮合搗成丸先發各服一丸如梧子大也

又方常山知母甘草麻黃等分搗蜜和丸如大豆服三丸比發時令過畢

又方常山三兩甘草半兩水酒各半升合煮取半升先發時一服比發令三服盡

又方常山三兩剉以酒三升漬二三日平旦作三合服欲嘔之臨發又服二合便斷舊酒亦佳急

亦可煮

又方常山三兩秫米三百粒以水六升煮取三升分之服至發時令盡

又方若發作無常心下煩熱取常山二兩甘草一兩半合以水六升煮取二升分再服當快吐乃斷勿飲食

老瘧久不斷者常山三兩鼈甲一兩炙升麻一兩附子一兩烏賊骨一兩以酒六升漬之小令近

火一宿成服一合比發可數作

又方藜蘆阜莢各一兩炙巴豆二十五枚並搗熬
令黃依法搗蜜丸如小豆空心服一丸未發時
一丸臨發時又一丸勿飲食

又方牛膝莖葉一把切以酒三升服令微有酒氣
不卽斷更作不過三服而止

又方末龍骨方寸匕先發一時以酒一升半煮三
沸及熱盡服溫覆取汗便卽效

又方常山三兩甘草半兩知母一兩搗蜜丸至先
發時服如梧子大十丸次服減七丸八丸後五
六丸卽差

又方先發二時以炭火牀下令脊腳極暖被覆過
時乃止此治先寒後熱者

又方先灸鰓甲搗末方寸匕至時令三服盡用火
灸無不斷

又方常山三兩搗篩鷄子白和之丸空腹三十丸

去發食久三十丸發時三十丸或吐或否也從服藥至過發時勿飲食

治溫瘧不下食知母驚甲炙常山各二兩地骨皮三兩切竹葉一升切石膏四兩以水七升煮二升五合分溫三服忌蒜熱麵猪魚

治瘧瘧常山黃連豉熬各三兩附子二兩炮搗篩蜜丸空腹服四丸欲發三丸飲下之服藥後至過發時勿喫食

若兼諸痢者黃連犀角各三兩牡蠣香豉各二兩
並熬龍骨四兩搗篩蜜丸服四十九日再服飲
下

無時節發者常山二兩甘草一兩半豉五合綿裹
以水六升煮取三升再服快吐

無問年月可治三十年者常山黃連各三兩酒一
斗宿漬之曉以瓦釜煮取六升一服八合比發
時令得三服熱當吐冷當利服之無不差者半

料合服得

勞瘧積久衆治不差者生長大牛膝一大虎口以
水六升煮取二升空腹一服欲發一服

襪一切瘧是日抱雄鷄一時令作大聲無不差

又方未發頭向南臥五心及額舌七處閉氣書鬼
字

呪法發日執一石於水濱一氣呪云睚睚圓圓行
路非難捉取瘧鬼送與河官急急如律令投於

水不得廻顧

治一切瘡烏梅丸方甘草二兩烏梅肉熬人參桂
心肉從蓉知母牡丹各二兩常山升麻桃人去
皮尖熬烏豆皮熬膜取皮各三兩桃人研欲丸
入之搗篩蜜丸蘇屠曰搗一萬杵發熱五更酒
下三十丸平旦四十丸欲發四十丸不發熱空
腹四十丸晚三十丸無不差徐服後十餘日喫
肥肉發之也

凡見瘡白驢蹄二分熬大黃四分萊豆三分末硃
霜二分光明砂半分雄黃一分搗蜜丸如梧子
發日平旦冷水服二九七日內忌油

附方

外臺祕要治瘡不痊乾薑高良薑等分爲末每服
一錢水一中盞煎至七分服

聖惠方治久患勞瘡瘡等方用鱉甲三兩塗酥炙
冷黃去裙爲末臨發時溫調下二錢匕

治瘡用桃人一百箇去皮尖於乳鉢中細研成膏
不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧子大
每服三丸當發日面北用溫酒吞下如不飲酒
井花水亦得五月五日午時合忌雞犬婦人見
又方用小蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚
爲度丸如鷄頭大候乾每服一丸新汲水下面
東服至妙

治卒發癲狂病方第十七