

門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

痺

癘風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘧

痢

溼門

痞

泄瀉

溼熱門

吞酸

疸

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

痰

哮喘

喘

惡心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

闕格

噎氣

痰熱門

瘧

癰

顛狂

驚悸怔忡

健忘

纏喉風喉痺

大門

火

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風臟毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

火鬱門

脇痛

跌撲損傷

疥瘡

癰疽

疔瘡

諸瘡

溼鬱門

腰痛

疝痛

腳氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癰

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草行義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

診家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門 上

中風

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

外感門 下

中暑

暑風

注夏

中溼

溼熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

丙集

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風

胃風

痛風

脈節痛

肩背痛

痺

癘風

血風瘡

身上虛痒

癰疹

卷之五

寒門

咳嗽

肺痿

肺癰

霍亂

卷之六

暑門

丁集

瘧

痢

卷之七

溼門

痞

泄瀉

卷之八

溼熱門

咳氣

疸

水腫

鼓脹

赤白濁

卷之九

痰門

痰

痰熱

哮喘

喘

惡心

嘔吐

咳逆

翻胃

嘈雜

關格

瘦氣

卷之十

痰熱門

瘰癧

癰

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血瘕

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽 乳癰 疔瘡 諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

脚氣

足眼痛

脚轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門^上

經病

崩漏

帶下

婦人門^下

卷之二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門^上

小兒諸病

士集

辛集

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之二十

婦人門上

經病九十二

○婦人經水過期血少也四物加參朮有痰加南星半夏陳皮之類 經水不及期而來者血熱也四物加黃連 過期紫黑有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連 過期淡色來者痰多也二陳加川芎當歸 過期而來是血虛宜補血用四物加黃芪陳皮升麻 未及期先來乃是氣血俱熱宜涼氣血柴胡黃芩當歸白芍生芩香附之屬 經不調而血水淡白宜補氣血參芪芎歸香附白芍腹痛加膠珠艾葉玄胡索 經候過而作痛者乃虛中有熱所以作疼 經水將來作痛者血實也氣滯四物加桃仁黃連香附 臨行時腰疼腹痛乃是鬱滯有瘀血宜四物加紅花桃仁義朮玄胡索香附木香發熱加黃芩柴胡 紫色成塊者熱也四物加黃連柴胡之類 痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏肥人如此用南星蒼朮川芎香附作九子服之 肥人不及數日而多痰多血者虛有熱亦用前九藥中更加黃連白朮服之 血枯經閉者四物加紅花軀脂滿經閉者以導痰湯加黃連川芎不可服地黃泥膈故也如用以姜汁炒 肥胖飲食過度之人而經水不調者乃是溼痰宜蒼朮半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸 臨經來時肚痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹皮甘草痛甚者豆淋酒痛緩者童便煮附入炒條芩研末為丸 經水去多不能住者以三補丸加香附龜板金毛狗脊 陰虛經水久不通小便澀身體疼痛四物加蒼朮牛膝陳皮生甘草又用蒼朮丸加蒼耳酒芍藥為丸就煎前藥吞下八方 治經水過多

黃芩 炒

白芍 炒

龜板 炙各一兩

黃柏 炒三錢

椿根白皮 半錢

香附子 二錢

右為末酒糊丸空心溫酒或白湯下五十丸

又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子 一兩

黃連 半兩

吳茱萸 十粒

桃仁 五十枚

紅曲 二錢

砂仁 三兩

麻粗木

右為末生姜汁浸吹餅為丸梧子大每服一百丸空心開水下

又方 治一切瘀血為痛

香附四兩 醋煮

瓦礫子煮一夜

桃仁二兩

牡丹皮

大黃蒸熱

當歸各一兩

川芎

紅花各半兩

右為末蒸餅丸如梧子大空心溫酒下三五十丸

導痰湯見痰類

三補丸見補損

蒼莎丸見咳嗽

附諸方

○月經不調

加減四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹疼痛

當歸 川芎 芍藥 熟芩等分

右以水煎服加減於後

若經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脉微數本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草五分 經候

過多本方去熟芩加生芩或只加黃芩白朮 經行身熱脉數頭昏本方加柴胡黃芩 經行數少或脹或

痛四肢疼痛加延胡沒藥白芷與本方等淡醋湯調下末子 經候不調心腹 痛只用芍歸二味名君臣

散 氣冲經脉故月事頻併臍下多痛加芍藥 經欲行臍腹絞痛加玄胡楨榔苦練炒木香減半 經水

澁少加葵花紅花 經水適來適斷或有往來寒熱先宜服小柴胡湯後以四物湯和之 經後過而作痛

血氣俱虛也宜本方對四君子湯服之

大溫經湯和劑方 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小

腹急痛五心煩熱

阿膠碎炒

芍藥

當歸去芦

人參去芦

肉桂去皮

甘草炒

芍藥

牡丹皮各二兩

半夏二兩

吳茱萸二兩各湯洗七次

麥門冬去心五兩

右咬咀母服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹和劑方治婦人血海虛冷久無孕育及數墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸症

秦光二兩 京墨服諸汗 人參去蘆二兩 石斛去根酒二兩 糯米炒一兩 川芎半兩 熟地黃酒蒸四兩 茯苓

三兩 蒼朮米泔浸去粗皮八兩 香附炒去毛四兩 木香炒一兩 藁本去蘆一兩 當歸去蘆酒浸一兩 肉桂去粗皮一兩 山

藥七錢 澤蘭葉四兩 川椒去目炒七錢半 細辛去苗葉一兩半 桔梗炒二兩 桃仁去皮尖一兩 大豆黃卷炒半斤

甘草炙二兩 蚕布燒灰二兩 牡丹皮半兩 乾薑炮一兩半

右為末煉蜜為丸每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子大亦可

交加地黃丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生芩一斤 老生姜一斤 玄胡索 當歸 川芎 白芍各二兩 沒藥 木香各一兩 桃仁去皮尖

人參各一斤 香附子半斤

右先將地黃生薑各搗汁以生薑汁浸地黃煮地黃汁浸生薑煮皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處

日乾同為末醋糊丸如梧桐子大空心服五十丸姜湯下

內炙散和劑方 治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或凝積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉 丁香皮 熟地黃洗焙 肉桂去皮各一兩半 甘草炙 當歸洗去蘆 白朮 山藥 白芷各一兩

茴香半兩 藁本去蘆 乾姜炮 川芎 黃芪去苗各一兩 木香 陳皮去白四兩 白芍藥一兩

右為末每服三錢水一盞姜五片艾十葉同煎空心熱服溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露

不快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生薑煎

活血散御藥院方 治衝任經虛經事不調不以多少前後並皆治之

當歸 川芎 白芍 玄胡索各四兩 肉桂去皮一兩

右咬咀每四錢水一煎煎至七分食後溫服

溫經湯 大全良方 治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮 莪朮 各半 人參 甘草 牛膝 各一

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸 濟察方 治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜治之

大香附 砂盆去以米泔醋浸半日用瓦託慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧桐子大日乾每服五十丸淡醋湯下一方香附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前

法治證一同名艾附丸

如聖丹 聖惠方 治婦人經脉不調赤白帶下

枯礬 西兩 蛇床子 二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中用熱極再換

增損四物湯 宣明方 治月水不調心腹疼痛補血藏溫經注顏

川芎 芍藥 當歸 熟地黃 白朮 牡丹皮 各五錢 地骨皮 一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓適口服食前

丹參散 大全良方 治婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰

脊痛骨節煩疼

丹參 去芦不拘多少

右為末每服二錢酒調下經脉不調食前服冷熱勞不拘時

桃仁散 大全良方 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行

動月水或前或後或月水不來舉體沉重惟欲眠多思酸物

桃仁 甘草 半夏 各一 赤芍藥 生地黃 各二 澤蘭 牛膝 當歸 桂心 牡丹皮 人參

蒲黃 川芎 各一兩

右以咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分空心服

四製醋附丸 喘竹堂方 治婦人女子經候不調

香附子 去毛一斤 作四分 一分好酒浸七日一分小便浸七日一分鹽水浸七日一分米醋浸七日 乾焙

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十九空心食前鹽酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓 各一兩

○廣按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 熟苧 各半 牡丹皮 玄胡索 各半 人參 黃芪 各一錢二分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米湯下

○廣按月信趙前為熟宜用涼藥以清熱退後為虛宜用溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此症

便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致

血少而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥

脾旺則能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜

行血通經

紅花當歸散 和劑方 治婦人血臟虛竭經候不調或斷續不來或積瘀現腰腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴草 五兩 當歸 去芦 牛膝 酒浸各一兩 肉桂 去芦 紅花 白芷 各半 甘草 炙二兩 赤芍 一兩

紫葳 即凌霄花 蘇木 各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒調下

通經丸 濟生方 治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

川椒 炒去汗 蓬朮 炒去刺 乾漆 炒去烟 當歸 去芦 青皮 去白 乾姜 炒 大黃 炒 桃仁 炒 紅花

桂心 各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之丸如梧桐子大陰乾每服五十丸醋湯溫酒空心下

千金桃仁煎 簡易方 治婦人血積癥瘕月水不行等症

桃仁 去破尖 朴硝 大黃 各二兩 蜚虫 半兩炒令黑色

右和勻以酸醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大黃蜚虫末入內不住手攪度可圓時却下

朴硝更不住攪良久出丸如梧桐子大五更時溫酒下五丸至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟆等樣以盡為度

六合湯 和濟方 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 白芍藥 官桂 去皮 熟地黃 酒洗 川芎 蓬朮 各等分

右以咀每服四錢水一盞煎七分空心服

凌花散 潘察方 治婦人月水不行發熱腹脹

當歸 酒浸 凌霄花 劉寄奴 官桂 去皮 紅花 酒浸煎前藥一二沸即入 牡丹皮 酒洗 川白芷 赤芍藥

延胡索 各等分

右以咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服

玉燭散 張子和方 四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服 四物湯見補損承氣湯見傷寒

三和湯 張子和方 四物湯涼膈散當歸各中停水煎服 涼膈散見溫熱

一方 治室女月經不通

紫葢一兩 乾漆 炒二錢半 芍藥 蓬朮 當歸 稍各半

右為末每服二錢空心酒調下

一方 療月經不通腹中痛

牛膝 六錢

大黃 細辛

桃仁 去皮尖 仁五錢 炒

川芎

當歸

水蛭

三錢 糯米炒 糯

右為末糊蜜丸梧子大每服二十九空心酒下

通經散 聖惠方 治室女月水不通

雄鼠屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神效

導經丸 聖惠方 治婦人經病不通臍腹連腰腿疼痛

當歸

川芎

白芍

甘草

炒

官桂

桃仁

炒一兩

大黃 二兩

血竭

二錢 半

紅花

少許

地膽

二十斤 足

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九空心溫酒下量虛實加減服之

溫經湯 大全良方

若經道不行達臍寒疝痛徹其脉沈緊此由寒氣客於血室血凝不行又為氣所衝新氣與

故血相搏所以作痛宜溫經湯及桂枝桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓮義木

各半兩

人參

甘草

牛膝

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣食前溫服

桂枝桃仁湯 大全良方

官桂

芍藥

生地黃

各二兩

甘草

一兩

桃仁

去皮尖 五十斤

右咬咀每服一兩姜三片棗子七枚水三盞煎至一盞去滓溫服

當歸散 大全良方 治血脈不通

當歸

川山甲

反焙

蒲黃

炒各五錢

辰砂

一錢

麝香

少許

右為末研勻每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可

琥珀散 經驗方

治心膈迷悶腹臍振痛氣急痞塞月信不通等疾

足本丹溪心法附餘

卷二十

婦人門

四

泥江海左書局印行

烏藥 二兩 當歸 蓬莪朮 各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生冷油膩等物兼治產後諸疾用炒姜湯調下萬病丸 拔萃方 治女人月經淋閉月候不來遠膈寒症痛徹及產血氣不調腹中生瘕結而不散等疾

乾漆 梓辟炒令烟盡須 牛膝 去苗酒浸一宿焙乾各一兩

右為細末生地黄汁一升入二味用銀石器慢火熬候可丸如梧桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下通經散 楊氏方 治衝任不調經脈閉塞久而不通漸成堅瘦服尋常通經藥不效者正宜服之

班貓 去翅足炒 蜜虫 水蛭 燒炒黑各四十枚 杜牛膝 半兩 當歸 紅花 錢各三 滑石 半錢

右為細末每服一錢用桃仁七粒研細末溫酒調下食前服

○廣按此方善能通經然月候不通有血滯者有血枯者此方用之於血滯者可矣若用之於血枯者是猶求千金於乞丐也

瑞金散 大全良方 治婦人血氣損痛月經不行預先嘔吐疼痛

片姜黃 四兩 牡丹皮 蓬莪朮 紅花 當歸 赤芍藥 川芎 延胡索 官桂 各一兩

右咬咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分食前溫服

一方 治經候閉塞亦治乾血氣 班貓 仁炒 桃仁 炒五十斤 大黃 錦紋者半兩

右為細末酒糊丸如梧子大空心溫酒服五丸甚者十丸 如或血枯經閉者用四物湯送下

血竭膏 治乾血氣 用錦紋大黃酒浸乾四兩為末以好醋一升熬成膏戶如雞子大每服一丸熱酒化開待溫臨卧服大便利利一二經脈自下此方調經水之仙藥也

又方 加香附

千金散 治經不調

病蓄 瞿麥 各四錢 檳榔 麥蘗 小茴香 各三錢 大黃 錦紋者六錢