

內科理法後編卷二

虎伯 譯

慈谿

舒高第

日譯

英國

茄合 叅訂

新陽

趙元益

筆述

心功用之病

即心腦筋病

分類

跳擊

心痛証

即胸痛

暈絕

即失魂

跳擊

此即心之動法速而有力且不合常度其器具之病輕至於不能覺但此為心本體病尋常之據如心之跳擊極重病人自能聞而覺之最易覺者在卧於左邊之時間有旁人能見之有時與風箱聲同發如心安靜風箱聲亦停且

心處或上胃所覺沈下俗名心沈有人竟能暈絕朝晨睡醒時常有跳擊

根原 向病之根原腦筋性情婦女激發之根原心大感動卽如快樂憂愁憤怒苦惱畏懼急望大運動從久延或重病而來之乏力失血過多放棄津液過限用瀉藥太多胃不消化腹中發氣食物不足飲酒過度吸煙太多少睡急望憂慮用功時太長邪僻貪色手淫

所以囚人多患婦心跳擊之病

女天癸將止之時

跳擊與心之門扇病常同來在婦女常爲血虛妄言笑背脊髓激動腦筋不安白帶等明顯之證據且常有於充足

之體胃不消化肺管生炎肺體氣脹肺癆病

肺癆病別證據未有之前病人常言有極不安之心跳因其如此者甚多所以一人有跳擊一證並無別故爲根原則必疑其肺體有病須查究之

患綠病之女人疑其心本體有病實因心之功用不準足而來此有心跳呼吸難並身之左邊有痛常用蜚吮法抽氣放血法弔炎法治之實應用此法之相反者婦女有背脊髓激動之病其心極易感動脉之至數每分時過於一百六十至

病勢無有心本體病之證據有心之異聲分外明顯其

內科後編二
脉非不整齊而亂脉之來去盡清楚手指初按於脉處其脉至數甚多如病者心已安則漸減少

治法 充足之人祇有心跳從其臂上取血或在心位處用蜚吮法或抽氣放血法用鹽類輕瀉藥從之減少食物並須安靜大概治法與血虛綠病或腦筋不安之治法相同然在肺病內並心門扇病內跳擊爲第一證據後將加重當此情形時宜減輕其心之惹動如心之動法極亂則毛地黃輕衰酸用之有益心位處貼啤啦叮喇或鴉片膏藥以治其痛

如人常有從腦筋而來之心跳擊則安其性靈爲第一要

事因病者常疑心之本體累及故醫者須與說明心本體無病如此其心已安其病易治

心之跳擊不整齊並有歇止常與腦筋引出之跳擊同一根原如此者爲胃不消化腹中發氣此兩種治法相同有時心跳歇止屬於心本體之病

手腕之脉與心之跳擊間有人在無病時則亂而歇止有重病則反整齊病痊後仍復如前

上胃所之脉尋常從胃中有氣脹緊而來若用逐氣瀉藥

可治之

見方二百四十三二百四十七

心癇證

卽胸膈痛又名乳鬱

發明 胸膛內忽有大痛其時極憂急並畏死

證據 患此病者其人身體似乎強健其發癰證在運動之時最易得者行路向高處面風或食飽後發時胸膛忽然重痛通至左臂或通至兩臂至代爾託愛特肉筋條生根之處有徑至於手腕或手指其時似覺有帶收束至紫幾乎立即傷命病人必急欲立定如此一切證據俱退屢發之後其癰證從輕原即能發出更重更久常在初醒時有之有時不能眠下至末有更重之癰証即能傷命或忽然而死毫無痛苦或別種預兆

成病之體 因心上血管一條或兩條俱變爲骨如此則

心之本體少血。心之門扇變骨。心本體內加多肥油。心本體變爲肥油而枯。又有數種。其病從胸膛內有瘤壓緊而來。又有數種。未能查得其情形。大約因心痛証而死。

根原 向病之根原。男子五十歲以上。婦人患之者少。希伯定云。有此病者。一百人中。婦女不過三人。童子十二歲者一人。餘皆爲男子。近於五十歲或過之。激發之根原。過於運動。大費心思。各種過限之事。腸內發氣。心本體病證。病勢 病發於忽然。重痛並憂急。從此可與心跳擊分別。決病 大約此病至末。忽然而死。死時尋常無痛苦。死尸之面貌如平常。患此病者。常至年老而死。病不久而卽死。

者甚少

治法 指明第一法當發心痛證時使心之動法復原第二法在其間時整頓之助其行法

一 使心之動法復原宜卽服行血氣藥與治轉筋藥卽如以脫淡輕白蘭地酒與水並濃架啡水手邊常備易化散之行血氣藥或以易化散之行血氣藥與鴉片相和見方

一百五

二 病人須安靜度日盡去一切急望生厭之事戒絕性急大肉筋條出力並免走山路食物須少而長肉食之次數多而少喫如覺乏力白蘭地酒或葡萄酒酌量用之要

留意其全身最宜留意者肺之運行血法
心位處有忽發之重痛腦筋不安胃不消化之人常有之
或以爲多飲濃茶之故其痛不若胸膛痛之憂急且不過
心位處界限此病之治法依病人之身體情形又照其各
癰證查明之根原貼啤啦喇喇膏常能有益

心之癰證醫士立尼克云有之蒲以陸不信此說然是肉
筋條器具俱能有癰證心亦爲肉筋條器具何以不能有
癰證

心之肉筋條亦能患風濕病其證據有久延之木痛輕重
不等其跳擊時無有奇異之聲

內科秘傳二
三
暈絕

俗名失魂

證據

將暈絕時其人覺極不安眼光退視物如飄浮耳

內有唱聲或蜜蜂聲口唇與面色呆白周身有冷汗脉與呼吸幾微而不覺病人如無依傍卽跌於地不省人事間有無些微活兆其面色呆白四肢冷並軟眼閉甦時卽有深歎息間有嘔吐或下泄或有羊癲瘋之癇證

輕者其知覺不盡失脉之勢力減少病人皮色呆白欲嘔並額上有汗漬出餘無他證

病勢 暈絕之時不過於數秒間有多至於數分時者從妄言笑而來之暈絕其脉如常皮熱面無呆白色眼皮振

動

根原 向病之根原一種腦筋惹動與單薄之身乏力多放棄津液最易者爲血心功用病或心本體病激發之根原大費心思重痛失血

治法 從腦筋不安而來之暈絕不甚有危險眠睡得清氣冷水灑其面與頸骨並用淡輕近於鼻管即使復甦衣服過緊而阻呼吸者宜速寬鬆從妄言笑而來之暈絕須以冷水治之從心病而來之暈絕治法相同且令服淡輕熱白蘭地酒與水

用嘔囉叻不合法能令心之行動癱瘓而引出死證故此

處論及用嘔囉呬法並治因用嘔囉呬而暈絕者
謹慎用嘔囉呬之法

一 須謹慎查察病人之胸膛如其心之門扇有病或因
其乏力或枯槁而心之行法歇止或肺之行法有阻滯卽
如因瘤而肺體間有留料最有關係者在肺體氣脹此一
切病時斷不可用嘔囉呬

二 嗅迷蒙藥之器須特設之令迷蒙藥化氣均勻其器
具內已化成之嘔囉呬氣不可多於一百分之六醫士三
生想得造此器之理馬太作之用此器頗爲穩便

三 嘔囉呬器必置於病者鼻下器宜豎直否則祇是嘔

囉呿氣因其比清氣重四倍卽將沈入肺內不與清氣相和
四合醫者常診其脉常視其胸膛與面貌至事畢而後已
如脉有歇止或減少過於六十至呼吸分外遲或微細而
淺面色略轉烏青立即除去囉呿
嗅迷蒙藥而失知覺其情形如下脉與呼吸安靜面貌如
尋常睡容但初起嗅迷蒙藥時病人有爭鬧則有面色稍
紅者眼皮閉緊無知覺眼球不動瞳人收小然用光能感
動之皮膚失知覺四肢軟而無力

哥囉呿之傷生使心之內筋癱瘓其死甚速脉與呼吸立

卽減遲數秒時以內竟不能覺之瞳人放大與光不相應
面色呆白或變烏青

死形成法 肺內有血聚心空而軟血質稀薄

使其還甦之藥法應常備於手邊如有以上之證據須速

用之卽如濃阿摩尼阿

卽痰輕

熱水冷水效呼吸法電氣阿

摩尼阿置於鼻與口上大海絨浸足將沸之水置於心位

時則將冷水灑其面效呼吸法亦須用舌須拖出如用以

上各法尙不能甦則電氣用於身之兩邊兩箇傳電氣桿

一置於頸骨上一置於胸膛上令其電氣之浪自上向下

心與心胞膜本體之病

分類 心胞膜生炎 心襯衣生炎 心本體生炎 心

本體肥油變枯 心門扇病 心體變大 心脹大 藍

病 心內發水胞蟲

心胞膜生炎

分別 一重生炎 二久延生炎 三水腫

一心胞膜重生炎

自來之心胞膜生炎 不易有之 此病尋常與重風濕病同

發

證據 重抽搐以後有痛或輕或重在左乳下而向胸骨

底其處皆係心位其痛從此通至左腋下並臂有時至左

內科後編二
肘或手背其痛或如刺或木或不明顯或祇覺不安如有
痛在心處上之脇間按之則加其痛如無痛則能有之或
向上按之而近於膈膜或卧於一邊亦然間亦有重而不
整齊之跳動

心證據以外又有或輕或重之發熱脉數滿實合度厥厥
動搖或小不平勻亂且極數呼吸難或間有歎息哭泣冷
阨覺極難過不安息常反側且急欲吸清氣皮膚多汗或
乾熱面色呆白尖瘦看似性急間亦略有癰證或暫有昏
暈如卧則有懼夢驚之亦有不能安卧者性急不安間有
極重者稍一動之則自畏死如病將傷命則呼吸漸更難