

痿痺門 痺 痛風歷節 麻木 痿痿厥 百合脚氣 鶴膝風

諸風門 厲風 胃風 破傷風 跌撲 瘰癧 瘰癧 顫振 寧眩暈

神志門

癲 狂 癰 煩躁 虛煩 譫妄 循衣摸牀 喜笑不休 怒 悲 驚 悸  
恐 建志 入魔 走火 養性



# 張氏醫通卷六

張氏醫通卷之六

清

長洲石頑張

璐路玉父纂述

男

登誕先

叅訂

倬飛疇

日本大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

痿痺門

痺

經云。風寒溼三氣雜至。合而為痺。風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。溼氣勝者為著痺。以冬遇此者為骨痺。以春遇此者為筋痺。以夏遇此者為脉痺。以至陰遇此者為肌痺。以秋遇此者為皮痺。



行痺者。病處行而不定。走注歷節疼痛之類。當散風爲主。禦寒利氣。仍不可廢。更須參以補血之劑。蓋治風先治血。血行風自滅也。○痛痺者。寒氣凝結。陽氣不行。故痛有定處。俗名痛風是也。治當散寒爲主。疎風燥溼。仍不可缺。更須參以補火之劑。非大辛大溫不能釋其凝寒之害也。○著痺者。肢體重著不移。疼痛麻木是也。蓋氣虛則麻木。血虛則木。治當利溼爲主。祛風解寒。亦不可缺。更須參以理脾補氣之劑。蓋土強自能勝溼。而氣旺自無頑麻也。○骨痺者。卽寒痺痛痺也。其證痛苦切心。四肢攣急。關節浮腫。○筋痺者。卽風痺行痺也。其證遊行不定。與血氣相搏。聚於關節。筋脉弛縱。或赤或腫。○脉痺者。卽熱痺也。藏府移熱。復遇外邪。客搏經絡。留而不行。其證肌肉熱極。皮膚如鼠。

走。脣口反裂。皮膚色變。肌痺者。卽著痺溼痺也。留而不移。汗出四肢痿弱。皮膚麻木不仁。精神昏塞。皮痺者。卽寒痺也。邪在皮毛。癰疹風瘡。搔之不痛。初起皮中如蟲行狀。已上諸證。又以所遇之時而命名。非行痺痛痺著痺外。又有皮脉筋肌骨之痺也。

故骨痺不已。復感於邪。內舍於腎。筋痺不已。復感於邪。內舍於肝。脈痺不已。復感於邪。內舍於心。肌痺不已。復感於邪。內舍於脾。皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。所謂痺者。各以其時。重感於風寒溼之氣也。肺痺者。煩滿喘而嘔。心痺者。脉不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。噎乾善噫。厥氣上則恐。肝痺者。夜卧則驚。多飲數小便。上爲引如懷。腎痺者。善脹。尻以代踵。脊以代頭。脾痺者。四肢懈惰。發欬嘔汁。上爲大塞。



肺痺則肺氣不清。胃熱上逆。故煩喘而嘔。心痺則脉道不通。心火內衰。溼氣凌心。故恐。肝痺則血液阻滯。水飲客之。故上爲引急。如有所懷也。腎痺則胃之關門不利。故善脹。濁陰溼邪傷其陽氣。所以脚攣不能伸。身僂不能直也。脾痺則陽氣不運。故四肢懈惰。上焦痞塞也。

腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。

腸者。兼大小腸而言。腸間病痺。則下焦之氣不化。故雖數飲。而小便不得出。則本末受病。故與中氣喘爭。蓋其清濁不分。故時發飧泄也。

胞痺者。少腹膀胱按之內痛。若沃以湯。漚於小便。上爲清涕。胞者。膀胱之脬也。膀胱氣閉。則水道不行。故按之內痛。若以熱湯沃之。小便得外熱之助。方得稍通。而猶滯漚不利。

則治宜溫助氣化。可知膀胱之脉從巔入絡腦。故上爲清涕。以太陽經氣不固。而精氣上脫。又須溫補無疑。蓋緣精泄之後。寒氣乘虛入於膀胱之內。而致小便淋瀝不通。莖中痛引穀道。甚則臍腹脹痛。此屬津液枯竭之故。誤與利水藥。必致喘逆脹急而死。老人陰虛泉竭。多有此證。曾見膀胱脹破。淋瀝無度。時雖暫寬。不久卽斃。

諸痺不已。亦溢內也。其風氣勝者。其人易已也。其入藏者死。其留連筋骨間者。疼久。其留皮膚間者。易已。凡痺之類。逢寒則急。逢熱則縱。

寒從中生者。是人多痺氣也。陽氣少。陰氣多。故身寒如從水中出。

人有身寒。湯火不能熱。厚衣不能溫。然不能凍慄。是人素腎



氣勝。以水爲事。太陽氣衰。腎脂枯。不長。一水不能勝兩火。腎者水也。而生於骨。腎不生。則髓不能滿。故寒甚至骨也。所以不能凍慄者。肝一陽也。心二陽也。腎孤藏也。一水不能勝二火。故不能凍慄。病名骨痺。是人當攣節也。

素腎氣勝。言稟氣本充也。以水爲事。言嗜慾無節。傷其真陽。無陽則陰無以生。故腎脂枯。不長。無陰則陽無以化。故寒甚至骨也。

病在陽者。命曰風。病在陰者。命曰痺。陰陽俱病。命曰風痺。

陽受風氣。故在陽者。命曰風。陰受濕氣。故入陰。則命曰痺。

風痺淫灤。病不可已者。足如履冰。時如入湯中。股脛淫灤。煩

心。頭痛。時嘔。時暈。

同

眩已汗出。久則目眩。悲以喜恐。短氣不

樂。不出三年死也。

寒痺之爲病也。留而不去。時痛而皮膚不仁。刺布衣者。以火  
燂之。刺大人者。以藥熨之。以醇酒二十觔。蜀椒一升。乾薑一  
觔。桂心一觔。凡四種。皆咬咀。漬酒中。用綿絮一觔。細布四丈。  
并內酒中。置酒馬矢煖中。蓋封塗。勿使泄。五日五夜。出布絮。  
曝乾之。乾復漬。以盡其汁。每漬必晬其日。乃出乾。乾并用漬。  
與綿絮複布爲複巾。長六七尺。爲六七巾。則用之。生桑炭灸  
巾。以熨寒痺所刺之處。令熱入。至於病所。寒復灸巾。以熨之。  
三十遍而止。汗出。以巾拭身。亦三十遍止。起步內中。無見風。  
每刺必熨。如此病已矣。此所謂內熱也。

內。納同。謂溫其經。使熱氣內入。血脉流通也。布衣血氣潛  
濁。故當以火燂之。卽近世鍼桃艾熨之類。

周痺者。在於血脉之中。隨脉以上。隨脉以下。不能左右。各當



其所。○風寒、溼氣客於分肉之間。迫切而爲沫。沫得寒則聚。聚則排分肉而分裂也。分裂則痛。痛則神歸之。神歸之則熱。熱則痛解。痛解則厥。厥則他痺發。發則如是。此內不在藏。而外未發於皮。獨居分肉之間。真氣不能周。故命曰周痺。金匱云。問曰。血痺病從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛。重因疲勞。汗出。卧不時動搖。加被微風。遂得之。但以脉自微。濇在寸口。關上小緊。宜鍼引陽氣。令脉和。緊去則愈。血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身體不仁。如風痺狀。黃耆桂枝五物湯主之。

血痺者。寒溼之邪。痺著於血分也。辛苦勞勩之人。皮腠緻密。筋骨堅強。雖有風寒濕邪。莫之能客。惟尊榮奉養之人。肌肉豐滿。筋骨柔脆。素常不勝疲勞。行卧動搖。或遇微風。

則能痺著爲患。不必風寒溼之氣雜至而爲病也。上條言脉自微濇。而關寸小緊。爲溼痺血分。所以陽氣不能外行。故宜鍼引陽氣。以和陰血。下條言陰陽俱微。而尺中小緊。爲營衛俱虛。所以身體不仁。故宜藥通營衛。行散其痺。則緊去人安而愈矣。○夫血痺者。卽內經所謂在脉則血凝不流。仲景直發其所以不流之故。言血旣痺。脉自微濇。然或寸或關或尺。其脉見小急之處。卽風入之處也。故其鍼藥所施。皆引風外出之法也。

腎著之病。其人身體重。腰中冷如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。身勞汗出。衣裏冷溼。久久得之。腰以下冷痛。腹重如帶五千錢。甘薑苓朮湯主之。此證乃溼邪中腎之外廓。與腎藏無預也。雖腰中冷如坐



水中。實非腎藏之真氣冷也。今邪著下焦。飲食如故。不渴。小便自利。且與腸胃之府無預。况腎藏乎。此不過身勞汗出。衣裏冷濕。久久得之。但用甘草乾薑茯苓白术甘溫淡滲行濕足矣。又何取煖腎壯陽哉。

諸肢節疼痛。身體𦵿羸。脚腫如脫。頭眩短氣。溫溫欲吐。桂枝苟藥知母湯主之。

此卽總治三焦痺之法。頭眩短氣。上焦痺也。溫溫欲吐。中焦痺也。脚腫如脫。下焦痺也。肢節疼痛。身體𦵿羸。筋骨痺也。由是觀之。當是風寒溼痺。其營衛筋骨三焦之病。然溼多則腫。寒多則痛。風多則動。用桂枝治風。麻黃治寒。白术治濕。防風佐桂枝。附子佐麻黃。白术其芍藥生薑甘草亦如桂枝湯之和其營衛也。知母治脚腫。引諸藥下行。附子

以行藥勢。開痺之大劑也。

戴人云。痺病以濕熱爲源。風寒爲兼。三氣合而爲痺。其脉沉澹。奈何治此者。不問經絡。不分藏府。不分表裏。便作寒溼脚氣。烏之附之。乳之沒之。種種燥熱攻之。中脘灸之。臍下燒之。三里火之。蒸之。熨之。湯之。炕之。以致便溺澹滯。前後俱閉。虛躁轉甚。肌膚日削。飲食不下。雖遇扁華。亦難措手。若此者何哉。胸膈間有寒痰故也。痺病本不死。死於醫之誤也。

景岳全書云。觀痺論曰。風寒溼三氣雜至。合而爲痺。而壽天剛柔論又曰。在陽者。命曰風。在陰者。命曰痺。何也。蓋三氣之合。乃專言痺證之所因也。曰在陽爲風。在陰爲痺。又分言表裏之有殊也。如風之與痺。本皆由感邪所致。但外有表證之見。而見發熱頭疼等證。或得汗卽解者。是皆有形之謂。此亦

陽邪在陽分。是卽傷寒中風之屬也。故病在陽者。命曰風。若  
既受寒邪。而初無發熱頭疼。又無變證。或有汗。或無汗。而筋  
骨之痛如故。及延綿久不能愈。而外無表證之見者。是皆無  
形之謂。此以陰邪直走陰分。卽諸痺之屬也。故病在陰者。命  
曰痺。其或既有表證。而疼痛又不能愈。此卽半表半裏。陰陽  
俱病之證。故陰陽俱病者。命曰風痺。此所以風病在陽。而痺  
病在陰也。然則諸痺者。皆在陰分。亦總由真陰衰弱。精血虧  
損。故三氣得以乘之。而爲此諸證。經曰。邪入於陰。則痺。正謂  
此也。是以治痺之法。最宜峻補真陰。使血氣流行。則寒邪隨  
去。若過用風溼痰滯等藥。而再傷陰氣。必反增其病矣。  
行痺者。走注無定。風之用也。經言。病在陽者。命曰風。在陰者。  
命曰痺。陰陽俱病。命曰風痺。越脾加木。附湯。輕則羌防。歸朮。



葛桂赤茯苓甘草威靈仙蒼朮黃蘗。若病久大虛。非大補氣血不可。如日從事。手散風清火。則脾肺必敗。終致不起。○痛痺者。痛有定處。乃溼氣傷腎。腎不生肝。肝風挾溼流走四肢。肩髃疼痛。拘急浮腫。金匱烏頭湯加羌活官桂。服後煖熱稀粥。助其作汗。乃解。身體痛如欲折。肉如錐刺刀割。千金附子湯。○著痺者。痺著不仁。經曰。營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。營衛俱虛。則不仁且不用。靈樞云。衛氣不行。則爲麻木。東垣治麻痺。必補衛氣而行之。渾身麻木不仁。或左或右。半身麻木。或面或頭。或手臂或脚腿。麻木不仁。並宜神効黃耆湯。皮膚間麻木。此肺氣不行也。本方去蔓荊倍黃耆加防風。如肌肉麻。營氣不行也。去蔓荊加桂枝羌防。手足麻痺。臂痛不能舉。多眠昏冒者。支飲也。氣口脉滑。指迷茯苓丸。脉浮者。二陳湯。

加桂枝枳桔。○若手麻乃是氣虛。十指麻乃是溼痰死血。手指麻木是氣不行。有頑痰死血也。導痰湯加烏藥蒼朮。○風吹手足痠疼而腫。是寒溼。桂枝附子湯。○因於風者。百節走痛。烏藥順氣散加羌活南星蒼朮。○因於濕者。天陰卽發。身體沉重痠疼。除濕蠲痛湯。在上痛者。加桂枝枳梗。在下痛者。加防己木通。多汗加黃耆防風。自汗身重。防己黃耆湯。○寒濕不可屈伸者。烏頭湯。活絡丹選用。并外用摩風膏。○因火者。五苓散加酒苓黃礬竹瀝薑汁。○因溼熱者。肢節疼痛。肩背沉重。胸膈不利。下注足脛痛腫。當歸拈痛湯。○熱毒流入肢節疼痛。患處必熱。千金犀角散。○血瘀者。芎歸桃仁紅花威靈仙煎成人麝少許。○血痺者。邪入於陰也。經云。人卧則血歸於肝。汗出而風吹之。血凝於膚者。爲痺是也。黃耆桂枝

五物湯。晝輕夜重。加當歸。痺而身寒。如從水中出者。屬寒。溼。附子丸。血氣凝滯。手足拘攣。疼重。風寒溼三氣雜至者。改定三痺湯。周痺者。真氣不能周於身。故周身痺痛。用蠲痺湯。行痺上半身甚。用烏藥順氣散。下半身甚。用虎骨散。痛痺。用烏頭湯。著痺。用除溼蠲痛湯。不應。用補中益氣。加熟附子。羌活。蒼朮。黃蘗。有痺遍身走痛無定。二陳湯加羌活。風化硝。薑汁糊丸服。痺在骨。安腎丸。痺在筋。羚羊角散。痺在脉。人參丸。痺在肌肉。神効黃耆湯。痺在皮。越脾湯。加羌活。細辛。白蒺藜。痺在腸。吳茱萸散。痺在胞。腎瀝湯。虛寒。茯苓丸。虛寒甚者。巴戟丸。熱痺。千金犀角散。冷痺。巴戟天湯。寒痺。宜以蜀椒。乾薑。桂心。各四兩。醇酒五觔。絮四兩。布五尺。馬矢火煨。一伏時。將絮布曝乾收盡。炙熱。釁之。



○著痺不移。腠肉破。身熱脉濇者。不治。

凡治痺證。不明其理。以風門諸通套藥施之者。醫之過也。夫痺證。非不有風。然風入在陰分。與寒溼互結。擾亂其血脈。致身中之陽。不通於陰。故致痺也。古方多有<sub>下</sub>用麻黃白芷者。以<sub>上</sub>麻黃能通陽氣。白芷能行營衛。然已入在四物四君子等藥之內。非顯發表明矣。至於攻裏之法。則從無有用之者。以攻裏之藥。皆屬苦寒。用之則陽愈不通。其痺轉入諸府。而成死證多矣。可無明辯而深戒歟。

診○脉大而濇爲痺。脉急亦爲痺。肺脉微爲肺痺。心脉微爲心痺。右寸沉而遲濇爲皮痺。左寸結而不流利爲血痺。右關脉舉按皆無力而濇爲肉痺。左關弦緊而浮沉有力爲筋痺。