

行運
心胃痛
三癰症

川
房木
腹痛

山
癰證
九腰痛

大
驚悸
卡脇痛

八
怔忡
卡腎痛

二
虛煩
世痛風
卡肩背痛

三
不寐
卡脚氣

卡癰症

甲子年
項壽記

壽世保元茂卷之伍

較正醫林狀元壽世保元戊集卷之五

廣順堂藏板

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

衞運

脉風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉冒言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼眩身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是不推尋致病之因乎治法隨機應敵其

問以升降鍾墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也識者將有採薪之憂

暈化痰湯 主方治眩暈之總司也

陳皮

去白

半夏

姜汁炒

白茯苓

去皮各一分半

枳實

炒

川芎

黃芩

酒炒各八分

白芷

細辛

南星

姜汁炒

防風

各七分

羌活

甘草

三分

右剉一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加人參七分白朮去蘆

一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無方言語心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛損停痰而致也

半夏白朮天麻湯

方見頭眩

一論勞役之人饑寒眩暈者脉虛弱也

神中益氣湯

方見內傷

依本方加半夏天麻白芍熟地黃○一眩暈屬氣虛有

濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白芷

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也

清離滋坎湯 方見勞瘵 依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷脉沉細也

參附湯 人參五錢 大附子炮三錢

右剉一劑生薑十片水煎服

○一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

清陽除眩湯 人參六分 白朮去芦一錢 白茯苓一錢 陳皮一錢 半夏湯泡一錢

天麻八分 檳榔八分 甘草四分 旋復花八分

○一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈倒者名曰痰暈

清痰祛眩湯 南星姜泡 半夏姜汁 天麻 蒼朮米泔浸 川芎 茯苓

桔梗 枳殼去穢 烏藥 酒芩 羌活各八分 甘草三分 陳皮

右剉生薑水煎臨服入竹瀝薑汁全服

○一論體虛之人一時為寒所中口不能言眩暈欲倒手足厥冷

薑附湯 乾薑 二兩 大附子 生去皮 脂一枚

右剉每五錢水煎溫服

○一論一切失血過多眩暈不醒者

芎歸湯 川芎 當歸 各等分

右剉水煎溫服○虛甚加炮過大附子

○一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暈者

十全大補湯 方見補益 依本方如有痰加陳皮半夏

○一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足脉痺口乾

引飲六脉洪數而虛予以為腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不能攝水歸

元而為痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合

○一人氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無予以為腎家不

能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈八味丸方見補益

○一人形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從眼起左

三脉洪而有力予爲足三陽虧損用補中益氣湯加麥門五味及加減八味

○一大方痰暈湯 半夏法製一錢橘紅一錢赤茯苓一錢黃芩酒洗七分白朮二錢五分

川芎五分 黃連五分 黃柏酒炒七分 薄荷五分 石膏一錢 甘草炙五分

知母七分 右剉一劑生薑三片水煎臨臥服

○一生員形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾引

飲六脉洪數而虛余以爲腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源

而爲痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味九料治之而

愈其後或勞役或入房其病卽作用前藥而愈

○一孟都憲氣短痰壅服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以爲腎

家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味九料三劑而愈

○一孫都憲形體豐厚勞神善怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹

起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂足三陰虧損用補中益氣加麥

門五味及加減八味丸而愈

十全大補湯

見補益

補中益氣湯

見內傷

八味丸

見補益

麻木

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也脉浮而緩屬濕爲麻痺脉緊而浮屬寒爲痛痺脉澁而芤屬死血爲木不知痛癢內經曰風寒濕三氣合而爲痺故寒氣盛者爲痛痺濕氣勝者著痺河間曰留着不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不榮故爲不仁矣夫所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如繩扎轉初解之狀古方名爲麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有曰虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法

宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

○一論麻木遍身手足俱麻者此屬氣血兩虛宜

加味八仙湯

當歸

酒洗

川芎

熟地黃

各七分

白芍

酒炒

人參

六分

白朮

去芦二錢

陳皮

八分

半夏曲

七分

白茯苓

去皮一錢

柴胡

四分

川羌活

五分

防風

五分

秦艽

六分

牛膝

六分

甘草

炙三分

桂枝

三分

右判一劑生薑一片棗一枚水煎食遠服○氣虛加黃芪蜜炒八分

○一論麻是渾身氣虛也

加減益氣湯

黃芪

蜜炒

人參

白朮

去芦

陳皮

當歸

各一錢

升麻

柴胡

木香

各五分

香附

青皮

去穰

川芎

各八分

桂枝

三分

甘草

三分

右判一劑生薑棗煎服

○一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

補中益氣湯

依前方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥共十四味

○一論木是濕痰死血也

雙合湯

當歸

川芎

白芍

生地黄

陳皮

半夏

姜汁各一錢

紅花

三桃仁 去皮 失分

白芥子

錢一分 甘草 三分

白茯苓

去皮 一錢

右剉一劑薑十片水煎熟入竹瀝薑汁同服

○一論手足麻痺因濕所致也

香蘇散

方見感冒

依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜

○一論感風濕手膊或痛或木或遍身麻木

五積散

方見中寒

○一論婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺宜

開結舒經湯

紫蘇

陳皮

香附

白烏

川芎

蒼朮

米泔浸

羌活

南星

半夏

當歸

各八分

桂枝

四分

甘草

三分

右剉生薑三片入薑汁竹瀝服

○一論口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻

止麻消痰飲

黃連

半夏

瓜蒌仁

黃芩

白茯苓

桔梗

枳殼熱炒

陳皮

天麻

細辛

南星

甘草

右剉生薑三片水煎服○血虛加當歸○氣虛加人參○亦有十指麻木胃中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子行經中死血者四物湯加紅花桃仁並葉忌生冷魚腥發風發熱之物

○一論十指麻木疼痛不仁

大附子木香各等分每服三錢薑三片水一碗煎七分服

○一論婦人遍身麻木痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下五

祛風散

生川烏

白朮

去芦

白芷

各三錢

甘草二錢

右爲細末酒調吞下五補丸

五補丸

黃芪

蜜炒

人參

五錢

附子

一个

當歸

三錢

白芍

酒炒

五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五七十丸祛風散送下

○一論不仁者謂不柔和也痛痒不知針灸不知是也經曰諸虛乘寒而鬱骨不仁蓋其血氣虛弱不能周流於一身於是正氣爲邪氣所伏故肢體頑麻

不知痛痒寒過厥如死屍而鬱且冒也用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯
八薑汁設或身汗如油喘不休喘而直視水漿不入者此為命絕也

一論風熱血燥皮膚瘙癢頭面手足麻木

四涼潤燥湯

當歸酒洗

生地黄各一錢半黃連

黃芩

白芍煨

天麻

防風

羌活

荆芥各八分

細辛

甘草六分

甘草五分

右剉水煎食遠服麻甚加川烏炮三分

一論面上木處可將桂枝為末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分若

脚底硬木處可將牛皮膠鎔化入生姜汁調和仍入南星末五錢和勻用厚

紙攤貼二三分乘半熱裹貼脚底上用溫火烘之此外治法也

一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣也

黃芪八錢

人參五錢

白芍三錢

柴胡二錢

升麻二錢

五味子一百四十個

生甘草五錢

炙甘草二錢

右剉水煎稍熱空心服

一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉

洪大

黃芪

三錢

當歸

二錢

蒼朮

四錢

陳皮

五錢

藁本

二錢

黃柏

酒炒

錢

柴胡

三錢

升麻

知母

酒炒

五味子

一錢

生甘草

二錢

半

右每劑一錢水煎空心服少待以早飯壓之

○一治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

黃芪

一兩

白芍

二兩

橘皮

一兩

半

澤瀉

五錢

炙甘草

一兩

半

右剉水煎溫服

癲狂

癲脉浮大滑者生沉小緊急不治○狂脉實大生沉小死○癲脉虛可治實則死

內經曰巨陽之厥則頭重足不能行發為眴仆眴搖其目也是蓋陽氣逆亂

故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癇之類也又曰陽明之厥則癲

疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌踰

垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結于

中而爲之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦有異乎難經謂重陰者癲重陽者狂素問註云多喜爲癲多怒爲狂然則喜傷於心而怒傷於肝乃二臟相資餘之症難經陰陽之說恐非理也大抵狂爲痰火實盛癲爲心血不足多爲求望高遠不得志者有之癰病獨主乎痰因火動之所作也治法癰者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三証者若神脫而目證如愚癡者縱有千金我酬吾未如之何也已矣○癲者喜笑不常顛倒錯亂之謂也○狂者大開目與人語所未嘗見之事爲狂也又云狂者狂亂而無正定也○譫語者合目自言日用常行之事爲譫也又蓄血症則重複語矣○鄭聲者聲顛無力不相接續造字出於喉中爲鄭聲也○陰附陽則狂陽附陰則癲脫陰者目盲脫陽者見鬼

○一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常

養血清心湯

人參

白朮

去芦

白茯苓

去皮

遠志

去心

酸棗仁

炒

川芎

各一錢

生地黃仁石菖蒲仁當歸

一錢半

甘草

五分

麥門冬

去心

右剉一劑水煎服

○一論狂者痰火實盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱實盛者宜

防風通聖散

方見中風

依本方加牡丹皮生地黃桃仁主之治一切大風

癲狂之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次啜之以

釵探吐熱痰次服

黃連解毒湯

方見感冒

依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也

加味逍遙散

當歸

白芍炒

白朮去芦

白茯苓

去皮 柴胡

生地黃

遠志

去心

桃仁

去尖

蘇木

紅花

甘草

右剉一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地辰砂水煎服

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心苦參主心

腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸

苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸薄荷湯送下

○一論一切癩癰風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室

女經脉通行驚邪蘊結頓服比比經効

抱膽丸

水銀二兩一錢硃砂兩研鉛一兩半乳香一兩研

右將鉛入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木棍研勻丸如芡

實大每一丸空心并花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再服一丸除

根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癩狂失心不寐此方用硃砂能鎮心安神酸使可收引故棗仁能歛神

歸心香可使利竅故乳香能豁達心志許學士加人參亦謂人參能寧心耳

寧志膏

辰砂一兩 酸棗仁炒五錢 乳香五錢 加人參一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癩狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

白金丸

白礬三兩 鬱金七兩

石爲末米糊丸每服五十丸溫水送下

○一論癲狂五癇驚悸一切怪症此皆痰火實盛也

清心滾痰丸

大黃

酒蒸黃芩

四兩青蒙石

錢五

沉香

一錢

牙皂

五錢

犀角

五錢

朱砂

五錢

射香

五分

石爲細末水丸每服四五十丸滾水送下

○一論心風者何蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中脇氣上攻迷其

心竅則爲癲爲狂所怒之事膠固於心輒自談失其條序謂言之心風與風

何干也若痰不盛者則有感亦輕

○一論久患心風癲狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定

此藥大能安神養血寧心定志

紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾爲末煉蜜爲丸空心酒送下

○一人癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之卽愈

○一人氣心風卽痰迷心竅發狂作用真花藥石煨黃酒淬一次爲細末每服

錢黃酒調下

○一論癲狂五癇眩暈時作時止痰涎壅盛心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰鬱火也

驅風豁痰湯

人參

白朮

去苦

白茯苓

去皮

半夏

姜炒

陳皮

枳實

炒

懷生地黃

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

桔梗

去苦

南星

天麻

瓜蒌仁

白附子

僵蠶

黃連

姜炒

黃芩

酒炒

遠志

甘草水炮去心

甘草

右剉一劑生薑五片水煎溫服

○一癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用紫河車入補藥內服之大能安神養血寧志治健忘驚悸怔忡不寐以六味九加遠志石菖蒲人參白茯苓當歸酸棗仁炒

○一治心志狂惑

用無灰酒一碗真麻油四兩共和勻楊枝二十條逐一條攪二三下攪遍楊枝直候油酒相和如膏煎至八分狂者強灌之令熟睡或吐或不吐覺來即醒