

利濕之劑 十三首附方

五苓散

仲景治太陽府。太陽經熱傳入膀胱府者用之。

白朮

澤瀉猪茯苓膀胱化氣添官桂利便消

暑煩渴清

猪苓茯苓白朮炒各十八銖澤瀉一兩六銖桂半兩每服

三九。二苓甘淡利水澤瀉甘鹹瀉水能入肺腎而通膀胱導水以泄火邪加

白朮者補土所以制水加官桂者氣化乃能出也。經曰膀胱者州都之官津液

藏焉氣化則能出矣。除桂名為四苓散無寒但渴

服之靈。溫勝則氣不能施化故。猪苓湯

利其濕則渴自止。猪苓湯

仲景除桂與朮加入阿膠滑石停。猪苓茯苓澤瀉

阿膠滑石各一兩。○滑石瀉火解肌最能行水吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿

膠滑石各一兩。○滑石瀉火解肌最能行水吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿

膠滑石各一兩。○滑石瀉火解肌最能行水吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿

膠滑石各一兩。○滑石瀉火解肌最能行水吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿

膠滑石各一兩。○滑石瀉火解肌最能行水吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿

膠滑石各一兩。○滑石瀉火解肌最能行水吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿

醫方集解卷之六

收瀉之劑

滑則氣脫脫則散而不收必有酸瀉之藥斂其耗散而後發者可返脫者可收也如

汗出亡陽精滑不禁泄痢不止大便不固小便自遺

久嗽亡津此氣脫也若亡血不已崩中暴下諸大吐

衄此血脫也十劑曰瀉可去脫牡蠣龍骨之屬是也

氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥并氣藥血藥者血之

帥也陽脫者見鬼陰脫者目盲此補

脫也當補陽助陰非瀉劑所當致也

赤石脂禹餘糧湯

仲景治傷寒服湯藥下利不止心下痞

鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之

利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯

主之。下焦主分別清濁

復利不止者當利其小便

利小便所以實大腸也

赤石脂

禹餘糧

等分杵碎煎

膠以存 此為利濕兼瀉熱煩黃 便閉

此手陽明藥也。瀉可去脫重可達下。石脂餘糧之瀉以

渴嘔

五苓治濕勝 猪苓兼熱勝

小半夏加茯苓湯

仲景行水散痞有半夏

一升茯苓三兩生薑半

治少陰病二三日。至四五日。腹痛。小便不利

斤除茯苓名小半夏湯

加桂除夏治悸

下利不止便膿血者

成氏曰陽明下利便膿血者協熱也少陰下利腹痛便膿血者下焦

厥茯苓甘草湯名乾

加桂枝甘草除半

不約而裏寒也。凡下利便膿血身

仲景治傷寒水氣乘心厥而心下悸者

赤石脂一斤乾薑兩粳米一

此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重瀉下焦血分

先治其水却治其厥。火因水而下

則悸眩止而痞滿消矣

腎着湯

金匱內用乾薑茯苓甘草白朮襄傷

而固脫乾薑之辛溫煖下焦氣分而補虛粳米之甘溫

身痛與腰冷亦名甘草薑朮湯

乾薑炮茯苓

佐石脂乾薑而潤腸胃也

朱丹溪曰桃花湯主下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之

苓各四兩甘草炙白朮炒各二兩。數

重瀉不能止血用粳米之甘以引入腸胃準繩曰使膿

藥行水補土此是邪在經而未入府

血熱下流也成氏釋為裏寒非也桃花湯惟用乾薑

黃耆防已 除薑茯苓甘草薑末共

煎嘗此治風水與諸濕身重汗出服之

良黃耆防已各一兩白木七九半甘草

炙五九加薑棗煎。防已大辛苦寒

通行十二經開竅行水黃耆生用達表

白木燥溫強脾並能止汗加甘草者益

土所以制水又以緩

防已之峻急也

舟車 九河

牽牛及大黃遂乾芫花又木香

青皮橘皮加輕粉燬實陽水却相當

面赤氣粗便閉而腫脹者為陽水黑牽

牛四兩炒大黃二兩酒浸甘遂麵裏煨

元花醋炒大戟麵裏煨青皮炒橘紅各

一兩木香五九輕粉一水丸。牽牛

易頭吹舌濕

然分兩最微石脂梗米居多以調正氣瀉滑脫佐以乾

薑用辛以散之之義謂便膿血皆傳經之熱邪也呂鶴

臯曰少陰腎水主禁固二便為火所灼尅伐大腸庚金

故下利膿血石脂寒能勝熱瀉可收脫用乾薑者假其

辛熱以從治用梗米者恐石脂性寒損胃也聊攝之明

而猶昧此況其下平程郊倩曰此症終是火衰不能生

土未可指為傳經之熱邪也不知此而漫云滲泄腎防

一徹前後泄利而陽神陷矣昂按成氏生于千載之後

而能昌明仲景之書使後學有所循入其功非小奈何

後起之士動輒非之成氏之死已久安能起而辨其是

非乎如此症成氏以為寒而王肯堂吳鶴臯皆以為熱

竊謂便膿血者固多屬熱然豈無下焦虛寒腸胃不固

而亦便膿血者乎若以此為傳經熱邪仲景當用寒劑

桃花湯

可輕投

疏鑿飲 檳榔及商陸芩皮大腹同椒目赤

豆芫薤瀉木通煎薑薑皮陽水服

商陸 檳榔

茯苓皮大腹皮椒目赤小豆秦芫薤活

澤瀉木通等分加薑皮棗煎。芫薤散

溫上升通瀉瀉溫下降芩腹薑皮行水

于皮膚椒豆商檳攻水于腹裏亦上下

表裏分

消之意

實脾飲嚴 芩木與木瓜甘草木香大腹加

草寇附薑兼厚朴虛寒陰水效堪誇利便

不渴而腫脹者為陰水茯苓白木土炒

木瓜甘草木香大腹皮草豆蔻煨附子

炮薑厚朴炒加薑棗煎。脾虛補以

醫方集解

卷六

二

皆屬熱邪一語遂以為熱耳程郊倩每以直中為寒邪傳經為熱邪古今相傳二語覺未盡然不為無見若學未深造而輕議古人多見其不知量也矣

東垣治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及作

膿血日夜無度

御米穀

去蒂蜜炒五分訶子煨去核七分

乾薑炮六分

橘紅五分

芍藥

空心服

此手足陽明藥也御米穀酸澁微寒固腎瀉腸訶子酸

澁苦溫收脫佳瀉炮薑辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能

升陽調氣以固氣脫亦可收形脫也

泄瀉為氣脫脫肛為形脫

可開可下可子一兩半木香五寸草二黃連三為末

以從大凡脾滯導以厚朴木香又土之不足由于木之有餘木瓜水香皆能平肝瀉木使木不尅土而脾和則土能制水而脾實矣經曰溫勝則地泥實土正所以制水也

五皮飲治瀉用五般皮陳茯苓桑大腹奇陳皮

茯苓皮薑皮桑白皮大腹皮或用五加皮易桑白脾

虛膚脹此方司脾不能為胃行其津液故水腫半身以上宜汗

半身以下宜利小便此方于瀉水之中仍寓調補之意皆用皮者水溢皮膚以

皮行皮也

羌活勝濕湯局羌獨芍甘蔓藥本與防風

濕氣在表頭腰重痛發汗升陽有異功

每服二錢用白朮芍藥湯調下治瀉久腹痛漸已瀉下

漸少以此止之如不止加厚朴一兩竭其餘邪木香黃連

行氣清火止痢厚腸甘草芍藥甘草湯也甘緩酸收和中止痛加訶子瀉以收脫加白朮補以強脾厚朴除濕

散滿平胃調中故更藉之以去餘邪也

直人養藏湯治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛肝門

腸之使大腸受熱受寒皆能脫肛大腸者傳導之官腎者強作之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛

大腸氣無所生故脫肛小見血氣未壯老人血氣已衰皆易脫肛亦治下痢赤白臍腹

疼痛日夜無度

醫藥殼去蒂蜜炙訶子麵裹煨一兩二錢肉豆蔻麵裹煨五錢木香

二兩肉桂八錢人參白朮炒當歸六錢烏六錢生甘

風能勝濕升能降

氣升則水自降

不與行水滲草

一兩八錢

濕同

溫氣在表宜汗又風能勝濕故用風藥上升使溫從汗散羌活獨活

各一錢川芎甘草炙藥本防風各五分蔓荊子三分如有寒溫加附子防已

若除獨活芎蔓荊除濕

湯

升麻蒼朮充

除獨活川芎蔓荊甘草加升麻蒼朮名羌活除溫湯治風溫身痛

大橘皮湯治濕熱五苓六一二方綴陳皮

木香檳榔增能消水腫及瀉泄

用五苓散赤茯苓

苓一錢猪苓澤瀉白木桂各五分用六一散滑石六錢甘草一錢加陳皮錢半

木香檳榔各三分每服五錢加薑煎

小水併入大腸致小便不利而大便泄

瀉二散皆行水瀉熱之藥加枳櫟峻下

每服四錢藏寒甚加附子一方無當歸

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故用參朮甘草以補

其虛肉桂肉蔻以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和

血芍藥酸以收斂詞子嬰殼則瀼以止脫也

此虛寒脫肛之劑益

大補元氣或加芎歸調血及升柴以升提之又有氣熱血熱而肛反挺出者宜用芩連槐栝或四物加升麻柴

胡秦艽防

風之類

附丹溪脫肛方人參黃耆當歸川芎升麻

此治氣血兩虛而脫肛者

當歸全黃湯治陰虛有火盜汗發熱

心之所藏在內者為血發于外者為汗

汗乃心之液也五藏六府表裏之陽皆心主之以行

水腫亦治之
病故皆治之

茵陳蒿湯

仲景

治疸黃陰陽寒熱細推詳陽

黃大黃梔子

人 瘀熱在裏口渴便閉身如橘色脉沉實者為陽

黃苗陳六兩 大黃二兩 酒浸梔子十四枚 茵陳發汗利水能泄太陰陽明之

濕熱梔子導濕熱出小便陰黃附子與乾便大黃導濕熱出大便

薑以苗陳為主如寒濕陰黃色暗便溏者陰梔子大黃加乾薑附子以燥濕

散亦有不用茵陳者仲景栝皮梔子湯

黃栝二兩梔子十五枚甘草一兩按陽黃胃有瘀熱者宜下之如發熱者則熱

外出而不內入不必汗下惟用梔子黃栝清熱利濕以解和之若小便利色白

無熱者仲景作虛勞治用小建中湯

易黃飲古溫

之虛泄而為汗是汗盡由心出也醒而出汗曰自汗屬陽虛睡而出汗曰盜汗屬陰虛汗者心之陽寢者腎之陰陰虛睡熱衛外之陽乘虛而入陰中表液失其固衛故濺濺然汗出覺則陽氣復而汗止矣因熱邪乘陰虛而出者汗必熱因寒邪乘陽虛而出者汗必冷有火者謂有面赤口乾唇燥便赤音重脉數諸症凡傷風傷溫中暑風溫柔瘧氣虛血虛脾虛胃熱亡陽痰飲驚怖勞役房室癰瘍產蓐等症皆能令人出汗經又云飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗出于腎疾走恐懼汗出于肝操體勞苦汗出于脾凡頭汗左額屬肝右額屬肺臍屬脾頤屬腎額屬心津液自胃府旁達于外為手足汗有胃熱胃寒二症自汗亦有屬實者故外感初症多自汗

當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃栝 黃連 黃

此手足少陰藥也盜汗由于陰虛當歸一地所以滋陰者加倍

醫方集解

溫

當歸六黃湯

日

八正散局

木通與車前扁蓄大黃滑石研

汗由火擾黃芩栢連所以瀉火濕無熱不作汗濕得熱蒸則令人出汗

草稍瞿麥兼梔子煎加燈草痛淋蠲

由腠理不固倍用黃耆所以固表

李時珍曰當歸六黃湯加麻黃根治盜汗

一方有木香治濕熱下注口渴咽乾淋痛尿血小腹急滿●木通燈草瞿麥降心火入小腸車前清肝火入膀胱梔子瀉三焦鬱火大黃滑石瀉火利水之捷藥扁蓄利便通淋草稍入莖止痛雖治下焦而不專于治下必三焦通利水乃下行也

萆薢分清飲 石菖蒲 草稍烏藥益智俱

甘草稍減半 或益茯苓鹽煎服加鹽通餘藥等分

心固腎濁精驅遺精白濁●草薢能泄厥陰陽明濕熱去濁分

清烏藥疏逆氣而止便數益智固脾腎七年諸藥不效予與涼膈散三黃丸三日病已蓋腎主五液化為五溫腎水上行乘心之虛心火上炎而入腫

甚捷蓋其性能行周身肌表引諸藥至衛分而固腠理也按此盜汗與傷寒盜汗不同傷寒盜汗邪在半表半裏故以和表為主古法小柴胡加桂主之此屬陰虛故以補陰為主李士材曰陰虛則元氣有降而無升而復用此苦寒肅殺之劑得毋犯虛虛之戒乎惟火實氣強者宜之不然苦寒損胃禍彌深耳●準繩曰陰虛陽必熯故發熱自汗當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰必乘故發厥自汗黃耆建中湯甚者加附子或者附湯有濕熱合邪汗出不休以風藥勝其溫苦藥泄其熱羌活勝濕湯有痰症冷汗自出宜理氣降痰痰去則汗自止有用固澀藥汗愈不收止可理心血汗乃心之液必失所養不能攝血故溢而為汗宜大補黃耆湯加酸棗仁有微

則氣化行而淋濁止矣此以疎泄為禁則腎水還本戴玄府閉而汗自止矣

止者也縮泉九益智同烏藥等山藥為糊附撲汗法白朮各二錢半米粉兩半為末絹袋盛過

丸便數需臨湯下治便數遺尿當歸拈痛湯東垣羌防升猪澤茵陳本葛朋之

二米苦參知母草治陽虛自汗

酒洗羌活防風升麻猪苓澤瀉茵陳黃芩酒炒葛根蒼朮白朮土炒苦參知母並酒炒甘草炙羌活通關節防風散留濕苦參黃芩茵陳知母以泄濕熱當歸以和氣血升葛助陽而升清苓瀉瀉濕而降濁參甘二朮補正固中使苦寒不傷胃疏泄不損氣也劉宗厚曰此方東垣本治濕壅脚氣後人用治諸瘡甚驗

潤燥之劑十三首附方二

此手太陰少陰藥也陳來章曰汗為心之液心有火則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽為陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻根之甘溫走肌表而固衛

神仁丸治陰虛盜汗

炙甘草湯景 參薑桂麥冬生地大麻仁大

栢子仁炒研去油二兩 人參 白朮 半夏 五味子 牡蠣

棗河膠加酒服 虛勞肺痿效如神甘草

麻黃根一兩 麥麩五小 棗肉丸米飲下五十丸日三服

參生薑桂枝各三兩阿膠蛤粉炒二兩

此手足太陰少陰藥也陳來章曰心血虛則睡而汗出

生地一斤麥冬麻仁研各半斤煎十二

栢子仁之甘辛平養心寧神為君牡蠣麥麩之鹹涼靜

枝水酒各半煎仲景治傷寒脉結代心

躁收脫為臣五味酸斂瀝收半夏和胃燥濕為佐濕能

動悸及肺痿唾多千金翼用治虛勞實

麻黃根端走肌表引人參白朮以固衛氣為使

滋燥養榮湯 兩地黃麥甘歸芍及羌防羌

治遺精白濁及強中消渴心腎為水火之藏

風藥 潤劑 瓜枯膏燻兼風秘火燬金傷血液

五藏六府輸至之精皆不得藏而時下矣故為遺精夢

亡 當歸酒洗二小生地熟地白芍炒黃

泄戴氏曰遺精有因用心過度心不攝腎以致失精者

活血潤燥生津飲丹 二冬熟地兼恬養

泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤濁

仁紅花及歸地利通經善澤枯槁地白赤濁為心虛有熱因思慮而得白濁由腎虛有寒

白芍各一錢天冬麥冬各一錢各八分桃仁研紅花各五分

葦汁牛乳飲丹反胃滋養榮散痰潤腸奇菟絲子兩五味子兩石蓮肉兩白茯苓三山藥六將

五汁安中飲張舊梨藕三般加入用隨濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米飲下

宜牛乳牛升葦葉汁少許滾湯頓服名此手足少陰藥也菟絲辛甘和平強陰益陽能治精寒

汁梨汁各一分和服名五汁安中飲並淋渴五味滋腎生津石蓮清心止濁山藥健脾利濕皆

瘀血寒痰阻滯胃口故食入反出也牛瀉精固氣之品也茯苓能通心氣于腎利小便而不走

薑汁溫胃散痰梨汁消痰降火聽審症氣取其淡滲于補正中能泄腎邪也

潤腸丸東垣用歸尾羌桃仁麻仁及大黃歸尾治胃中濕熱滲入膀胱下濁不止淋病在溺厥屬

羌活大黃各五錢桃仁大麻仁各一兩肝腹瀉瀉病在精衰屬腎膀胱部或由濕熱或由虛寒

易頂狀活燥蜜凡歸尾桃仁潤燥活血羌活散火大抵熱者多而寒者少赤屬血白屬氣成田敗精源血

搜風大黃破結通
幽麻仁滑腸利竅
或加羌防皂角子
風壅塞竅道痛溢異常非
濕是熱淋不宜用淋藥治

加秦芫防風皂角子燒存性研卓
子得濕則滑善通便秘芫防治風
風秘蓮鬚黃連炒二兩黃栢

血秘善通腸風燥血燥致大便秘
冬一猪苓兩甘草炙三兩

通幽湯東垣中二地俱桃仁紅花歸草濡升
此足少陰太陽太陰藥也精濁多由濕熱與痰黃連瀉

麻升清以降濁清腸不升則濁陰不降故大便不通生地熟地
心火黃栢瀉腎火所以清熱二苓所以利濕半夏所以

各五分桃仁研碎花當歸
身甘草炙升麻各一錢
噎塞便閉此除痰濕熱多由于鬱滯砂仁益智辛溫利氣又能固腎

方需有如麻仁大黃石當歸潤腸湯名
強脾既以散留滯之氣且稍濟連栢之寒甘草和中而

殊上藥皆潤燥通腸
補土惟蓮鬚之瀉則所以固其脫也
朱丹溪曰巢氏原病候論曰白濁者

搜風順氣九大黃蒸郁李麻仁山藥增防
由勞傷腎腎氣虛冷故也歷代宗其說不惟白濁之理
不明所治之法亦誤不思內經本無白濁之名惟言少

濁車前及枳殼菴絲牛膝山茱萸乃中風
陰在泉客勝溲便澁少陽在泉客勝則溲白又言思想

五兩大麻仁郁李仁去皮山藥酒蒸車謂發聖人之旨以正于載之誤矣子嘗聞先聖論赤白
前子牛膝酒蒸山藥肉各三兩菟絲子濁多因濕熱下流膀胱而成即靈樞所謂中氣不足洩
酒浸防風獨活枳椇枳殼麩炒各一兩便為之變是也必先補中氣使升舉之而後分其藏府
蜜丸○防濁潤腎搜風枳椇順氣破滯氣血赤白虛實以治與夫其他邪熱所傷者固在瀉熱
大黃經蒸晒則性稍和緩同二仁滑利補虛設腎氣虛甚或火熱亢極者則不宜過用寒涼之
潤燥通幽牛膝車前下行利水如山藥劑必以反佐治之要在權衡輕重而已葉氏曰遺精多
山藥菟絲固本益陽不使過干攻散也

消渴方

丹

中花粉連藕汁生地汁牛乳研

食生化而輸于腎若脾胃受傷濕熱內鬱使中氣滯而不清則所輸皆濁氣邪火擾動心不得而安靜故令遺

粉連研末
諸汁調服

或加薑汁蜜為膏服瀉火生

也

津益血痊

黃連瀉心火生地滋腎水藕汁益胃花粉生津牛乳潤燥

遺精白濁

精與濁所出之竅不同便濁即是膏淋肝胆之火也精濁

益血

乃精氣滑出不便亦然此腎水不足淫火薰蒸故精離其位也

白茯苓丸治腎消花粉黃連車前解調二麥

金櫻膏

取半黃耆熬膏一斤熟則全甘而失滋味

和九鹽濕

方頁欠片燥

醫方集解

卷六

水陸二山丹

七

熟地覆盆子石斛蛇床脬脰音皮鴟鵂脰皮

酒下

也茯苓粉黃連龜鱉人參玄參熟地黃覆盆子各一兩石斛蛇床子各七刀

牛鷄胞皮三十具微炒蜜丸磁石濕下黃連降心火石斛平胃熱熟地玄參

生腎水覆盆蛇床固腎精人參補氣花粉生津扶苓交心腎草蘇利濕熱脬脰

治腸消磁石色黑屬水假之人腎也

猪腎薺鹿湯干參扶神知苓葛草石膏因

磁石天花同黑豆強中消渴此方珍下消

之症一長興盛不交精出少強中緣服邪術聖藥而毒盛也猪腎一具大豆一

升薺龍人參石膏各三兩磁石綿裹煑神知母黃芩葛根甘草花粉各一兩先

煮已腎去滓下藥分三服○知苓石膏

此足少陰藥也金匱芡實甘能益精潤能滋陰瀉能止

脫一生于水一生于山故名水陸二仙丹

金匱固精丸治精滑不禁精滑者火炎上血水趨下必腎不交也

沙苑藜炒芡實蒸蓮鬚二龍骨酥牡蠣鹽水煮一日兩服粉一兩

蓮子粉糊為丸鹽湯下

此足少陰藥也藜藜補腎益精蓮子交通心腎牡蠣清

熱補水芡實固腎補脾合之蓮鬚龍骨皆精氣之

品以止滑脫也治遺精太泄有五必神浮越者辰砂礞石龍骨之類鎮之痰飲迷心者猪苓丸

之類導之思想傷陰者潔古珍珠粉九黃栢蛤粉等分

毒雄石猪腎引之八腎也

地黄飲子易參耆甘二地二冬斛斛參澤

瀉枳實二府燥煩消渴血枯舍

人參 黃耆也 定志丸見目門

甘草炙天冬麥冬生地枳枳葉蜜炙石斛澤瀉枳實炒每服三錢參耆

參耆人參治藏毒挾熱下血久痢膿血不止挾熱者謂挾各

草以補其氣氣能生水二地二冬以潤其燥潤能益血石斛平胃枳枳下氣澤瀉瀉膀胱之火枳實宣失腸之滯使二府清則心肺二藏之氣得以下降而渴

人參 檉根白皮東引者去粗皮醋炙等分為末米飲或酒調

止白

酥蜜膏酒

用飴糖三汁百部及生薑杏

此手足陽明藥也人參之甘以補正氣檉皮之苦以燥

棗補脾兼潤肺聲嘶氣憊酒溫膏

酥蜜 飴糖

其濕寒以解其熱瀉以收其脫使虛者補而陷者升亦

煎肉杏仁細研百部汁之薑汁共煎一炊久如膏溫酒細經過服之

劫劑也初起勿用

易頭敗舌濕

醫方集解

金鎖固精丸八參檉皮散

清燥湯東垣

二水與黃耆參苓連栢草陳皮

桑螵蛸散冠氏

治小便數而欠

數便頻也欠便短也溺雖出于膀胱然必別者小腸

猪澤升柴五味麴麥冬歸地

痰方推

治肺也小腸虛則便數小腸熱則便短

能安神魂補心氣療健忘

金受濕熱之邪痿躄喘促口渴便赤黃耆錢半蒼朮炒一錢白朮炒陳皮澤瀉

人參

茯苓

一用

遠志

石菖蒲

鹽炒

桑螵蛸

鹽水炒

龍骨

各五分人參茯苓升麻各三分當歸酒洗先生地麥冬甘草炙神麴炒黃栢酒炒

煨龜板

酥炙一方月

當歸

等分

為末

臨臥服

二錢

人

猪苓各二分柴胡黃連炒各一分五味丸粒煎心肺為辛金主氣大腸為庚金

參湯下

主津燥金受濕熱之邪則寒水生化之源絕而痿躄喘渴諸症作矣參耆苓朮

此足少陰手足太陽藥也虛則便數故以螵蛸龍骨固

陳草補土以生金麥味保金而生水連栢歸地瀉火滋陰猪澤升柴升清降濁

之

標竅固腎龍骨滋精

熱則便欠

故以當歸龜板滋之

人參補心

則燥金肅清水出高原而諸症平矣此方不盡潤藥因有清燥二字故附次于

氣菖蒲開心竅茯苓能通心氣于腎遠志能通腎氣于

此然東垣所云清燥者蓋指肺與大腸為燥金也

心並能清心解熱心者小腸之合也心補則小腸不虛

心清則小腸不熱矣