

本草備要 卷四

金石水土部

本草備要

金石水土部目錄

金

銅綠

自然銅

鉛

鐵

蜜陀僧

丹砂

水銀

輕粉

空青

雲母

石膏

滑石

硝

元明粉

元精石

石脂

禹餘糧

浮石

硼砂

硇砂

磁石

礞石

赭石

花乳石

鑪甘石

陽起石

鍾乳

白石英

紫石英

雄黃

石硫黃

石蟹

無名異

礬石

礞石

石灰

白礬

膽礬

阜礬

青鹽

食鹽

急流水

逆流水

甘瀾水

井泉

百沸湯

陰陽水

黃蘆水 露

臘雪水 冰

地漿

孩兒茶

百草霜 墨

伏龍肝 鹼

本草備要

金石水土部

金

重鎮心肝定鬱悸

辛平有毒

生金屑服之殺人昂按金性至剛重墜與血肉之體不相宜故服之致死非其性有毒也人被金銀

灼者並不潰爛無毒可知矣精金粹玉世之寶器豈有毒氣哉金制木重鎮怯故鎮心肝安

魂魄

雖云重墜亦藉其寶氣也古方有紅雪紫雪皆並金銀煮汁亦假其氣耳

治驚癇風熱肝膽

之病

肝經風熱則爲驚癇失志魂魄飛揚肝屬木而畏金與心爲子母之臟故其病同源一治

九散用

箔爲衣煎劑加入藥煮畏錫水銀

遇鉛則碎五金皆畏水銀

銀功用略同

銅綠

卽銅青宣去風痰

酸平微毒治風爛淚眼惡瘡疳瘍婦人血氣心痛吐風痰合

金瘡止血殺蟲亦金勝水之義

用醋製銅刮用

自然銅重續筋骨

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛

折傷必有死血瘀滯經絡然須審虛實佐以養血補氣溫

經之藥銅非煅不可用火毒金毒相煽復挾香藥熱

產銅

坑中火煅醋淬七次細研甘草水飛用

昔有飼折翅雁者雁飛去故治折傷

鉛重墜瘀解毒

甘寒屬腎稟壬癸之氣水中之金金丹之母八石之祖

丹竈家必

用之安神解毒墜瘀殺蟲烏鬚

制爲梳

明目

鉛丹

卽黃丹用

黑鉛加硝

黃鹽礬  
鍊成鹹寒沉重味兼鹽礬內用墜瘀去怯消積殺蟲治驚

瘡瘍病外用解熱拔毒去瘀長內熬膏必用之藥

用水漂去鹽硝砂石

微火炒紫色攤亦名胡粉錫粉李時珍曰鉛地上去火毒用鉛粉主治略同粉亦可代鉛丹熬膏然未經鹽礬火煅又有豆粉蛤粉雜之只入氣分不能入血分也

### 鐵

重墜痰鎮驚

辛平重墜鎮心平肝定驚療狂消癰解毒諸藥多忌之

李時珍曰

補腎藥

尤忌之

畏磁石阜筴

阜筴木作薪則釜裂

煅時砧上打落者名鐵落

素問用治怒狂如塵飛起者名鐵精器物生衣者名鐵繡鹽醋浸出

者名鐵華

時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也

鍼砂消水腫黃疸散

癰瘤烏鬚髮

烏鬚方多用之

### 蜜陀僧

重鎮驚劫痰消積

辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消積殺蟲

療腫毒愈凍瘡

用桐油調敷

解狐臭

油調搽腋以饅頭蒸熱  
擦開摻末夾腋下亦佳

染鬚

鬚出銀坑難得今用者乃傾銀鑪底入藥煮一伏時

丹砂重鎮心定驚鴻熱

體陽性陰

內含陰

味甘而涼色赤屬火

性反涼者離中虛有陰也味不苦而甘者火中

有土

瀉心經邪熱

心經血

分主藥

鎮心清肝明目發汗

汗爲心液

定驚祛

風辟邪

胡王少卿多惡夢遇推官胡用之

道士教戴靈砂而驗

遂解髻中絳囊授之

卽夕無夢

解毒

胎毒痘毒宜之

止渴安胎

博救方水煮一兩研酒服能下死胎

李時珍曰同遠志龍骨之類養心氣

同丹參當歸之類養心血同地黃枸杞子之類養腎同厚樸川

椒之類養脾同南星川烏之類祛風

○多服反令人癰瘍

辰產明如箭鏃者良

名箭鏃砂

細研水飛三次用

生用無毒火

煉則有毒服

餌常殺人惡磁石畏鹽水忌一切血

鄭康成註周禮以丹砂雄黃

石膽礬石磁石爲五毒古人

用以

攻癟

水銀 重外用殺蟲

辛寒陰毒功專殺蟲治瘡疥蟣蟲

性滑重直入內頭瘡切不可用恐入經絡令人筋骨

拘攀解金銀銅錫毒

能殺五金

墮胎絕孕

從丹砂燒煅而出畏磁石砒霜得鉛則凝得硫則結併棗肉入唾研則碎散失在地

者以花椒茶末收之

輕粉

燥劫痰涎外用殺蟲

辛冷

時珍曰  
時珍曰  
燥有毒

殺蟲治瘡劫痰消積

能消涎積十棗湯加大黃牽牛輕粉名三化神佑散

善入經絡癰癧藥多用之不可過服常用

時珍曰水銀陰毒用火煅丹砂而出

再加鹽礬煉爲輕粉輕揚燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘡雖能劫風痰溼熱從牙齦出邪鬱暫解然毒氣竄入經絡

筋骨血液耗亡筋失所養變爲筋攣骨痛癰腫瘍漏遂成廢  
瘡貽害無窮○上下齒齦屬手足陽明腸胃經毒氣循經上  
行至齒齦溝嫩之處而出

土茯苓黃連黑鉛鐵漿陳醬能制其毒

空青

重明日

甘酸而寒益肝明目通竅利水產銅坑中大塊中空有水  
者良

雲母

補中

甘平屬金色白入肺下氣補中堅肌續絕治勞傷瘧痢瘍腫

癰疽

同黃丹熬膏貼之于金翼用傳城山人康道豐有雲母粉方能治百病

有五色以色

白光瑩者爲上古人亦有煉服者

雲土母入火經時不焦入使不腐故云服之長生

澤鴉惡羊肉

石膏

體重瀉火氣輕解肌

甘辛而淡體重而降足陽明經胃大寒之藥色白入肺兼入

三焦

諸經氣分之藥

寒能清熱降火辛能發汗解肌甘能緩脾益氣

生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱

肌肉壯熱

經云陽盛生外熱

小便赤濁大渴引飲中暑自汗

能發汗又能止

自汗舌焦胎厚牙痛

陽明經熱爲未擦牙固齒

又胃主肌肉肺主皮毛爲發

斑發疹之要品

色赤如錦紋者爲斑隱隱見紅點者爲疹斑重而疹輕率由胃熱然亦有陰陽二證陽證

宜用石膏又有內傷陰證見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛逼其無根之火游行於外當補益氣血使中有主則氣不

外游血不外散若作熱外治死生反掌醫者宜審但用之尠少則難見功

白虎湯以之爲君或自一

兩加至四兩竹葉麥冬知母粳米亦加四倍甚者加芩連藥名三黃石膏湯虛者加人參名人參白虎湯然能寒

胃弱血虛及病邪未入陽明者禁用

成無已解大青龍湯曰風陽邪傷衛寒陰

邪傷營營衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛俱和石膏乃重劑而又專達肌表也○質重氣輕又成氏以桂麻爲輕劑石膏爲重劑也○東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明證身熱目痛鼻乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交額中故日痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和則臥不安故不得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱類白虎湯證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰二證至爲難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而格陰於外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎之淺深胎黃黑者爲熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者舌無芒刺口有津液也急

**亦名寒水石**

時珍曰古方所用

宜溫之誤投寒劑卽死矣

寒水石是凝水石

唐家諸方用寒水石卽石膏凝水石乃鹽精滲入土中年久結成清瑩有稜入水卽化辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫

瑩白者良研細甘草水飛用近人因其寒或用火煅則不傷

胃味淡難出苦入煎劑須先煮數十沸雞子爲使忌巴豆鐵

滑石滑利竅通行水體重瀉火氣輕解肌

滑利竅淡滲溼廿益氣補脾胃寒瀉熱降心火色白入肺上

開腠理而發表膀胱主皮毛下走膀胱而行水通六腑九竅津液爲

足太陽經本藥膀胱治中暑積熱嘔吐煩渴黃疸水腫腳氣淋

閉偏主石淋水瀉熱痢六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢吐血衄血諸瘡腫毒

爲蕩熱除溼之要劑消暑散結通乳滑胎時珍曰滑石利竅

腠理而發表是除上中之溼熱下利使溺而行水是除中下之溼熱熱去則三焦寧而表裏和溼去則關門通而陰陽利矣○闢門分別清濁乃小腸之下口○河間益元散主治上

下表裏諸病蓋是此意益元散一名天水散一名六一散取

天一生水地六成之之義滑石六錢甘草一錢或加辰砂○  
滑石治渴非實止渴資其利竊滲去溼熱則脾胃中和而渴  
自止耳若無溼小便利而渴者內有燥熱宜滋潤或誤服  
此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以爲至燥之劑

白而潤者良石韋爲使宜甘草

走泄之性宜甘草以和之

朴硝芒硝

朴硝卽皮硝大瀉潤燥軟堅

辛能潤燥鹹能軟堅苦能泄大寒能除熱朴硝酷澀性急  
芒硝經煉稍緩能蕩滌三焦腸胃實熱推陳致新按致新則  
與大黃同蓋邪氣不除則正氣不能復也治陽強之病傷寒經曰人之傷於寒也必病熱蓋寒鬱而爲熱也疫痢積聚結癥留血停瘀黃疸淋閉瘻瘍瘡腫曰赤障翳通經墮胎豐城尉家有貓子死腹中啼叫欲絕醫以硝礮之死子卽下後有一牛亦用此法得活本用治人治畜亦驗經疏曰硝者消也五金八石皆能消之况臟腑之積聚乎其直往無前之性所謂無堅不破無熱不蕩者也病非

熱邪深固閉結不通不可輕投恐誤伐下焦真陰故也成無己曰熱淫於內治以鹹寒氣堅者以鹹軟之熱盛者以寒消之故仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不至堅者不可用也佐之以苦故用大黃相須爲使許譽卿曰芒硝消散破結軟堅大黃推蕩走而不守故二藥相須同爲峻下之劑王好古曰本草言芒硝墮胎然妊娠傷寒可下者兼用大黃以潤燥軟堅瀉熱而母子相安經曰有故無殞亦無殞也此之謂歟謂藥自病當之故母與胎俱無患也 硝能柔五金化七十二種石爲水生於鹵地刮取煎

鍊在底者爲朴硝在上有芒者爲芒硝有牙者爲馬牙硝置風日中消盡水氣輕白如粉爲風化硝大黃爲使本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主治略同後人辨論紛然究無定指李時珍曰朴硝下降屬水性寒硝石爲造炮燄硝上升屬火性溫昂按世人用硝從未有取其上升而溫者李氏之說恐非確論

## 元明粉

鴻熱潤燥軟堅

辛甘而冷去胃中之實熱蕩腸中之宿垢潤燥破結消腫明目  
血熱去則腫消而目明昂按瀉痢不止用大黃元明粉以推蕩之而瀉痢反止蓋宿垢不淨疾終不除經所謂通因通用也

朴硝煎化同萊菔煮再用甘草煎入罐火煅以去其鹹寒之性陰中有陽性稍和緩大抵用代朴硝若胃虛無實熱者禁用俱忌苦參

太陰元精石

瀉熱補陰

太陰之精鹹寒而降治上盛下虛救陰助陽有扶危拯逆之功  
正陽丹用治傷寒壯熱來復丹用治伏暑熱瀉出解池通泰積鹽處鹹鹵所結青白瑩徹片皆六絃者良今世用者多是絳石

赤石脂

重濬固大小腸

甘而溫故益氣生肌而調中酸而澀故收溼

獨行方煅末傅小兒臍中汁出

止血而固下

經疏云大小腸下後虛脫非滻劑無以固之

赤腫直入下焦陰分故爲久痢泄癧要藥仲景桃花湯用之加乾薑粳米

其一他滲藥輕浮不能達下惟赤石脂體重而

滷直入下焦陰分故爲久痢泄癧要藥仲景桃花湯用之加乾薑粳米

癰瘍潰瘍收口長肉催生下胞

經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣云胞胎不出

滲劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻

細膩黏舌者良赤入血分

白入氣分

五色石脂各入五臟研粉水飛用

惡芫花畏大黃

禹餘糧

重滷固下

甘平性滷手足陽明

大腸胃

血分重劑治欬逆下痢血閉

癥瘕

崩能固下

李先知云下焦有病人難會須用禹餘糧赤石脂

又能催生

石中黃粉生

於池澤無砂者良牡丹爲使

本草備要

赤石脂  
禹餘糧

浮石

靈砂七

金石水玉醴

# 浮石

一名海石  
瀉火軟堅

鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上源

肺爲水上源之上源

止渴止嗽

通淋軟堅除上焦痰熱消癰瘤結核

頑痰所結鹹能軟堅愈

當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也以肝實而肺虛也故石入水則沉南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉水

香虛實之

水沫日久結成海中者味鹹更良

# 硼砂

潤生津去痰熱

# 硼砂

潤生津去痰熱

甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津止嗽治喉

痺口齒諸病

初覺喉中腫痛含化嚥津則不成痺

能柔五金而去垢膩故治噎

膈積塊結核努肉

目翳骨哽含之嚥汁

出西番者自如明

礬出南番者黃如桃膠能制汞啞銅

硼砂可作金銀錠

可作金銀錠

可作金銀錠