



2016

卫生专业技术资格考试护理学初级（师）



押题秘笈

阿虎医考命题研究中心 组 编

「2016 新大纲」

三套卷子，题题解析

免费赠送两次人机对话摸底考试

发现一个答案错误奖励100元

发现一个错别字奖励5元

人机对话，万人同测，
琅琅榜上你排第几，
护考



上海科学技术出版社
Shanghai Scientific & Technical Publishers

全国百佳图书出版单位
Top 100 Publishing Houses in China



阿虎医考
AHUYIKAO.COM

2016 卫生专业技术资格考试

护理学初级(师)押题秘笈

模拟试卷一



阿虎医考命题研究中心 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

2016 卫生专业技术资格考试护理学初级(师)押题秘笈/阿虎医考
命题研究中心组编. —上海:上海科学技术出版社,2016.2

ISBN 978-7-5478-2981-3

I. ①2… II. ①阿… III. ①护理学—医药卫生人员—资格考试—
自学参考资料 IV. ①R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 004308 号

轻松过万人同测摸底考
看看你能虐全国多少人?!



1. 考场紧张? 小问题, 先来找找临场感觉!

2. 考试改革? 落伍了, 人机对话先行一步!

3. 心里没底? 别担心, 考试摸底试试手气!

授权码

使用方法: 扫描二维码→下载APP→手机号注册帐号→输入授权码

2016 卫生专业技术资格考试护理学初级(师)押题秘笈

阿虎医考命题研究中心/组编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 15.75

字数: 255 千

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-2981-3/R·1074

定价: 68.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

2016 卫生专业技术资格考试 护理学初级(师)

基 础 知 识

姓 名：_____

准考证号：_____

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. II 型呼吸衰竭病人的主要诱因是
 - A. 过度劳累
 - B. 精神紧张
 - C. 呼吸道感染
 - D. 营养不良
 - E. 长期吸烟
2. 新生儿时期保健重点错误的是
 - A. 建立家访制度
 - B. 生后一个月访视 2~3 次
 - C. 早产儿应保暖
 - D. 访视中进行全面体格检查
 - E. 进行生长发育监测
3. 下列关于 SLE 的说法错误的是
 - A. 盘状红斑狼疮可发展为 SLE
 - B. 大多有皮肤损害
 - C. 紫外线可使皮肤症状恶化
 - D. 妊娠期病情好转
 - E. 肾损伤常见
4. 关于营养性缺铁性贫血的病因，下列提法哪项不妥
 - A. 先天储铁不足
 - B. 铁的摄入不足
 - C. 铁需要量增加
 - D. 红细胞破坏过多
 - E. 铁的丢失过多
5. 关于急性蜂窝织炎的描述不正确的是
 - A. 致病菌主要是化脓性链球菌
 - B. 病变区与正常皮肤无明显界线
 - C. 局部明显红肿剧痛
 - D. 可由软组织损伤后感染引起
 - E. 多伴有寒战、高热等全身症状
6. 与肺癌发病关系最密切的因素是
 - A. 职业性致病因素
 - B. 长期吸烟
 - C. 免疫缺陷
 - D. 慢性肺部疾病
 - E. 遗传因素
7. 心跳骤停复苏后最常见的感染是
 - A. 败血症
 - B. 伤口感染
 - C. 尿路感染
 - D. 肺部感染
 - E. 消化道感染
8. 关于宫颈癌的早期发现与预防，不正确的措施是
 - A. 普及防癌知识
 - B. 积极治疗宫颈疾病
 - C. 每 3~5 年普查 1 次宫颈涂片
 - D. 提倡晚婚少育
 - E. 重视接触性出血者的进一步追踪
9. 慢性阻塞性肺病，加强腹式呼吸的原因是
 - A. 有利于痰液排出
 - B. 增加肺泡张力
 - C. 使呼吸幅度扩大，增加肺泡通气量
 - D. 借助腹肌进行呼吸
 - E. 间接增加肋间肌活动
10. 过期妊娠指妊娠达到或超过
 - A. 40 周末
 - B. 41 周末
 - C. 42 周末
 - D. 43 周末
 - E. 44 周末
11. 有关钾代谢，下列说法错误的是
 - A. 钾摄入多则排出多，摄入少则排出少
 - B. 维持细胞内渗透压
 - C. 正常血清钾值为 3.5~5.5 mmol/L

- D. 大部分经肾排出
E. 对心肌有抑制作用
12. 外科 ICU 的床位数一般为
A. 外科总床位数的 2%~3%
B. 手术科室总床位数的 2%~4%
C. 急诊病人总数的 4%~6%
D. 医院总床位数的 3%~6%
E. 占急诊病人总数的 2%~3%
13. 引起肾病综合征的各种疾病中,下列哪项属于原发性肾病综合征
A. 糖尿病肾病
B. 过敏性紫癜肾
C. 慢性肾炎
D. 狼疮性肾炎
E. 肾淀粉样变
14. 类风湿关节炎除关节受损外还有关节外病变,主要是
A. 中度贫血
B. 血沉快
C. 抗 Sm 抗体(+)
D. 低热
E. 类风湿结节
15. 正常小儿能用简单的语言表达自己的年龄是
A. 8~9 个月
B. 10~12 个月
C. 1.5~2 岁
D. 3 岁
E. 3.5 岁
16. 血栓形成病人多在睡眠或安静休息时发病是因为
A. 睡眠时头位过低易淤血
B. 血压降低脑缺血
C. 心排出减少脑缺血
D. 四肢静脉血栓堵塞脑血管
E. 血流变慢易形成血栓
17. 下列哪项不是触诊内容
A. 肢体末梢湿度
B. 心包摩擦音
C. 腹部包块的位置
D. 颈部淋巴结的移动度
E. 心前区震颤
18. 面颊潮红,呼吸急促,烦躁不安,痛苦呻吟,为
A. 病危面容
B. 慢性病容
C. 急性病容
D. 甲状腺功能亢进(甲亢)面容
E. 二尖瓣面容
19. 与支气管哮喘发作有关的免疫球蛋白是
A. IgA
B. IgG
C. IgE
D. IgD
E. IgM
20. 肠鸣音活跃见于
A. 急性肠炎
B. 急性胰腺炎
C. 肠麻痹
D. 消化性溃疡
E. 肝硬化
21. 痰液呈草绿色提示肺部感染的病原菌是
A. 肺炎杆菌
B. 军团菌
C. 铜绿假单胞菌
D. 葡萄球菌
E. 厌氧菌
22. 心室颤动的脉搏特征是
A. 快而规则
B. 慢而规则
C. 快而不规则
D. 慢而不规则

- E. 测不到
23. 反复感染可引起风湿性心脏瓣膜病的病原菌是
- A. A 族乙型溶血性链球菌
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 肺炎链球菌
 - D. 流感嗜血杆菌
 - E. 绿脓杆菌
24. 急性心肌梗死主要由于
- A. 肺动脉栓塞
 - B. 中动脉瓣狭窄
 - C. 冠状动脉栓塞
 - D. 上腔静脉受压
 - E. 肾动脉狭窄
25. 2010 年中国高血压防治指南对 1 级高血压的诊断标准是
- A. 收缩压 < 120 mmHg, 舒张压 < 80 mmHg
 - B. 收缩压 < 130 mmHg, 舒张压 < 85 mmHg
 - C. 收缩压 $140 \sim 159$ mmHg, 舒张压 $90 \sim 99$ mmHg
 - D. 收缩压 $130 \sim 139$ mmHg, 舒张压 $85 \sim 89$ mmHg
 - E. 收缩压 $160 \sim 179$ mmHg, 舒张压 $100 \sim 109$ mmHg
26. 有关呕血与黑便的描述, 不正确的是
- A. 呕血一般都有黑便
 - B. 出血量 5 ml, 大便隐血试验阳性
 - C. 出血量 60 ml, 出现黑便
 - D. 出血量超过 300 ml, 出现呕血
 - E. 黑便必有呕血
27. 下列哪一项是十二指肠溃疡的主要病因
- A. 幽门螺杆菌感染
 - B. 胃酸分泌过多
 - C. 应激和心理因素
 - D. 遗传因素
 - E. 吸烟
28. 下列哪项不是引起肝硬化的因素
- A. 慢性活动性肝炎
 - B. 感染血吸虫病
 - C. 长期大量酗酒
 - D. 长期服用甲基多巴
 - E. 长期接触染发剂
29. 原发性肝癌普查常首选
- A. CT
 - B. AFP(甲胎蛋白)
 - C. MRI(核磁共振)
 - D. AKP(碱性磷酸酶)
 - E. B 超
30. 引起急性胰腺炎的主要病理机制为
- A. 病毒感染
 - B. 细菌感染
 - C. 胰腺的自我消化
 - D. 消化酶生成过多
 - E. 缺乏消化酶
31. 上消化道急性大出血一般是指数小时内失血量超过
- A. 400 ml
 - B. 600 ml
 - C. 1 000 ml
 - D. 1 200 ml
 - E. 1 500 ml
32. 肝硬化合并上消化道出血最主要的原因是
- A. 缺乏维生素 K
 - B. 食管、胃底静脉曲张破裂
 - C. 血小板减少
 - D. 凝血功能障碍
 - E. 胃溃疡活动性出血
33. 正常成人安静时的双肾血流量约关

- A. 500 ml/min
B. 800 ml/min
C. 1 000 ml/min
D. 1 100 ml/min
E. 1 500 ml/min
34. 原发性肾病综合征病人水肿的主要原因是
A. 蛋白质合成障碍
B. 低蛋白血症
C. 高脂血症
D. 循环血容量不足
E. 肾小管重吸收蛋白障碍
35. 属于肾前性肾功能衰竭的病因是
A. 大出血、休克
B. 肾中毒
C. 双侧输尿管结石
D. 前列腺增生
E. 盆腔肿瘤压迫输尿管
36. 再生障碍性贫血的发病机制是
A. 红细胞数量和质量的改变
B. 脾功能亢进
C. 血细胞寿命缩短
D. 骨髓造血功能衰竭
E. 肝功能衰竭
37. 人体最重要的神经内分泌器官是
A. 下丘脑
B. 腺垂体
C. 神经垂体
D. 甲状腺
E. 肾上腺
38. 下列关于糖尿病的描述中不正确的是
A. 1 型糖尿病又称为胰岛素依赖型糖尿病
B. 2 型糖尿病又称为胰岛素非依赖型糖尿病
C. 原发性糖尿病最少见,继发性糖尿病相对多见
D. 妊娠期发生糖耐量减低称为妊娠糖尿病
E. 糖尿病是多基因遗传性疾病
39. 瞳孔缩小最常见于
A. 有机磷农药中毒
B. 阿托品中毒
C. 深昏迷病人
D. 视神经萎缩
E. 视网膜脱落
40. 巴宾斯基征阳性见于
A. 锥体束损害
B. 周围神经损伤
C. 脑膜炎
D. 蛛网膜下腔出血
E. 甲状腺功能亢进
41. 临床休克期相当于休克病理生理分期的
A. 微循环痉挛期
B. 微循环扩张期
C. 微循环衰竭期
D. 正常微循环
E. 微循环代偿期
42. 急性肾功能衰竭少尿期最危险的并发症是
A. 出血倾向
B. 高钾血症
C. 代谢性酸中毒
D. 水中毒
E. 尿毒症
43. 下列哪一种为闭合性损伤
A. 擦伤
B. 刺伤
C. 挫伤
D. 切割伤
E. 裂伤
44. 下列可作为肿瘤定性诊断的检查是
A. CT

- B. B超
C. 核素检查
D. X线造影
E. 病理检查
45. 头皮裂伤,经清创后,应采用下列哪种方法包扎
A. 蛇形
B. 螺旋形
C. 螺旋返折形
D. “8”字形
E. 回返形
46. 甲状腺功能亢进患者术前准备最重要的是
A. 测定基础代谢率
B. 保证休息
C. 喉镜检查
D. 营养支持
E. 抗甲状腺药物和碘剂的应用
47. 急性乳房炎的主要病因是
A. 乳头破损
B. 乳头皲裂
C. 乳管堵塞
D. 乳头发育不良
E. 乳汁淤积
48. 急性心肌梗死患者出现阵发性室性心动过速,预示即将发生
A. 心房颤动
B. 心室颤动
C. 心室停顿
D. 不完全性房室传导阻滞
E. 完全性房室传导阻滞
49. 腹外疝的发病基础是
A. 腹壁有先天性或后天性薄弱或缺损
B. 营养不良
C. 腹腔压力增加
D. 腹部穿透伤
E. 继发于腹腔内脏器的损伤
50. 关于继发性腹膜炎下列哪项不符
A. 阑尾炎并发穿孔是常见原因之一
B. 闭合性腹部损伤引起并不少见
C. 女性经生殖系感染扩散也可导致
D. 一般为单一细菌感染,毒性较弱
E. 病原菌以大肠杆菌最多见
51. 成人排便时肛门滴血,有痔核脱出,便后自行回纳。这种痔属于
A. I度内痔
B. II度内痔
C. III度内痔
D. 嵌顿性内痔
E. 血栓性外痔
52. 原发性肝癌主要的转移途径为
A. 门静脉系统
B. 肝外血行转移
C. 淋巴转移
D. 直接浸润转移
E. 腹腔种植性转移
53. 病情重、死亡率高的胆道疾病是
A. 胆总管结石
B. 胆道蛔虫病
C. 胆囊结石急性发作
D. 急性重症胆管炎
E. 急性胆囊炎
54. 下列哪项不属于原发性下肢静脉曲张的原因
A. 长期站立
B. 长期重体力劳动
C. 先天性静脉壁薄弱
D. 静脉瓣膜发育不良
E. 下肢深静脉瓣膜功能不全
55. 肾结核主要源于
A. 肺结核
B. 骨结核
C. 肠道结核

- D. 附睾结核
E. 膀胱结核
56. 老年男性尿潴留最常见的原因是
A. 尿道结石
B. 膀胱结石
C. 尿道损伤
D. 良性前列腺增生
E. 低血钾
57. 婴儿最常见的肾肿瘤是
A. 肾实质癌
B. 肾盂癌
C. 乳头状瘤
D. 肾母细胞瘤
E. 错构瘤
58. 压缩性骨折常见于
A. 股骨干骨折
B. 肱骨干骨折
C. 椎体骨折
D. 桡骨骨折
E. 肋骨骨折
59. 腰椎间盘突出症最常发生于
A. 腰 1~2 椎
B. 腰 2~3 椎
C. 腰 3~4 椎
D. 腰 4~5 椎
E. 骶 1~骶 2
60. 关于女性内生殖器官描述哪项是对的
A. 非孕期子宫容积 10 ml
B. 子宫腔呈梭形
C. 输卵管正常约 16~18 cm
D. 卵巢为性腺器官
E. 子宫腔表面内膜称为基底层
61. 正常骨盆出口平面的横径应为
A. 9 cm
B. 10 cm
C. 11 cm
D. 12 cm
E. 13 cm
62. 我国对围生期的规定是
A. 从妊娠满 28 周(即胎儿体重 ≥ 1000 g 或身长 ≥ 35 cm)至产后 1 周
B. 从妊娠满 20 周(即胎儿体重 ≥ 500 g 或身长 ≥ 25 cm)至产后 4 周
C. 从妊娠满 28 周(即胎儿体重 ≥ 1000 g 或身长 ≥ 35 cm)至产后 4 周
D. 从胚胎形成至产后 1 周
E. 从胚胎形成至产后 4 周
63. 胎盘由下列哪些组织构成
A. 平滑绒毛膜、包蜕膜、羊膜
B. 平滑绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜
C. 叶状绒毛膜、包蜕膜、真蜕膜
D. 叶状绒毛膜、底蜕膜、羊膜
E. 叶状绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜
64. 关于分娩的分期,错误的是
A. 总产程是指规律性宫缩开始至胎儿娩出为止
B. 第一产程初产妇需要 11~12 小时
C. 第二产程初产妇需要 1~2 小时
D. 第三产程不超过 30 分钟
E. 第二产程经产妇需 1 小时或数分钟
65. 妊娠高血压综合征最基本的病理变化为
A. 胎盘绒毛膜退行性变化
B. 水钠潴留
C. 全身小动脉痉挛
D. 弥漫性血管内凝血
E. 肾小管重吸收功能降低
66. 关于妊娠合并肝炎下述哪项不对
A. 使早孕反应加重
B. 孕晚期易发生妊高征
C. 分娩期易发生产后出血
D. 对胎儿无影响

- E. 妊娠期易发生病毒性肝炎
67. 滴虫性阴道炎的传染方式,下列哪项是错误的
- 性交传播
 - 游泳池传播
 - 公共浴池传播
 - 不洁器械传播
 - 宫内传播
68. 第二性征尚未发育时,原发性闭经是指
- 年龄超过 14 岁,尚无月经来潮
 - 年龄超过 15 岁,尚无月经来潮
 - 年龄超过 16 岁,尚无月经来潮
 - 年龄超过 17 岁,尚无月经来潮
 - 年龄超过 18 岁,尚无月经来潮
69. 诊刮送检的组织显微镜检查,仅见滋养细胞增生应考虑为
- 流产
 - 葡萄胎
 - 异位妊娠
 - 绒毛膜癌
 - 侵蚀性葡萄胎
70. 在妇科特殊检查中,用于测定有无排卵的简便方法为
- 诊断性刮宫
 - 基础性体温测定
 - 输卵管通液术
 - 阴道后穹隆穿刺术
 - 阴道脱落细胞检查
71. 一健康小儿体重 18 kg,身高 100 cm。其年龄约为
- 3 岁
 - 4 岁
 - 5 岁
 - 6 岁
 - 7 岁
72. 按热量计算,5 kg 婴儿每日需要 8%糖牛乳量为
- 100~110 ml
 - 200~220 ml
 - 400~440 ml
 - 500~550 ml
 - 600~660 ml
73. 低出生体重儿是指出生 1 小时内体重低于
- 1 500 g
 - 2 000 g
 - 2 500 g
 - 3 000 g
 - 4 000 g
74. 下列与新生儿寒冷损伤综合征的发病无关的是
- 早产
 - 寒冷
 - 溶血
 - 窒息
 - 感染
75. 健康幼儿的呼吸次数每分钟是
- 15~20 次
 - 25~30 次
 - 35~40 次
 - 45~50 次
 - 55~60 次
76. 下列先天性心脏病中,哪种属于无分流型
- 房间隔缺损
 - 室间隔缺损
 - 动脉导管未闭
 - 法洛四联症
 - 肺动脉狭窄
77. 少尿是指 24 小时尿量少于
- 1 000 ml
 - 800 ml
 - 600 ml

- D. 400 ml
E. 200 ml
78. 属于脑膜刺激征的是
A. 布鲁津斯基征阳性
B. 巴宾斯基征阳性
C. 前囟饱满
D. 嗜睡、昏迷
E. 双侧瞳孔不等大
79. 2个月以下小婴儿化脓性脑膜炎最常见的病原体是
A. 水痘病毒
B. 肺炎双球菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 溶血性链球菌
E. 轮状病毒
80. 中毒型痢疾多见于
A. 新生儿
B. 婴幼儿
C. 儿童
D. 青年
E. 成人
81. 在倾听技巧中,哪项是不可取的
A. 全神贯注
B. 集中精神
C. 双方保持一定距离
D. 双方在同一高度
E. 始终保持目光的接触
82. 可杀灭结核分枝杆菌的条件是
A. 放在阴湿处 2 小时
B. 烈日暴晒 2 小时
C. 60℃水浸泡数分钟
D. 放在通风处 2 小时
E. 放在阴凉干燥处 2 小时
83. 贫血患儿,活动量稍大时气促、心悸,Hb 40 g/L,该患儿的贫血程度为
A. 轻度
B. 中度
C. 重度
D. 极重度
E. 正常
84. 患者男,46岁。车祸致右上腹损伤 2 小时,面色苍白,四肢湿冷,腹痛,腹膜刺激征明显,脉搏 120 次/分,血压 70/50 mmHg。该患者出现腹膜刺激征的原因最可能是
A. 血液刺激
B. 胃酸刺激
C. 胰液刺激
D. 尿液刺激
E. 胆汁刺激
85. 患者男,36岁。昨天硬膜外麻醉下行疝修补术,体温 38℃,脉搏 88 次/分,最可能的是
A. 肺部感染
B. 泌尿道感染
C. 伤口感染
D. 吸收热
E. 切口感染
86. 患者男,41岁。于饱餐、饮酒后突然出现中上腹持久剧烈疼痛,伴有反复恶心,呕吐出胆汁。查体:上腹壁压痛,腹壁轻度紧张,测血清淀粉酶明显增高,诊断为急性胰腺炎。对该病人首选的处理措施为
A. 禁食、胃肠减压
B. 适当补钙、补钾
C. 外科手术准备
D. 屈膝侧卧位
E. 应用吗啡
87. 患者男,55岁。饱餐酗酒后 2 小时,上腹部持续剧痛并向左肩、腰背部放射,伴恶心、呕吐,入院诊断“急性胰腺炎”。病情监测时,该患者发生下列哪一情况提示可能发生“急性坏死性胰腺炎”
A. 血清淀粉酶 ≥ 500 索氏单位

- B. 尿淀粉酶 ≥ 500 索氏单位
- C. 血钙 ≤ 2.0 mmol/L
- D. 血糖 ≥ 8.0 mmol/L
- E. 腹腔穿刺液中血清淀粉酶 ≤ 500 索氏单位

88. 患者男,56岁。患肝硬化已4年,今日饮酒后突然大量呕血,伴神志恍惚、四肢湿冷、血压下降,该病人最容易诱发

- A. 自发性腹膜炎
- B. 心力衰竭
- C. 肾功能衰竭
- D. 肝性脑病
- E. 水电解质紊乱

89. 患者女,65岁。体检发现其胸骨右缘第2肋间可触及收缩期震颤,最可能的原因是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 肺动脉瓣关闭不全

90. 患者男,50岁。发热,咳嗽,胸痛,呼吸急促,可疑急性脓胸,最有确诊意义的是

- A. 肺部叩诊浊音
- B. 肋间饱满
- C. 呼吸音减弱
- D. 胸片大片阴影
- E. 胸穿抽出脓液

二、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~92题共用备选答案)

- A. 普食
- B. 温凉半流质

- C. 母乳
- D. 热汤面
- E. 炸馒头片

91. 5个月鹅口疮患儿的饮食应选用

92. 疱疹性口炎幼儿的饮食应选用

(93~94题共用备选答案)

- A. 出生1~2天
- B. 出生2~3天
- C. 出生5~6天
- D. 出生8~9天
- E. 出生2周

93. 足月新生儿生理性黄疸消退的时间是

94. 新生儿生理性黄疸出现的时间是

(95~96题共用备选答案)

- A. 肠系膜血栓
- B. 异物堵塞肠腔
- C. 急性弥漫性腹膜炎
- D. 肠道功能紊乱
- E. 水、电解质紊乱

95. 机械性肠梗阻见于

96. 麻痹性肠梗阻见于

(97~98题共用备选答案)

- A. 急性腹绞痛
- B. 肌束颤动
- C. 瞳孔缩小、流涎
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 四肢张力减退

97. 有机磷农药中毒的烟碱样作用为

98. 有机磷农药中毒的蕈碱样作用为

(99~100 题共用备选答案)

- A. 游走性四肢大关节肿痛,极少出现畸形
- B. 脊柱关节强直性病变,呈弓状畸形
- C. 对称性小关节受累,晚期多有畸形
- D. 大小关节均可受累,很少畸形及关节

脱位

- E. 全身关节酸痛伴明显胸骨下端压痛

99. 类风湿关节炎表现为

100. 系统性红斑狼疮表现为

2016 卫生专业技术资格考试 护理学初级(师)

相关专业知识

姓 名：_____

准考证号：_____

一、以下每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 治疗肺炎球菌性肺炎，停用抗生素的指标一般是

- A. 体温降至正常后 3 天
- D. 体温降至正常后 1 周
- C. 体温降至正常后 2 周
- D. 症状、体征完全消失
- E. X 线显示炎症阴影完全消失

2. B 超检查可见胎心搏动的孕周为

- A. 8 周末起
- B. 12 周末起
- C. 16 周末起
- D. 20 周末起
- E. 24 周末起

3. 关于结核菌素试验结果的描述下列正确的是

- A. 凡是结核菌素试验阴性都可以除外结核
- B. 卡介苗接种成功，结核菌素反应多呈阳性
- C. 重症肺结核的结核菌素反应为阳性
- D. 结核菌素试验阳性，肯定有结核病
- E. 初次感染结核后 4 周内，结核菌素试验阳性

4. 病人血气分析 PaO_2 小于 60 mmHg， PaCO_2 大于 50 mmHg 时宜选用的氧流量为

- A. 持续低流量
- B. 持续高流量
- C. 间断低流量
- B. 乙醇湿化高流量
- E. 高压氧

5. 关于消化性溃疡用药的叙述，不正确的是

- A. 氢氧化铝凝胶应在餐后 1 小时服用
- B. 服用西咪替丁应注意观察有无头晕、皮疹
- C. 硫糖铝片应在餐前 1 小时服用
- D. 奥美拉唑可引起头晕，用药时不可开车
- E. 甲硝唑应在餐前半小时服用

6. 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是

- A. 头晕
- B. 皮疹
- C. 乏力
- D. 便秘
- E. 口干

7. 肝硬化病人进食时应细嚼慢咽，必要时药物应研成粉末服用，其目的是

- A. 易消化
- B. 以免引起食管胃底静脉曲张破裂、出血
- C. 以防耗氧增加，诱发肝性脑病
- D. 以免加重腹水
- E. 便于下咽

8. 不符合门静脉高压症病理改变的是

- A. 脾肿大
- B. 脾功能亢进
- C. 消化道器官淤血
- D. 腹水形成
- E. 中心静脉压高

9. 下列哪项检查结果提示可能是慢性肝炎与肝硬化

- A. 血清转氨酶升高
- B. 血清碱性磷酸酶升高
- C. 血清直接胆红素升高
- D. 白蛋白与球蛋白比例倒置
- E. 凝血酶原时间延长

10. 严重呕血病人饮食护理正确的是

- A. 暂禁食
B. 温热的流食
C. 温凉的流食
D. 软食
E. 普食
11. 蛋白尿是指尿液中蛋白含量每日超过
A. 80 mg
B. 95 mg
C. 100 mg
D. 125 mg
E. 150 mg
12. 急性肾盂肾炎病人取中段尿进行细菌培养有诊断意义的是
A. 细菌数大于 10^2 /ml
B. 细菌数大于 10^4 /ml
C. 细菌数大于 10^5 /ml
D. 细菌数小于 10^5 /ml
E. 细菌数在 $10^2 \sim 10^5$ /ml 之间
13. 做甲状腺摄 ^{131}I 率测定,在检查前1个月禁食的食物是
A. 河鱼
B. 白菜
C. 土豆
D. 紫菜
E. 鸡蛋
14. T_3 、 T_4 过多综合征的症状不包括
A. 低热
B. 心悸
C. 手抖
D. 便秘
E. 多汗
15. 甲亢、高热、心动过速病人术前不宜选用
A. 苯巴比妥钠
B. 吗啡
C. 阿托品
D. 地西洋
E. 哌替啶
16. 目前 SLE 的急性发作期首选治疗药物是
A. 非甾体类抗炎药
B. 免疫抑制剂
C. 免疫增强剂
D. 抗疟药
E. 肾上腺皮质激素
17. 下面防治类风湿关节炎的要点中哪项是错误的
A. 使用阿司匹林等非甾体类抗炎药
B. 缓解晨僵和疼痛等关节症状
C. 长期持续坚持使用肾上腺糖皮质激素
D. 适当选用免疫抑制剂
E. 注意锻炼关节功能
18. 下列不符合癫痫的药物治疗原则的是
A. 药物剂量由小到大,逐步增加
B. 定期监测血象及肝肾功能和药物浓度
C. 一般情况不主张联合用药
D. 撤换药物时要果断、迅速
E. 根据发作类型选择最佳药物
19. 严重高渗性脱水的患者首选补液的液体是
A. 生理盐水
B. 平衡盐溶液
C. 5%葡萄糖溶液
D. 5%碳酸氢钠溶液
E. 5%葡萄糖盐水
20. 全胃肠外营养支持病人可能发生的最严重的代谢并发症是
A. 高钾血症
B. 低钾血症
C. 肝功能异常
D. 高血糖高渗性非酮性昏迷