

火傷

命門火衰

暑

涇

消渴

火熱

鬱

頭養

醫戒

名醫類案卷二

名醫類案卷第二

新都篁南江瓘集

後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈烺敦曾
鮑廷博以文重核

內傷

琇按七情之病皆為內傷茲第以飲食勞倦
當之故所列多龐雜

淳于意治齊丞相舍人奴從朝入宮臣意見之食閨門外望

其色有病氣臣意即告宦者平平好為脉學臣意所臣意

即示之舍人奴病告之曰此傷脾氣也當至春膈塞不通

不能食飲法至夏泄血死琇按脾不統血肝不藏血宦者平即往告相

曰君之舍人奴有病病重死期有日相君曰卿何以知之

曰君朝時入宮君之舍人奴盡食閨門外平與倉公立卽
示平曰病如是者死相卽召舍人奴而謂之曰公奴有病
否舍人曰奴無病身無痛者至春果病至四月泄血死所
以知奴病者脾氣周乘五藏傷部而交故傷脾之色也望
之殺然黃土敗察之如死青之茲木賊衆醫不知以爲大蟲不
知傷脾所以至春死病者胃氣黃黃者土氣土不勝木故
至春死所以至夏死者脉法曰病重而脉順清者曰內關
內關之病人不知其所痛心急然無苦若加以一病死中
春一愈順及一時其所以四月死者診其人時愈順愈順
者人尚肥也奴之病得之流汗數出灸於火而以出見大

風也

齊中郎破石病臣意診其脉告曰肺傷不治當後十日丁亥

溲血死卽後十一日溲血而死破石之病得之墮馬僵石

上琇按跌撲傷肺肺嬌藏也而主氣凡受刑甚者肺葉亦損所以知破石之病者切其

脉得肺陰氣其來散數道至而不一也色又乘之天所以

知其墮馬者切之得番陰脉番陰脉入虛裏乘肺脉肺脉

散者固色變也乘之所以不中期死者師言曰病者安穀

卽過期不安穀則不及期其人嗜黍黍主肺故過期所以

溲血者診脉法曰病養喜陰處者順死喜養陽處者逆死

其人喜自靜不躁又久安坐伏几而寐故血下泄王石韋之死後

所以見血者
以喜居陰處

姚僧坦治梁元帝患心腹病、諸醫皆請用平藥、僧坦曰、脉洪而實、此有宿食、非用大黃、必無瘥理、元帝從之、果下宿食、愈、

沈繹字誠莊、吳郡人、好學篤行、洪武中、其外舅陳翁謫戍蘭州、無子、遂被逮、補軍伍、時肅王疾劇、或稱誠莊善醫、王召令診視、問平日所嗜、知爲乳酪、用濃茶飲數盃、而愈、謂人曰、茶能蕩滌膈中之膩也、王神其術、奏授本府良醫、

羅謙甫治一人年六十有五、至元戊寅夏日、因勞役、飲食不節、又傷冷飲、得疾、醫者皆以爲四時証、治之不愈、逮十日、

羅往治之。診視曰：右手三部脉沉細而微，太陰証也。左手

三部脉微浮而弦，虛陽在表也。大抵陰多而陽少，今所苦

身體沉重。

溼

四肢逆冷。

寒

自利清穀，引衣蓋覆，氣難布息。

懶言語，此脾受寒，溼中氣不足故也。仲景言：下利清穀，急

當救裏，宜四逆湯溫之。內經復有用熱遠熱之戒，口乾但

欲嗽水不欲嚥，早辰身涼而肌生粟，午後煩躁不欲去衣。

昏昏睡而面赤隱隱紅，癰見於皮膚，此表實裏虛故也。亦

見症爲陰盛于內，逼陽于外者。

內虛則外証隨時而變。治

若許學士之治侯輔病是也。中風案以爲病邪入於經，則動無常處，症五

相出見此案見癰，則曰內虛外症隨時而變。詳內外之証，乃飲食勞倦寒傷於脾胃，非四時之証明矣。治病必察其

下

博按內經云治病必察其下謂察其時下之宜也舊刻以下文有標本字遂改下爲本謬矣

今適當

大暑之時而得內寒之証以標本論之時標也病本也用

寒藥則順時而違本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱

傷必當從乎中治中治者溫之是也

寒溼之症又見紅癰看他從乎中治溫以

散之妙亦見看病以日期爲準標本爲憑○此案從乎中

治以溫羅治一人泄脉沉緩而弦捨時從症而用薑附當

因病之輕重緩急而緩急

之不得執成見于我也遂以錢氏白朮散加升麻就本

方加乾葛甘草解其癰少加白朮茯苓以除溼而利小便

人參藿香木香和脾胃進飲食咬咀每服一兩煎服再服

癰退而利止身溫而神出次服異攻散治中湯辛溫之劑

一二服五日得平止藥主人曰病雖少愈勿藥可乎羅曰

藥攻邪也內經曰治病以平爲期邪氣既去強之以藥變

証隨起。不若以飲食調養。待其真氣來復。此不藥而藥。不治而治之理存焉。從之旬日良愈。

博兒赤馬刺年三十餘。因獵得兔。以火炙食。頗多。抵暮至營。

極困倦。渴飲。灌乳斗餘。是夜腹脹如鼓。疼痛悶亂。臥起不

安。欲吐不吐。欲瀉不瀉。

此症不發熱。無外感。

手足無所措。舉家驚惶。

羅診其脉。氣口大二倍於人迎。乃應食傷太陰經之候也。

右手關脉又且有力。蓋燒肉乾燥。因而多食。則致渴飲乾

肉。得灌乳之溼。是以滂滿於腸胃。乃非峻急之劑。則不能

去。遂以備急丸五粒。覺腹中轉矢氣。欲利不利。復投備急

丸五粒。又與無憂散五錢。須臾大吐。又利十餘行。皆物與

清水相合而下約二斗餘腹中空快氣漸調至平旦以薄
粥飲少少與之三日後再以參朮等藥調其中氣七日而
愈此所謂飲食自倍腸胃乃傷者也

一婦人三十餘歲憂思不已飲食失節脾胃有傷面色黎黑
不澤環唇尤甚心懸如飢狀腎虛又不欲食氣短而促大抵

心肺在上行榮衛而光澤於外宜顯而不藏腎肝在下養

筋骨而強於內當隱而不見脾胃在中主傳化精微以灌

四傍冲和而不息其氣一傷則四臟失所憂思不已氣結

而不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢於陽中故黑

色見於面

色黑非
瘀血

又經云脾氣通於口其華在唇今水反

侮土故黑色見於唇此陰陽相反病之逆也上古天真論

云陽明脉衰於上面始焦故知陽之氣不足非助陽明生

發之劑則無以復其色博按原刻脫十四字故用冲和順氣湯作淫熱鬱

火治用升陽之劑妙以葛根一錢五分升麻防風各一錢白芷一錢

黃芪八分人參七分甘草四分芍藥蒼朮各三分以薑棗

煎配方之妙可師可法已午前服取天氣上升之時使人之陽氣易

達也數服而愈此陰出乘陽治法也衛生寶鑑

太常少卿劉叔謙之內李氏中統三年春欲歸寧不得又因

勞役四肢困倦躁熱惡寒時作疼痛不欲食食即嘔吐氣

弱短促怠惰嗜臥醫作傷寒治之解表發汗次日傳變又

以大小柴胡之類治之至十餘日後病愈劇主家云前藥

無效。莫非他病否？醫曰：此傷寒六經傳變，至再經傳盡，當自得汗而愈。翌日，見爪甲微青，黑色足脛至腰如冰冷。目上視而覩，不轉睛，咽嗑不利，小腹冷氣，上衝心而痛，嘔吐不止，氣息欲絕。溫救何疑羅診其脉沉細而微，不見傷寒之証。

無六此乃中氣不足，妄將傷寒治之，發表攻裏，中氣愈損，經証壞，証明矣。乃以辛熱之藥：附子炮去皮，臍乾薑炮，各五錢；草豆蔻炙，甘草各三錢；益智仁、白芍藥、丁香、藿香、白朮各二錢；人參、陳皮、吳茱萸各一錢半；當歸一錢。名曰溫中益氣湯。呿咀一兩，作一服。至夜藥熟而不能進，續續灌下。一口飲至半夜，稍有呻吟之聲，身體漸溫。忽索粥飲，至旦食。

粥兩次。又煎一服投之。至日高衆醫皆至。診之曰。脉生證回矣。越三日不更衣。或欲以脾約丸潤之。羅曰。前證用大辛熱之劑。陽生證回。今若以大黃之劑下之。恐寒不協。轉生他證。衆以爲不然。遂用脾約丸二十九。至夜下利兩行。翌日面色微青。精神困弱。嘔吐復作。羅再以辛熱前藥溫之而愈。內經曰。寒淫於內。治以辛熱。佐以苦甘。溫附子。乾薑。大辛熱。助陽退陰。故以爲君。丁香。藿香。豆蔻。益智。茱萸。辛熱。溫中止吐。用以爲臣。人參。當歸。白朮。陳皮。白芍。炙甘草。苦甘。溫補中益氣。和血脉協力。用以爲佐使也。

真定路總管劉仲美。年踰六旬。宿有脾胃虛寒之証。至元辛

已閏八月初天氣陰寒因官事勞役渴而飲冷夜半自利
兩行平旦羅往診視其脉弦細而微四肢冷手足心寒唇
舌皆有褐色青腹中微痛氣短不思飲食羅曰內經云色
青者肝也肝屬木唇者脾也脾屬土木來剋土故青色見
於唇也舌者心之宮水挾木勢制火凌脾故色青見於舌
也難經云見肝之病則知肝當傳之脾故先實脾土今脾
已受肝之邪矣潔古先師云假令五臟勝各刑已勝補不
勝而瀉其勝重實其不勝微瀉其勝而以黃芪建中湯加
芍藥附子上之且芍藥味酸瀉其肝木微瀉其勝黃芪甘
草甘溫補其脾土是重實其不勝桂附辛熱瀉其寒水又

助陽退陰。飴糖甘溫。補脾之不足。肝苦急急。食甘以緩之。
生薑大棗辛甘大溫。生發脾胃升騰之氣。行其榮衛。又能
緩其急。每服一兩。依法水煎服。再服而愈。

史丞相年近七旬。至元丁卯秋間。因內傷自利。數行。覺肢體
沉重。不思飲食。嗜臥。懶言語。舌不知味。腹痛頭亦痛。而惡
心。醫以通聖散大劑服之。覆以厚衣。遂大汗出。前證不除。
反增劇。易數醫。四月餘不愈。病已久羅診視。得六脉沉細而
微。弦不欲食。食即嘔吐。中氣不調。滯於升降。口舌乾燥。頭
目昏眩。肢體倦怠。足脢冷臥。不欲起。素不飲酒。肢體本瘦。
又因內傷自利。復汗。是重竭津液。脾胃愈虛。不能滋榮。周

身百脉。故使然也。非甘辛大溫之劑。則不能溫養其氣。經云。脾欲緩。急食甘以緩之。又脾不足者。以甘補之。黃芪人參之甘。補脾緩中。故以爲君。形不足者。溫之以氣。當歸辛溫。和血潤燥。木香辛溫。升降滯氣。生薑益智。草豆蔻仁。辛甘大熱。以蕩中寒。理其正氣。白朮炙甘草。陳皮。甘苦溫。乃厚腸胃。麥蘖麴。寬腸胃而和中。神麴辛熱。導滯消食。爲佐使也。名曰參朮調中湯。吹咀一兩。薑三片。煎服之。嘔吐止。飲食進。越三日。前証悉去。左右曰。前証雖去。九日不更衣。如何。羅曰。丞相年高氣弱。旣利且汗。脾胃不足。陽氣虧損。津液不潤也。豈敢以寒涼有毒之劑。下之。仲景曰。大發汗。

後小便數。大便堅。不可用承氣湯。如此雖內結。宜以蜜煎導之。須臾去燥屎二十餘塊。遂覺腹中空快。上下氣調。又以前藥服之。喜飲食。但有所傷。則橘皮枳朮丸消導之。月餘乃平復。丞相曰。病去矣。當服何藥。防其復來。羅曰。但慎言語。節飲食。不可再藥。

許學士治一男子。素嗜酒。因暴風寒。衣薄。遂覺倦怠。不思飲食。半月。至睡後。添發熱。遍身疼。如被杖。微惡寒。天明脉之。六脉浮大。按之豁豁然。左爲甚。許作極虛受風寒治之。人參爲君。黃芪白朮當歸身爲臣。蒼朮甘草陳皮通草乾葛爲佐使。大劑與之。至五貼後。遍身汗如雨。凡三易被得睡。

覺來諸証悉平

滑伯仁治一人病怔忡善忘口澹舌燥多汗四肢疲軟發熱小便白而濁衆醫以內傷不足擬進茸附伯仁診其脉虛大而數曰是由思慮過度厥陽之火爲患耳夫君火以名相火以位相火代君火行事者也相火一擾能爲百病況厥陽乎百端之起皆自心生越人云憂愁思慮則傷心其人平生志大心高所謀不遂抑鬱積久致內傷也然抱薪救火望安奚能遂命服補中益氣湯硃砂安神丸空心則進小坎離丸月餘而安

丹溪治一人臘月因齋素中飢而胃寒作勞遂發熱頭疼與