

增補

萬氏女科

鑄

記書局石印

全一冊

漆園

一
附達生編

萬氏婦人科

王仲芳署

中華民國九年
鑄記書局石印

卷之一 保產良方

調經種玉湯

產前治法計四條

子懸

胎漏

難產

小產治法

治胎動良方

治胎漏良方

又方

佛手散附

保產神效方附

產後治法

又方

治乳腫硬方

小兒開口方

小兒免麻痘方 又稀痘神方

卷之二

立科大概

濟陰通玄賦概論八條

調經章概論五條

不及期而經先行

經過期後行

一月而經再行

數月而經一行

經行或前或後 經後腹痛

經水多少

經水紫色淡色

經閉不行

石痕附

腸覃

崩漏章

崩漏

經血妄行

赤白帶下

白濁白淫白帶辨症

種子章三條

卷之三

確論胎養數條

妊娠惡阻

胎動不安

妊娠漏胎

妊娠傷寒

妊娠中風

妊娠中暑

妊娠中濕

妊娠咳嗽

妊娠瘧疾

妊娠霍亂

妊娠泄瀉

妊娠痢疾

子懸

子煩

子癰

子腫

子氣

子滿

子淋

子鳴

妊娠吞酸

妊娠頭痛

妊娠目鼻咽喉唇口諸病

妊娠瘡毒

雜症一條

八月章

難產七條

催生四法

臨產須知

卷之四

產後章

難產

救逆產

救橫產

救側產

救礙產

盤腸生

產子氣絕不啼

子死腹中

胎衣不下

產後血暈

產後子宮脫出

產後乍見鬼神

產後心痛

產後腹脹滿悶嘔吐惡心

產後口乾痞悶

產後咳嗽

產後喉中氣急喘促

產後腰疼

產後遍身疼痛

產後腹痛

產後兒枕痛

產後頭痛

產後發熱

產後乍寒乍熱似瘧

產後瘧疾

產後渴

產後汗出不止變症

產後中風

產後傷寒

產後尿血

產後小便數及遺尿不禁

產後咳嗽

產後浮腫

產後惡露不止

產後惡露不下

產後眼見黑花昏眩

產後脇痛

產後不語

產後暴崩

產後癰塊

產後玉戶不斂

產後乳汁不通

產後霍亂吐瀉

產後泄瀉

產後痢疾

回生丹并論終

調經種玉湯

當歸身

錢八

川芎

錢四

熟地

兩

香附

六錢

白芍

六錢

茯苓

錢四

陳皮

錢三

吳茱萸

錢三

丹皮

錢三

胡索

錢三

若過期而經水色淡者血虛有寒也加官桂炮姜熟艾各一錢若先期三五日色紫者血虛有熱也加條芩三錢判四貼生姜三片水碗半煎至一碗空心溫服渣再煎臨卧時服經至之日服起一日一服藥完經止即當入房必成孕矣縱未成孕經當對期俟經來再服最效歌曰歸芍熟地香附芍藥萸苓陳丹皮索

產前治法

產前之症俱照各門治之惟有子懸胎漏胎動最難更可畏者是橫生倒產不可不急講也子懸之症乃胎熱而子不安身欲起立於胞中故若懸起之象其實非子能懸掛也若作氣盛下之立死矣方用人參

錢一

白朮

錢五

茯苓

錢二

白芍

錢五

黃芩

錢三

杜仲

錢二

熟地

兩

生地

錢三

歸身

錢二

此方全是利腰臍之聖藥少加黃芩清之則胎得寒子自定況方中滋補有餘而寒涼不足蓋胎繫於腰臍之間而胞又結於任冲之間今藥皆直入於內經之中則深根固蒂子即欲動而不能況又有清子之藥有不泰然於下者乎漏胎乃氣血不足之故急宜以峻補之方用人參

錢二

白朮

錢五

茯苓

錢二

白芍

錢五

黃芩

錢三

杜仲

錢二

此方不寒不熱安胎之聖藥也凡有胎不安者此方安之神效胎之動也由於男女之顛狂今

求

錢五

杜仲

錢二

枸杞

錢一

山藥

錢二

歸身

錢一

茯苓

錢一

熟地

錢五

麥冬

錢二

北味

錢五

炙肉

錢二

甘草

錢一

水煎服

此方不寒不熱安胎之聖藥也凡有胎不安者此方安之神效胎之動也由於男女之顛狂今

求

錢五

杜仲

錢二

枸杞

錢一

山藥

錢二

歸身

錢一

茯苓

補其氣血自然鎮定又何至漏胎哉 胎動即漏胎之兆亦以此方治之無不神效
難產如橫生倒產此死亡頃刻也若無急救之法何以成醫之聖然而胎之不順由於氣血之
虧氣血既虧子亦無力往往不能轉順頭遂至先以手出或先腳下矣倘手足先出急以針刺
兒之手足則必驚而縮入急用 人參兩一歸身兩三川芎兩二紅花錢三速灌之少頃則兒頭直而到
門矣倘久之不順再將前藥服之不可止也若兒頭既已到門久而不下此交骨不開之故速
用 柞木枝兩一歸身兩二川芎兩一人參兩一煎湯服 少頃必然一聲响亮兒即生矣倘兒頭不下
萬萬不可用柞木枝蓋此味專開交骨兒未回頭而產門先開亦死之道故必須兒頭到門而
後可用此方也此產前之法必當熟悉於胸中而後臨產不致倉皇

小產治法

小產雖無大產之虛而氣血亦大傷矣宜急補之則日後坐胎不致再有崩漏方用 人參錢五

茯苓錢三熟地兩一杜仲錢二炮薑分五白朮錢五水煎服 此方乃補氣補血之聖方胞動而下必損

帶脉補其氣血則帶脉損處可以重生他日受孕不致有再損之虞也 又治胎動方 白朮

兩一熟地兩一水煎服 此方妙在用白朮以利腰膝用熟地以固根本藥品少而功用專所以

取效神也此方可以救貧之人名黑白安胎散 又治胎漏方 白朮錢五熟地兩一三七根錢三

水煎服 此方妙在三七根乃止血神品故奏效如响名止漏絕神丹

治產難方

難產婦人之常但難產非兒之橫逆實母之氣衰以致兒身不能回轉於是手先出而足先墮矣但此等生法口中念

無上至聖化生佛百遍兒之手足即便縮入急用人參兩附子錢一歸身兩二川芎錢五黃芪兩一煎湯與之兒身即順立刻產下蓋參芪補氣歸芎補血氣血既足兒易舒展何必服催生之丸哉倘不補氣血而用催生墮胎之藥必致轉利轉虛不殺母即殺子矣

又治產難方

如胞漿已破血來許久而不生者皆因血氣乾枯所致急宜用歸身兩四川芎兩一益母草兩二人

參兩一濃煎湯頻頻與之自無不下如貧不能得許多參即數錢亦可或重用黃芪代之亦可

如用黃芪三四兩再加附子一錢橫生逆產俱可治

佛手散附治六七個月後因事跌磕傷胎或子死腹中疼痛不已口噤昏閉或心腹飽滿血上

衝心者服之生胎即安死胎即下又治橫生倒產及產後腹痛發熱頭痛遂敗血生新血能

除諸疾當歸錢五川芎錢三水七分酒三分同煎七分如橫生倒產子死腹中者加黑馬料

豆一合炒焦熟乘熱淬入水中加童便一半煎服少刻再服加味芎歸湯附百試百驗萬

叫萬靈真神方也此方必兒頭當歸兩一川芎錢七龜板醋炙研末婦人頭髮如雞蛋大瓦上焙存性水二

碗煎一碗服如人行五里即生死胎亦下薛云交骨不開者陰氣虛也用此方如神

又云上舍某之妻產門不開兩日未生服此方一劑即時而產上舍傳此方用之者無不驗

保產神效方附未產能安臨產能催偶傷胎氣腰疼腹痛甚至見紅不止勢欲小產危急之際

一服即愈再服全安臨產時交骨不開橫生逆產或子在腹中命在垂危服之奇效全當

歸酒洗錢五分真川芎錢五分紫厚朴姜汁炒七分兔絲子酒炮錢半川貝母去心淨一錢枳殼麸皮炒六分川羌

活分六荆芥穗分八黃芪蜜汁八分蘄艾醋五分甘草炙五分白芍藥酒炒一錢生薑三片水二鍾煎八

分渣水一鍾煎六分產前空心預服二劑臨產隨時熱服此乃仙授奇方慎勿以庸醫加減

其分兩

產後治法

產後之病不可枚舉總以補氣補血為主產後往往血暈頭痛身熱腹疼或手足逆而轉筋或心

脇滿而嘔吐風邪入而變陰寒或涼氣侵而直為厥逆皆死亡定於旦夕而危急亂於須臾也

此時若作外症治之藥下喉即變症莫測矣可不慎歟方用人參錢五白朮錢五熟地兩一歸身兩二川

芎一兩荆芥末二錢炒黑色

此方為主有風感之加柴胡八分有寒入之加附子一錢肉桂一錢其餘諸症俱不可亂加以此

方服之無不神效但可或減分兩而不可去取藥味蓋產婦一身之血盡行崩下皮膚腠理

如紙之薄邪原易入然亦易出也故於大劑補正之中略加祛邪之藥少粘氣味邪則走出於

軀壳之外焉可照平常無病之人慮其邪之難散而重用逐邪之方也方中妙在純是補氣補

血之品全不顧邪盡在補正正氣既盛邪氣自遜况方中原有荊芥之妙劑不特引氣血各歸

經絡亦能引邪氣各出皮毛此方之所以真奇妙也惟有兒枕痛手按之少痛者宜加入山查十粒桃仁五個可也一劑即去之餘藥萬不可輕用增入也或問熟地三日內可用否曰一日何嘗不可用也

產後聖方

人參

錢三兩

歸身

錢五兩

荆芥末

錢一炒黑

益母草

錢二

水煎服

有風加柴胡五分有寒加肉桂一

錢血不淨

加山查十粒

血暈加炮姜五分

鼻中衄血

加麥冬二錢

夜熱加地骨皮一錢

有食加

山查五粒

谷芽一錢

有痰加白芥子五分

餘斷斷不可侵入

此方純補氣血而不治表所以為

妙屢治產後無不神效

又產後聖方

產後最宜服參但貧者不易得今酌定一方代之

黃芪

錢八蜜炙

白朮

錢三

歸身

錢三

茯苓

錢一

熟地

錢四

炙草

錢一

益母草

錢二

淮膝

錢一

炮姜

錢一

如自汗眼花視小為大是將脫也宜服參附湯人參一兩附子一錢或二錢三錢參不可得則

前方芪可加至二兩更加附子一錢

臨產宜服獨參湯參不可得則前方去牛膝炮姜加滑石末二錢產自易此方屆月即可服

治乳腫硬方

產後諸症悉屬虛惟乳腫硬發熱則暫宜疏滯訂方如左

漏蘆 瓜萼 橘葉 甘草各一錢 青皮 通草各八分 蒲公英 金銀花各二錢 二劑即消不可多服

小兒開口良方

穿山甲片一錢 防風二錢 甘草五分 煎汁極濃 磨川山甲二三匙開口 餘搽乳頭上 二日後小兒大便出 黑屎為驗 可免終身一切驚風 屢試屢驗 小兒開口最忌金黑黃連 切不可用

小兒免麻疹方

俟本兒臍帶落下 以新瓦二片 上下各一片 將臍帶夾在中間 焙成炭存性 務宜勤視 總以烟盡為度 取出 用碗覆地上 去火氣 逾時取起 戩秤 如臍炭重一分 外用辰砂五厘 同臍炭放乳钵內 研成細末 另用當歸一錢 防風一錢 煎流水二三匙 調前末 與小兒服盡為度 三日後小兒通身發出 沸瘡 樣脫去皮膚 即驗 終身可免麻疹 縱出必稀

又稀痘神驗方

大麻子去壳取肉 揀肥白者三十六粒 硃砂一錢 另研極細末 真麝香五厘 右將硃砂麝香二味共為細末 然後

大麻子三味共研一處 極細成膏子 于五月五日午時 搽小兒頭頂上 前心窩後背心 兩手心

兩足心 兩膀灣並兩脇窩 兩腿灣 共一十三處 俱要搽到 勿使藥有餘剩 如錢大 搽後不可洗

動 待其自落 本年搽過一次 出痘數粒 次年端節午時 再搽一次 出痘一二粒 再次年端陽午

時 又搽一次 痘永不出 如未過一週 小兒于七月七日九月九日 亦以前法搽之 更妙 傳方之

家已十六代不出痘 有益無損 誠寶赤之靈丹也 宜留心預備之

立科大概

夫男女者均稟天地之氣以生。有生之後。男則氣血俱足。女則氣有餘而血不足也。至於受病。外感內傷之症。未嘗不同。但女則別有調經胎前產後之治。此所以更立一科也。調經專以理氣補心脾為主。胎前專以清熱為主。產後專以大補氣血行滯為主。數語女科要訣此婦人科調理之大略云。

濟陰通玄賦 概論八條

陰陽異質。男女殊科。特立專門之證治。以救在室之沈疴。因其血之虧也。故調之必使流通。因其氣之盈也。故抑之。不使鬱遏。體本嬌柔。性最偏頗。肥白者多痰。瘦黑者多大。胃太過者氣結。養不足者血涸。專寵愛者。治合異乎孤兒。飲膏粱者。察莫同於藜藿。月事時下。如潮汐之應期。血海當滿。似江漢之流波。謂之無病。可以勿藥。或不及期而先來。氣有餘而血易虧。或過期而後來。氣不足而血本弱。花氣淡淡。由血室之水虛。桃浪紫色。被胞戶之火灼。經未行而腹痛。氣滯血止而可調。經已行而腹痛。和氣養血而勿錯。或一月再行。邪火迫而氣血不藏。或數月而一行。元氣虧而生化不多。皆是損真之症。貴在調理之和。滿而不洩。為經閉。為血枯。為癥瘕。洩而不滿。為崩中。為帶下。為漏濁。常滿者惡。其中滿常洩者。慮其氣脫。脉惟喜於亢澹。診切忌乎洪數。或隱忍而病盛。愚婦自速其亡。妄攻補而病增。庸醫

反助其虐。

經候既調。男女可合。不出三日之期。宜踐應候之約。乾闥坤闔。陽唱陰和。滴祕露於花枝兮。玉粒可結。鼓春風於桃浪兮。金鱗自躍。陰包陽兮。則丹桂發芽。陽包陰兮。則紅蓮吐萼。天地之大義。生民之本始。勿謂蕪蕘之言。作詼諧而笑謔。

震風之喜有徵。妊娠之脉必確。尺數闕滑而寸盛。陽搏陰別而雀躍。精神雖倦兮。桃腮更研。飲食粗惡兮。天癸不落。無妨惡阻之害。所慎漏胎之濁。熱常要清。脾不可弱。熱若盛兮。而胎動不安。脾若虛兮。而胎危易墮。惟以安胎為本。其餘雜症。治為末。斯先哲之格言。宜後人之守約。子懸急痛而勿疑。子癰卒倒而可愕。子滿胎肥而氣壅。子瘡脾虛而氣弱。子煩子淋兮。胎熱所為。子腫子氣兮。胎水所作。子嗽子痢兮。病轉劇而胎損。傷寒傷食兮。病苦多而成惡。常慘常笑兮。肺氣結而非崇。暴啞不語兮。心血虛而勿藥。胎若肥而瘦。胎速進。脉怕微而診脉休錯。懷胎之後。禁忌不可少犯。臨產之前。戒慎乃為要約。預備藥物。審擇穩婆。禁諱去疑兮。恐產母之心動。居安守靜兮。令產母之氣和。兒身未轉兮。坐草不宜太早。胎漿既破兮。使力未可太過。或逆或橫兮。在穩婆之妙手。若遲若留兮。係催生之聖藥。

醫藥之係匪輕。母子之命所託。差之毫釐。甚於水火。胎衣未下兮。取之有道。惡露未下兮。去之勿過。血迷血暈兮。生死存乎呼吸。血脹血痛兮。攻擊戒乎揮霍。但以補虛為主。莫因他病而訛藥。喜甘溫兮。切忌苦寒。脉宜和緩兮。最嫌洪數。

惡阻各歸於臟腑諸病似乎障魔頭旋而當見黑花兮乙木之病聲啞而乍見鬼神兮丁火之
疴。臍下痛而或淋或秘兮。溝瀆塞於汚淤。腹中痛而或脹或腫兮。倉廩積乎陳莩。息逆而喘嗽
不甯兮。因犯素天之氣。腰疼而俛仰不利兮。乃衝元海之波。煩熱兮責其血去而陰虛。羸怯兮
知其辱勞而氣弱。能詳察夫症候。斯可議乎方藥。

經候不調兮。烏難可投。天癸或阻兮。蒼莎宜托。地黃補腎兼行。參朮養脾莫卻。三補涼血兮。專
治崩中之藥。補中煖宮兮。能固帶下之脫。安胎胡連兮。在妊娠為最宜。瘦胎達生兮。視形症而
休錯。黑神去惡露而可取。胎衣十全補虛羸而能除陰火。臨病審症兮。請觀設問之辭。舉一該
百兮。勿訝立言之約。吐露靈府之珠璣。掣開醫門之鎖鑰。

調經章 概論五條

謹按經云。女子二七而天癸至。衝任滿。盛月事以時下。乃有期候。得其常候者為無病。不可妄
投調經之劑。苟或不及期而經先行者。或過期而經後行者。或一月而經再行者。或數月而經
一行者。或經閉不行者。或崩者。或漏下者。此皆失其常候。不可不調也。大抵調治之法。熱則清
之。冷則溫之。虛則補之。滯則行之。滑則固之。下陷則舉之。對症施治。以平為期。如芩連梔柏。清
經之藥也。丁桂姜附。溫煖之藥也。參朮歸朮。補虛之藥也。川芎香附。青皮元胡。行滯之藥也。牡
蠣赤石脂。棕櫚灰。反柏葉。固精之藥也。升麻柴胡。荆芥白芷。升舉之藥也。隨其症而用之。鮮有
不效者矣。

婦人經候不調有三。一曰脾虛。二曰衝任損傷。三曰脂痰凝塞。治病之工不可不審。

脾胃經弱者。經曰。二陽之病發於心脾。女子經病。夫二陽者。陽之海。血氣之母也。惟憂愁思慮則傷心。心氣受傷。脾氣失養。鬱結不通。腐化不行。胃雖能受。而所謂長養灌溉流行者。皆失其令矣。故脾胃虛弱。飲食減少。氣日漸耗。血日漸少。斯有血枯血閉。及血少色淡。過期始行。數月一行之病。

衝任損傷者。經曰。氣以吹之。血以濡之。故氣行則血行。氣止則血止也。女子之性執拗偏急。忿怒妒忌。以傷肝氣。肝為血海。衝任之系。衝任失守。血氣妄行也。又褚氏曰。女子血未行而強合。以動其血。則他日有難名之疾。故女未及二七天癸之期。而男子強與之合。或於月事適未斷之時。而男子縱慾不已。衝任內傷。血海不固。由斯二者。為崩為漏。有一月再行。不及期而行者矣。

脂痰凝塞者。蓋婦女之身。內而腸胃開通。無所阻塞。外而經隧流利。無所礙滯。則血氣和暢。經水應期。惟彼肥碩者。膏脂充滿。元室之戶不開。挾痰者。痰涎壅滯。血海之波不流。故有過期而經始行。或數月而經一行。及為濁為帶。為經閉。為無子之病。

不及期而經先行

如德性溫和。素無他疾者。責其血盛。且有熱也用。赤芍 生地 知母 麥冬 地骨皮

錢歸身 川芎 各七 甘草 五 水煎空心服

如性急躁多怒多妒者責其氣血俱熱且有鬱也用 歸身 川芎 白芍錢各一 生地錢七 條苓

炒香附一錢 生草五錢 水煎服

如形瘦素無他疾者責其血熱也用四物加芩連湯 四物內加芩連俱炒各一錢 生草五錢 水煎食

前服兼服三補丸和之四物內用赤芍 四物 歸身 川芎 白芍此用赤芍 生地 三補丸專治血熱 黃芩

黃連 黃柏俱炒各等分 蜜丸白湯下

如形瘦素多疾且熱者責其衝任內傷也用 歸身 白芍 熟地 人參 知母 麥冬各一

錢川芎七分 炙草五分 姜棗引水煎食前服更宜常服地黃丸 地黃丸 治女子衝任損傷及

腎虛血枯血少血閉之症

熟地八兩 山藥四兩 山茱萸去核取肉四兩 白茯苓三兩 牡丹皮去骨澤瀉三兩 用蜜為丸空心湯下 如曾誤

服辛熱暖宮之藥者責其衝任伏火也用 歸身錢一 川芎七分 赤芍 生地錢各一 黃柏炒 知母

木通錢各一 生草五錢 水煎食前服更服三補丸和之

如形肥多痰多鬱者責其血虛氣熱也用 歸身 川芎 生地黄各七錢 陳皮去白 半夏滾水炮各五分

白茯苓 生草各五錢 條苓炒 香附便炒 黃連炒各一錢 姜引水煎服

經過期後行

如德性溫和素無疾者責其血虛少也八物湯主之 川芎 白芍 人參 茯苓 歸身 生

草 生地 白朮各等分 姜棗引水煎食後服

如性急躁多怒多妒者責其氣逆血少八物加香附湯主之
常服蒼莎丸以調之
加香附便青皮等分水煎服兼

蒼莎丸和中開鬱水浸香附便浸一日條芩酒炒共為末湯浸蒸餅為丸白湯下

如形瘦素無他疾者責其氣血俱不足也用十全大補湯主之此藥治氣血兩虛脾胃不足

人參 白朮土炒茯苓 甘草蜜炙當歸 川芎酒炒白芍酒炒熟地 黃芪蜜炙各一錢肉桂分五姜棗引

水煎服

如形瘦食少責其脾胃衰弱氣血虛少也用異功散加當歸川芎湯主之此湯專補脾胃進飲

食養氣血 人參 白朮 白茯苓 炙草 陳皮 歸身 川芎錢各一姜棗引兼服地黃丸

如肥人及飲食過多之人責其溼痰壅滯軀肢迫塞也用六君子加歸芎湯主之 人參 白

朮 茯苓 炙草 陳皮 半夏 歸身 川芎 香附錢各一姜引兼服蒼莎丸

如素多痰者責其脾胃虛損氣血失養也用參朮大補丸即參苓白朮散加歸芎地黃丸 人

參錢五 白朮 白茯苓 陳皮 蓮肉 歸身錢各七炙草錢三山藥兩一砂仁 川芎 石菖蒲

錢各五 共末薄荷包米煮飯為丸米飲下

一月而經再行

如性急多怒氣者責其傷肝以動衝任之脉用四物加柴胡湯主之 歸身 川芎 白芍

生地 柴胡 人參 條芩 生草 黃連煎服更宜常服補陰丸以瀉衝任之火