


周氏醫學啟書



癆療門題辭

慎柔師所謂自下而上者勞症多係水枯火燥故特舉其大凡而內有命門真陽衰者未嘗不仍用壯火之法惟真陽衰故虛火旺其源未嘗不合自在按脈識病者臨時之善別而讀書明理者平日之善會耳至險怪之症於癆療迺備既爲一門之顓臾不可不竟其詳雖世人不恆犯而適有犯者豈可無法以待之此先聖賢已創於前而慎柔之婆心固不厭繁委次第以備全覽夫著書之難古今通患千慮一失孰能無之在學者諒其創始之苦心而踵事增華自所望於高明君子耳予與顧子特仍其舊聞稍加刪潤

未敢以意爲補竄也

慎柔五書卷四

石 震瑞章父訂正

瘦樵程承璫校本

顧元交勇尹父編次

周學海側之評注

癆瘵第四

脈法

癆瘵脈。酉戌時洪盛。寅卯時細弱者。陽氣虛陷也。忌服苦寒。損其陽氣。當以助陽之劑。復其寅卯之位。微加瀉陰火而已。若服寒涼。證雖大減。脈反加數者。陽鬱也。朝暮異脈。而朝細暮洪者。振陽分之陰。溫陰分之陽。滋陰分之陰。朝洪暮細者。收陽分之陰。溫陰分之陽。右脈大。用保元湯。左脈大。用六味湯。不減。若燥者。以瓜蒌生甘草散潤之。

久病咳嗽氣喘。若脈洪數。不可即用補藥。如服之。虛火一退。多令人痿倦不起。以上下文意。測之。補藥二字。當作瀉火。此證本不宜瀉火。肺體已痿。一瀉不返。治法不外宣陽納陰。陽鬱由於溼痺。陰浮由於血虛及燥熱。宜以龜板牡蠣清滋。又有下寒上衝而然者。是實邪。須先用獨參湯以接其氣。數日後。數也以法逐之。化之。

總論

夫癆者。勞也。非一端可盡。或苦心竭。其心脾之神志。或酒色竭。其肝腎之陰精。或久痢久瘧。傷寒傷暑諸症。治之不當。損其氣血。傷其脾胃。五藏乾枯。而火起。以致發熱。則金受剋。大腸先結燥。而水之源先涸矣。宜見脈見症。用藥果當。無不愈者。若初熱未甚。繼以治法之非。久

之卽成蒸病。蒸病者如甑之蒸熱之極也。然使初病元氣尙強。脈氣尙旺。照古方用五蒸湯加減二十三蒸之法。亦無不驗。治蒸法服之。病稍退。又當察症清心。參用癆病治方。不可造次。蒸病或十日半月熱極。致骨中血凝。便化爲蟲。張仲景立祛血之法。不使凝血化蟲。麤麤丸百勞丸是也。倘治之不得其序。不能祛血。血化爲蟲。是時病人脈氣尙充。精神尙旺。猶可採也。如聲啞喉痛。寒熱大作。脈細而數。不思飲食。精神視聽俱不能支。皆屬不治。又有火鬱痰凝。氣滯咳嗽。發熱氣喘。葛先生保和湯保眞湯次序用之。火散痰開。熱退。總歸八珍湯調理。又有吐紅咳嗽。脈雖數有神。不致于蒸極作蟲者。脈

洪脈數。虛虛實實。通變在乎心靈矣。

骨蒸由氣虛不能化血。血乾則火自沸騰。內如針刺。骨熱煩疼。或五心俱熱。或兩肋如火。或子午相應。或晝微惡寒。而夜反大熱。雖腎經所主。傳變不常。蒸上則喘咳。痰血舌黑耳鳴目眩等症。蒸下則見夢遺淋濁泄瀉腰疼腳疼等症。蒸中則見腹脹脇痛四肢倦怠等症。不問陰病陽病日久。皆能傳變。男子自腎傳心肺肝脾。女子自心傳肺肝脾腎。五藏復傳六府而死矣。有始終只傳一經者。有事著心腎而不傳者。大要以脈爲證驗。凡氣血勞倦不運。則凝滯疎漏。邪氣得以相乘。又飲食勞倦所傷。則上焦不行。下脘不通。熱極蒸胸中。而內熱。

生矣。凡頸上有核。腸中有塊。或當臍冰冷。或無力言動。皆痰涎結聚。氣血凝滯之所致。故以開關啓胃爲先。蓋關脈閉。則氣血乾竭。胃氣弱。則藥無由行。但陽虛不可偏用辛香丁附之類。陰虛不可用苦寒。古方有開關定胃散。今亦難用。竊其意推之。

蟲爲氣血凝滯。瘀血化成。但平補氣血爲主。加以烏梅。青蒿。硃砂之類。而蟲自亡矣。紫河車丹。紫河車丸。青蒿膏。蚘蛤散。選用惟度其虛實爲主。

凡體虛者。宜先用補法。補其元氣。然後用王道之藥。佐之以殺蟲之劑。如化蟲丸。史君子丸之類。或追蟲後。而繼以溫補。亦可。不然。則蟲去而元氣亦散。

傳屍之說不必深泥。歷觀癆瘵皆因酒色之類。損傷心血。以致虛火妄動。醫者不分陰陽用藥。病者不思疾由自取。往往歸咎前因。甚者疑及房室器皿墳墓。及冤業飛尸。遞相傳注。古人云。癆瘵三十六種。惟陰德可以斷之。不幸患此疾者。或入山林。或居靜室。清心戒慾。專意保養。庶乎病可除根。不然。卽服藥不效。

癆蟲須分五臟。常居肺間。正所謂膏之上。盲之下。針之不得。藥之不行。只宜早灸膏盲四花爲佳。若蝕肺系。則咯血吐痰聲嘶。思食無厭。病患至此。未易療治。當參究古法九蟲及一十八種蟲名之異。并紫庭取蟲諸法。蠶熱行陽二十五度。大抵柴胡飲子。夜熱行陰二十五

反四順飲子。平旦發熱。熱在行陽之分。肺氣主之。故用
白虎湯。以瀉氣中之火。日晡潮熱。熱在行陰之分。腎氣
主之。故用地骨皮散。以瀉血中之火。

肝症發熱。肉下骨上。寅卯尤甚。瀉青丸。人中白散。心症
發熱。在血脈。日中則甚。單瀉心湯。導赤散。硃砂安神丸。
脾症發熱。在肌肉。遇夜尤甚。瀉黃散。三白湯。肺症發熱。
在皮毛。日西則甚。瀉白散。甚者涼隔散。腎症發熱。在骨。
亥子尤甚。兩手足心如火。滋腎丸。

尸注一症。予嘗治之。先癸亥夜二更。六神皆聚之時。灸
腰眼穴七壯。然後用藥。倘不能待。先用藥亦可。注病亦
似勞症。但兩足無力。行則痿疲是也。其治法六脈洪數。

八物湯。脾肺不足。補中益氣湯。睡不穩。歸脾湯。不思食。
六君子湯。隨症推類。但煎劑中。須加忍冬葉三錢同煎。
本草以其葉能治尸注也。

凡治勞症。或男或婦。若淫火不退者。雖治不治。

骨蒸勞

夫骨蒸勞者。由於積熱附于骨而名也。亦曰傳尸。殭殭。
復連無辜。其名不一。此病皆由肺胃虧損所致。其形羸。
瘦。泄痢。肢體無力。傳於腎。則盜汗不止。腰膝痛。夢鬼交。
侵。小便赤黃。傳於心。則心神怯悸。喜怒不時。頰唇赤色。
乍熱乍寒。傳於肺。則胸滿短氣。咳嗽吐痰。皮膚甲錯。傳。
於肝。則兩目昏暗。脇下妨痛。閉戶忿怒。五藏既病。則難。

治療立齋云。前症多因經行胎產。或飲食七情而傷脾胃之所致。又或病後失於調攝而成也。

東垣云。發熱之症。肺熱者輕手乃得。微按全無。日西尤甚。其證咳嗽寒熱。輕者用瀉白散。重者涼膈散。白虎湯。地骨皮散。心熱者微按之。皮膚之下。肌肉之上。在血脈也。日中大甚。其症心煩心痛。掌中熱而噦。用黃連瀉心湯導赤散。硃砂安神丸。脾熱者輕手捫之不熱。重手按至筋骨又不熱。不輕不重在輕重之間。在肌肉也。遇夜尤甚。其症怠惰嗜臥。四肢不收。無氣以動。用瀉黃散。肝熱者按之。肌肉之下。至骨之上。寅卯時爲甚。其症四肢滿悶。便難轉筋。多怒多驚。筋痿不能起於床。用瀉青柴

胡湯飲。腎熱者。按至骨分。其熱蒸手。其症骨酥如蟲蝕。困熱不能起於牀。用滋陰丸。此治實熱之法也。蒸無實熱。即鬱

極化實。亦宜宣清。滋化并用。諸方未可專恃。

薛立齋云。肺經虛熱者。用人參補肺湯。脾虛不能生肺者。用六君子湯。脾熱移於肺者。用三黃丸。心經虛熱者。用補心湯。命門火衰不能生土者。用八味丸。肝虛不能生心者。用補肝散。腎剋心者。用附子理中湯。脾經虛熱者。用人參黃芪散。土剋水者。用承氣湯。腎虛不能培肝者。俱用六味丸。

血風勞

風言燥也。血虛氣無所維。陰虛陽無所附。化爲燥火。走注於經脈之間。上下無常。忽

寒忽熱。刺痛昏厥。而成風象。

血風勞症。因氣血素虛。或產後勞傷。外邪所乘。或內有宿冷。以致腹中疼痛。四肢酸倦。發熱自汗。及婦人月水不調。面黃肌瘦。當調肝脾氣血爲主。

東垣云。喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故因熱懶言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安靜存養。以甘寒瀉其熱氣。以酸味收其散氣。以甘溫補其中氣。經言勞者溫之。損者溫之。要略云。平人脈大爲勞。以黃芪建中湯治之。

冷勞

此血虛而痰水漬於筋骨之間也。痰盛則冷。亦有寒淫所傷者。血虛甚。卽見拘攣轉筋。

冷勞者。氣血不足。臟腑虛寒。以致臍下冷痛。手足時寒。

婦人月水失常。飲食不消。或時嘔吐。惡寒發熱。骨節酸疼。肌膚羸瘦。面色痿黃也。

立齋曰。前證有內外真寒。有內外真熱。亦有內真熱而外假寒。有內真寒而外假熱。若飲食難化。大便不實。腸鳴腰痛。飲食畏寒。手足逆冷。面黃嘔吐。惡見風寒。此內外真寒之症也。宜用附子理中湯。以回陽。八味地黃丸。以壯火。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。飲食喜冷。手足煩熱。面赤嘔吐。不畏風寒。此內外真熱之症也。宜用黃連解毒湯。以滋陰。六味丸。以壯水。若飲食如常。大便堅實。胸腹痞脹。而飲食喜寒。手足逆冷。面黃嘔吐。畏見風寒。此內真熱而外假寒也。亦用解毒湯。六味丸。而宜。

於熱服。若飲食少思。大便不實。吞酸噯氣。而手足煩熱。面赤嘔吐。不畏風寒。此內真寒而外虛熱也。亦用附子理中及八味丸。而不妨溫飲。經曰。益火之源。以消陰翳。壯水之主。以制陽光。使不知真水火之不足。泛以寒熱藥投之。則舊病不去。新病復生矣。火之源者。陽氣之根。卽心是也。水之主者。陰氣之根。卽腎是也。非謂火爲心。原爲肝。水爲腎。主爲肺也。或者亦以命門爲火原。未爲非是。故用八味丸以益命門耳。

熱勞

此津液不足。而血滯於經脈之間也。血盛則熱。亦有風暑內灼者。其證兼見昏厥。

熱勞由心肺壅熱。傷於氣血。以致心神煩躁。頰赤頭疼。眼澁唇乾。口舌生瘡。神思困倦。四肢壯熱。飲食無味。肢

體酸痛。怔忡盜汗。肌膚作疼。或寒熱往來。當審其所因。調補氣血。其症自減。

立齋云。前症乃壯火食氣。煎熬真陰所致也。王太僕云。如大寒而甚。熱之不熱。是無火也。當治其心。大熱而甚。寒之不寒。是無水也。當助其腎。心盛則生熱。腎盛則生寒。然心虛則熱收於內。腎虛則虛寒動於中。竊謂前症。若肝脾血虛。四物參朮。肝脾鬱熱。小柴胡合四物。脾胃氣虛。補中益氣湯。肝經血虛。加味逍遙散。肝經風熱。小柴胡湯。心經血虛。加味四物湯。午前熱。屬氣分清心蓮子飲。午後熱。屬血分。四物參朮丹皮。熱從左邊起。肝火也。實則四物龍胆山梔。虛則四物參朮黃芪。熱從臍下。