

臨證指南醫案目

卷九

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室

臨證指南醫案卷九

許關李天瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

調經

愁鬱氣血滯

張九經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

鬱則有火此味不宜

川芎

當歸

肉桂

生艾

小茴

有香附此不必用

脈數者不宜用桂枝建中湯為脈遲而設仲景有明改

後期鬱傷久嗽肺氣虛

茯苓 生香附 南山查 益母膏丸

姚二久嗽背寒晨汗右臥咳甚經事日遲脈如數而虛穀

減不欲食此情志鬱傷此症難治延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草

南棗 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火也虛則不可以清寒況穀減不欲食中氣之餒已甚可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣

肝犯胃

而桂枝白芍。非斂陰和血之妙品乎。

秦一氣衝心痛嘔涎氣墜少腹為瀉經來後期其色或淡

或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治。

川連

小茴

川棟子

歸尾

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

脾鬱傷肝

華二

三

鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血況春深泄氣之候必

佐益氣之屬方為合法

歸脾湯

又

向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少

婦人全以血爲
主治法亦當以
血爲事

處處用柴胡而
近日自附天土
之門者云天土
終身不用柴胡
豈非夢境

腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆
肝木拂逆甚則爲厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動
極之徵爲肝用太過宜制其用前此芪朮守補不可用
矣安胃理中丸去黃柏細辛

錢脈瀆腕悶減食經水來遲腹痛墜

柴胡

炒白芍

黃芩

鬱金

香附

茯苓

蘇梗

神麴

又諸恙未減腹但痛不墜逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許八經閉寒熱便澹腹痛加味逍遙散去山梔

血絡鬱
熱腹痛

奇脈虛
寒滯

某 血虛內熱。經不至。加味逍遙散去朮。

某 經遲腹痛。風疹絡血不寧。久鬱成熱。法當通利。

涼膈去芒硝加丹皮赤芍。

孫二 奇脈下損。經遲腹痛。先用當歸建中湯。續商八脈治。

法 歸建中湯

又 久嗽遇勞寒熱。歸芪建中去薑。

謝三 能食不運。痼泄經事愆期。少腹中乾。涸而痛。下焦麻。

痺衝心嘔逆。腹鳴心辣。八脈奇經交病。

人參 茯苓 艾葉 製香附

淡菴蓉 淡骨脂 肉桂 當歸

鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

王三脈右緩左瀋。經水色淡。後期嘔吐痰水。食物畢。如三載餘不孕。此久鬱凝痰滯氣。務宜宣通。從陽明厥陰立方。

半夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山查肉

薑汁法丸

又

三月中用辛溫宣鬱方。痰瘀自下。胸次寬。嘔逆緩。今

喜暖食惡寒。經遲至五十餘日。來必色淡且少。議用溫

養衝任栽培生氣方法。八珍去朮草地加小茴肉桂

蘼艾香附紫石英河車膠丸

肝腎虛

朱二經水一月兩至或幾月不來五年來竝不孕育下焦

肢體常冷是衝任脈損無有貯蓄煖益腎肝主之

人參

河車膠

熟地

砂仁製

歸身

白芍

川芎

香附

茯神

肉桂

艾炭

小茴

紫石英

益母膏丸

衝脈肝
陰虛

程

七十三三年不孕育其中幻病非一病人述經期遲至來

期預先三日周身筋骨脈絡牽掣凌楚不得舒展凡女

人月水諸絡之血必彙集血海而下血海者即衝脈也

男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈病也腹為陰陰

虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛

肝腎奇
脈陰虛

朱

損惑見病治病之悞有終身不育淹淹之累肝血陰虛
木火內寄古人溫養下焦必佐涼肝堅陰勿執經後期
為氣滯亂投破氣剛藥劫陰

尚當重用血藥

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

經云陽維為病苦寒熱緣上年冰雪甚少冬失其藏

春半潮濕地氣升泄以肝腎血液久虧之質春生力淺

必云八脈云衝任可也

八脈隸乎肝腎一身綱維八脈乏束固之司陰弱內熱

陽微外寒矣腎脊常痛經事愆期血海漸涸久延虛怯

情景已露局方逍遙散固女科聖藥大意重在肝脾二

經因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。今則入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

此方無著

炙甘草

阿膠

細生地

生白芍

麥冬

牡蠣

無汗不得用此

某

陰虧內熱。經事愆期。

雄烏骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

菟蔚子

女貞子

桂圓

陰虛

痛經
鬱傷氣
血滯

張四

寒熱間日經來腹痛

三寫清寒熱之藥古人凡見表症未有不先治其表者

右十味用青蒿汁童便醇酒熬膏加蜜丸

小生地

丹皮

知母

花粉

生鼈甲

澤蘭

某十二先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病

與下焦痕泄則異

川芎

當歸

香附

煨廣木香

查肉

茯苓

某二六寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢咳逆食物不思此鬱傷氣血八脈主病姑先與澤蘭湯

歸身

澤蘭

丹參

白芍

柏子仁

茯神

此方無著

周七十室女經水不調。先後非一來期。必先腹痛。較之平日
爲重。飲食大減。始於初夏。入秋下焦常冷。腹鳴。忽瀉。忽
結。究脈察色。是居室易於鬱怒。肝氣偏橫。胃先受戕。而
奇經衝任。躋維諸脈。皆肝胃屬隸。脈不循序流行。氣血
日加阻痺。失治必結。瘕聚。痞痞之累。

南山查

生香附

延胡

當歸

青皮

三稜

蓬朮

牛膝

川棟子

澤蘭

肉桂

炒小茴

葱白汁丸

顧經來筋掣腹痛。常有心痛乾嘔。此肝氣厥逆。衝任皆

病。務在宣通氣血。以調經。溫燥忌用。自可得效。

川棟 一錢

丹皮 三錢

炒查 二錢

胡連 八分

延胡 一錢

澤蘭 二錢

歸鬚 二錢

生白芍 一錢半

又柏子仁丸

吳鬱傷絡脈痛經

此衝任脈有寒

川芎

當歸

香附

小茴

烏藥

茯苓

紅棗

費

經水紫黑來時嘈雜。脈絡收引而痛。經過帶下不斷。

形瘦日減。脈來右大左弱。上部火升。下焦冷徹。骨中陰

鮑魚海味也腥
稔異常不堪入
煎劑中欲藉以
補陰豈本草中
別無善藥此老
不過一時弄巧
以異欺人遂開
後日庸醫炫奇
立異之門取種
種不堪入藥之
賜臚列成方以
為獨開生面別
授秘傳足徵庸
博并示靈巧此
風至今愈甚此
老難辭作俑之

食酸氣
血滯

氣分熱

陽乖違。焉得孕育。閱醫都以補血清劑。宜乎鮮效。議通

陽攝陰法。

宜用溫經法

鮑魚

內經用此
別有危

生地

淡薤蓉

天冬

當歸

柏子仁

炒山查

牛膝

茯苓

紅棗斷艾湯法丸

朱

脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有

熱

細子苓

白芍

黑山梔

鈎藤

茯苓

當歸鬚

香附

羌蔚子

桑枝

李

酸瀉入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹昔經行三

答總之近日時
醫先未能識真
病症因不敢施
用經方反藉此
希奇怪誕之物
塞責一時明知
誤治轉可令人
無從斑駁耳是
以此風日甚而
荷葉邊豆殼螺
殼橘白枇杷核
查核淡菜丑筋
一切神農本草
及方書所棄之
物收用不遺吁
此醫道之一變
也

經閉
木火鬱
熱

胃陽虛

日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經遺意
以辛勝酸主治但辛氣最易入表當求其宜絡者宜之

韭白汁

桃仁

延胡

小茴

當歸鬚

川棟子

王三
八苦辛泄降胸脘脹悶已舒此嗽血皆肝膽氣火上逆

必經來可安

南山查

桃仁

黑山梔

丹皮

橘葉

降香末

老韭白汁

朱

當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月
事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔

臍滯當停以理胃陽為務

人參

半夏麴

廣皮白

茯苓

生益智仁

煨薑

見寒症方可用

脾胃陽虛

某

脈數形疲咳經閉半年已經食減便溏浮腫無清嗽

通經之理扶持中土望其加穀四君子湯

欬者不宜

脾胃陽不運

某

三六經閉兩月腕痺嘔惡此氣窒不宜胃陽礙鈍使然當用和中為主

半夏麴

老蘇梗

茯苓

廣皮

枳殼

川斛

濕滯腹痛瀉

某

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣