



序

王叔和傷寒例云今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方擬防世急則知傷寒論當時已無成書乃叔和之所搜集者雖分定六經而語無詮次陽經中多陰經治法陰經中多陽經治法參錯不一後人各生議論每成一書必前後更易數條互相訾議各是其說愈更愈亂終無定論不知此書非仲景依經立方之書又救誤之書也其自序云傷天橫之莫救所以尋求古訓博採眾方蓋因誤治之後變證錯雜必無循經現證之理當時著書亦不過隨證立方本無一定之次序也余始亦疑其有錯亂乃探求三十年而後悟其所以然之故於是不類經而類方蓋方之治病有定而病之變遷無定知其一定之治隨其病之千變萬化而應用不爽此從流溯源之法病無遁形矣至於用藥則各有條理解肌發汗攻和散痞逐水驅寒溫中除熱皆有主方其加減輕重又各有法度不可分毫假借細分之不外十二類每類先定主方即以同類諸方附焉其方之精思妙用又復一一註明條分而縷悉之隨以論中用此方之證列於方後而更發明其所以然之故使讀者於病情藥性一目顯然不論從何經來從何經去而見證施治與仲景之意無不吻合豈非至便之法乎余纂集成帙之後又復鑽窮者七年而五易其稿乃無遺憾前宋朱肱活人書亦曾彙治法於方後但方不分類而又無所發明故閱之終不得其要領此書之成後之讀傷寒論者庶可以此為津梁乎

乾隆二十四年歲在屠維單闕陽月上浣涇溪徐大椿序

傷寒論類方目錄

桂枝湯類一十一

桂枝湯

桂枝加附子湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

小建中湯

桂枝加芍藥生薑入參新加湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝加葛根湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

麻黃湯類二

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

大青龍湯

小青龍湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

葛根湯類三

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

葛根加半夏湯

柴胡湯類四

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加芒硝湯

梔子湯類五

梔子湯類五

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴枳實湯

梔子柏皮湯

枳實梔子豉湯

承氣湯類六十一

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

抵當丸

十棗湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

麻仁丸

瀉心湯類七十二

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

黃連湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

旋復代赭石湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

白虎湯類八十三

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

五苓湯類九十四

五苓散

猪苓湯

文蛤散

茯苓甘草湯

四逆湯類十十五

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

四逆散

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

理中湯類十一方

理中丸

真武湯

附子湯

甘草附子湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

桂枝人參湯

雜方十二方

赤石脂禹餘糧湯

炙甘草湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

茵陳蒿湯

麻黃連軛赤小豆湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

黃連阿膠湯

吳茱萸湯

半夏散及湯

桃花湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒散

烏梅丸

白頭翁湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導方

豬膽汁方

燒視散

以上共一百十三方

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝去皮三兩 芍藥兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚

右五味以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫

服一升。服已須臾。歔熱稀粥一升餘。以助藥力。

桂枝本不能發汗。故須助以熱粥。內經云。穀入於胃。以傳於肺。肺主皮毛。汗所從出。歔粥充胃氣。以達於肺也。

觀此可知。傷寒溫覆令一時許。遍身熱熱微似有汗者。蓋佳。不可令如水流漓。病不必除。此解肌之法也。若如水流漓。則

動榮氣衛邪仍在。若一服汗出。病瘥。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促其間。半日許。令

三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出。乃服至三劑。桂

湯全料謂之一劑。三分之一謂之一服。古一兩今二錢。零則一劑之藥。除薑棗僅一兩六錢。零一服不過五錢。零矣。治傷寒大症。分兩不過如此。一服即汗不再服。無汗服至二三劑。總以中病為主。後世見

服藥得效者。反令多服無效者。即疑藥誤。又復易方。無往不誤矣。禁生冷粘滑肉麵。五辛酒酪。及臭惡等物。

太陽中風。陽浮而陰弱。風在外。故陽脈浮。衛氣有邪。故發散。陰弱。者。汗自出。芍藥

以收之。甘草以緩之。雷雷惡寒。漸浙惡風。惡風。未有不受寒者。但惡寒甚。翕翕發熱。陽明之甚。如鼻鳴。乾嘔者。鼻

似屬陽明。乾嘔似屬少陽。蓋三桂枝湯主之。太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝湯主之。此桂枝湯總症。太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝湯主之。湯總症。太陽

陽相近。故畧有兼病。但不甚耳。桂枝湯方。用前法。若不上衝者。不可與之。此誤下之症。誤下而仍上衝。桂枝湯方。用前法。若不上衝者。不可與之。則邪氣猶在腸分。故仍用桂

枝發表。若不上衝。則其邪已下陷。變病不一。當隨宜施治。論中誤治諸法。詳觀自明。太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池。風府。却與桂枝

傷寒論類方

桂枝湯

湯則愈。此非誤治因風和凝結於太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在衛

分留三呼風池二穴在顛額後髮際陷者 太陽病外症未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯。病雖過期

陽仍不離 太陽病外症未解者不可下也。此禁下下之為逆欲解外者宜服 言雖有當下之症而外症

桂枝法 而後 太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈令脈浮故知在外當

須解外則愈宜服。脈浮而下此為誤下下後仍浮則邪不因誤下而 病嘗自汗出者此為榮氣和榮氣

和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾。榮氣和者言榮氣不病非 以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮

衛和則愈宜桂枝湯。自汗與發汗迥別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正 病人藏無他病

時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時未熱之時發汗則愈宜桂枝湯主之。無他病太陽諸症不必

用桂枝湯 傷寒不大便六七日宜下頭項痛有熱者未可與承氣湯。太陽症仍在不得以日久不便而下也

字其小便清者知不在裡仍在表也。裏亦有熱當須發汗若頭痛者必衄 汗出而頭痛未解則宜桂枝湯。

傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗。發汗未透故煩乃 宜桂枝湯 傷寒醫下之續得下痢清

穀不止。裏身疼痛者表急當救裡 此誤下之症邪在表而引之入陰故便清穀腸氣下脫可危雖表症未

體 後身疼痛清便自調者急當救表。清穀已止疼痛未除仍從表治蓋凡病皆當先表後裏惟下痢清穀

治數症必 救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯。 太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者

宜桂枝湯。桂枝為驅風聖藥 陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此方。陽明本自多汗

熱今多汗而猶惡寒則仍在表 大陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯。太陰本無汗法因其脈獨浮則邪仍

病人煩熱汗出則解。又加瘧狀。有時日晡所發熱者屬陽明也。日晡發熱則為陽明。脈實者宜下之。脈虛

浮者宜發汗。一症而治法迥別。全以脈為下之。與大承氣湯發汗。宜桂枝湯。下痢腹脹滿。裏身疼痛者。

表先溫其裡。乃攻其表。溫裡宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。此節屬厥陰症。未必由誤治。而得然。既見表症亦宜兼治。吐痢止而身痛不

休者。當消息和解其外。宜桂枝湯。和之。裏症除而表症猶在。仍宜用桂枝法。法輕其劑而加減之可也。傷寒大下後復發汗。再

痞。柳入惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃連瀉心湯。

苦寒開降之法詳見後

### 桂枝加附子湯二

桂枝湯原方加附子一枚。泡去皮。破八片。右六味以水七升。煮取三升。去渣。溫服一升。

大陽病發汗遂漏不止。此發汗太過。如水流。其人惡風。仍惡風則表邪未盡也。小便難。津液四肢微急。

難以屈伸。四肢為諸陽之本。急難屈伸。乃津脫陽虛之象。但不至亡。桂枝同附子服。陽耳若更甚。而厥冷惡寒。則有陽脫之慮。當用四逆湯矣。桂枝加附子湯主之。則能止汗回陽。

桂枝加桂湯三。桂枝原方加桂二兩。即另立湯名。治症迥別。古聖立方之嚴如此。

桂枝湯原方加桂二兩。右五味以水七升。煮取三升。去渣。溫服一升。

燒針令其汗。針處被寒。新寒核起而赤者。必發奔豚。氣從小腹上衝心者。灸其核上。各一壯。云各一針。故

與桂枝加桂湯。重加桂枝。不特禦寒。且制腎氣。又藥味重。則能達下。凡奔豚症。此方可增減用之。

### 桂枝去芍藥湯四

桂枝湯原方去芍藥。右四味以水七升。煮取三升。溫服一升。



桂枝去芍藥加附子湯五

即前方加附子一枚泡去皮破八片餘依前法

太陽病下之後脈促胸滿者中虛而表邪仍在桂枝去芍藥湯主之太陽之邪未盡故用桂枝若微惡寒者去芍

藥方中加附子湯主之微惡寒者則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯六

桂枝湯原方加厚朴二兩炙杏仁五十枚右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳別錄厚朴主消痰下氣木經杏仁主咳逆上氣太陽病下之危喘者表未解故也此湯主之前條

乃本然之喘此乃誤下之喘因殊而法一

小建中湯七

桂枝湯原方加膠飴一升右六味以水七升煮取三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服

嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脈濡陰脈弦中宮之陽氣虛則木來法當腹中急痛先與小建中湯以助中宮不差者與小柴胡

湯主之治太陰不愈變而治少陽所以疎土中之木也以脈弦故用此法傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之悸而煩其為虛

中湯以補心脾之氣蓋施于湯治有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯八

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升此

多煎為妙取其味厚入陰也

發汗後身疲痛表未盡脉沈遲氣虛已甚此湯主之和未盡宜表而氣虛不能勝散藥故用人參凡素體虛而過汗者方可用

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩右二味以水二升煮取一升頓服此以一劑為一服者

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此湯主之發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛二味扶陽補中此乃陽虛之輕者甚而振振欲

掉地則用真武湯矣一症而輕重不同用方迥異其義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩大棗十二枚右四味以甘爛水一斗以水二斗揚之萬遍取用按甘先爛水大約取其動極思靜之意

者茯苓凡方中專重之藥法必先煮減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是擾胸中之陽臍下悸則因發汗太過上焦乾澀腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以治奔豚

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六銖芍藥一兩生薑一兩甘草炙麻黃去節各二兩大棗四枚杏仁二十四枚右七味去皮及雙仁者以水

五升先煮麻黃一二沸去上沫欲去沫故先煮納諸藥煮取一升八合減去三之一去滓溫服六合一云桂枝湯三

合麻黃湯三合頓服將患如上法

太陽病得之八九日經過如瘧狀發熱惡寒熱多寒少漸輕其人不嘔非少清便欲自可無裏一日二三度

發非瘧象脉微緩者不浮不為欲愈也餘邪欲退之象脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也此中

明上文欲愈之故蓋由病氣雖除而正氣亦衰當靜以養之使胃氣漸充則面色反有熱色者未欲解也榮衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從藥增醫者不審誤人多矣  
面有熱色則以其不得小汗出身必痒宜服微粉已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足餘邪尚鬱矣陽明篇云身痒如虫行皮中狀者此以久虛故也按此  
方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分  
三服祇服四錢零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七芍藥六兩杏仁十六枚麻黃十六銖甘草二兩生薑六兩大棗五枚右七味以水五升

先煮麻黃二沸去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升

合為三升分再服

服桂枝湯大汗出脉洪大者汗雖出而邪未盡與桂枝湯如前法行復如法者也若形如瘧日再發者汗出必解

桂枝二麻黃一湯主之此與桂枝湯各半湯意略同但此因大汗出之後故桂枝略重而麻黃略輕

桂枝二越婢一湯十三  
桂枝湯加麻黃石羔二味

桂枝去皮芍藥 甘草 麻黃去節各十八銖大棗四枚生薑二兩石羔二十四銖碎綿裹 右七味以水五升

煮麻黃二沸去上沫納諸藥者取二升去渣溫服一升 附越婢方 麻黃六兩 甘草二兩 石

羔半兩 生薑三兩 大棗十五枚

大陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可更汗此無陽與亡陽不同并與他處之陽虛亦別蓋其人本非壯盛而邪氣亦輕故身有寒熱

而脉微弱若發其汗必至有以手冒心臍下悸等症故以此湯清疎榮衛令得似汗而解况熱多寒少熱在氣分尤與石羔為宜古聖用藥之審如此 按以上三方所謂一二各半之說照方計算並不對準未

知何說或云將本方各煎或一分或二分相和服此亦一法但方中又各藥注明分兩則何也存考

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四

芍藥三兩甘草二兩生薑

茯苓

白朮各三兩大棗十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫

服一升小便利則愈此方專於利小便也

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之頭痛發熱桂枝症仍在也以其無汗則仍

宜更用桂枝心下滿則用白朮小便不利則用茯苓此症乃亡津液而有停飲者也凡方中有加減法皆佐使之藥若去其若藥則另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所不可解殆以此方雖去桂枝而意

仍不離乎桂枝也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯十五

桂枝湯原方去芍藥加蜀漆三兩洗牡蠣五兩龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

納諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂以火劫其胸中之陽起臥不安者此湯主之此與少陰汗出之亡陽迥別蓋

用四逆輩固其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心腹邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六

桂枝一兩甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩右四味以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

脈浮宜以汗解此治脈浮之總訣用火灸之濕邪無從出因火而盛入內病從腰以下必重而痺名火逆也在上

則陰氣獨治於下故重而痺火逆下之誤因燒針煩躁者更誤治下之虛其陰燒針又益桂枝甘草龍骨牡蠣湯

主之鎮其陰氣散其火邪上下同治前方驚狂治重在心故用蜀漆此無驚狂象故蜀漆不用其症藥大段相同

桂枝加葛根湯十七

此湯成無已本有麻黃非有麻黃則為葛根湯矣

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同右六味以水一斗先煮葛根減一升去沫納

諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強八九反汗出惡風者八八仲頰之象柳氣漸深故加葛根桂枝加葛根湯主之

桂枝加芍藥湯十八

桂枝湯原方芍藥加一倍右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰症而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本太陽病醫反下之誤因而腹滿時痛屬太陰也引和入於太陰故所現皆太陰之症桂枝加芍藥湯主之雖見太陰症而未

罷故仍用桂枝湯只加芍藥一倍以飲大陰之症大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加太黃湯主之此因

而見太陰之症大實痛則反成太陰之實和仍用大黃引之即從太陰出不因誤下而禁下見症施治無不盡然按活人書云桂枝湯自西北人四時行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之春末及夏至以

前桂枝症可加黃芩一分謂之陽且湯夏至後可加知母半兩石膏一兩或加升麻一分若病人素虛寒者不必加減

麻黃湯類二

麻黃湯一

麻黃去節桂枝去及甘草炙兩杏仁七十個去皮尖右四味以水九升先煮麻黃減二升此須多煮取其力

止煮一去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗以其易發汗也餘如桂枝將息法

活人書云夏至後用麻黃湯量加知母石  
羔黃芩蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之慮

太陽病頭痛發熱身疲腰痛骨節疼痛此痛處比桂枝症尤多而惡風無汗而喘者此二症乃肺氣不舒

仁治喘桂枝甘草治太陽諸症無一味不緊切所以謂之經方太陽與陽明合病陽明之病象甚多如身熱不惡寒口苦鼻乾之類但

喘而胸滿者不可下病俱在宜麻黃湯主之喘而胸滿此麻黃症太陽病十日以去經脈浮細却已而

者臥者止漸復外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯胸滿脇痛病延日久脈但浮者與麻黃湯若果邪在

帶絃今但浮則尚在太陽矣故仍用麻黃湯此亦從脈不從症之法太陽病脈浮緊無汗發熱身疲痛此乃太陽傷寒的八九日不解表

證仍在表証即此當發其汗黃湯服藥已微除其人發煩目瞑陽鬱而不劇者必衄衄乃解熱甚動血

清道而出與汗從皮毛而洩同故熱和亦解俗語所云紅汗也經云陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為熱

類也麻黃湯主之此言未衄之前可用麻脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脈浮脈浮而數者奇發

汗宜麻黃湯數為陽傷寒脈浮緊不發汗治因致衄者麻黃湯主之前段衄後而解則不必復用麻

陽明病肝浮無汗而喘者陽明本脈大自汗今乃脈浮發汗則愈宜麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯二此即越婢湯加杏仁也

麻黃四兩杏仁五十個甘草二兩石羔半兩綿裹右四味以水七升先煮麻黃減升去沫納諸藥

煮取二升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯既汗不可再汗津液不得重傷汗出而喘尚有留邪在肺無大熱者邪已可與此湯汗出故用

用麻發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘此二句明致喘之所由蓋喘未必皆下後不可更行桂枝

傷寒論類方 麻黃湯 五

湯既下不可復汗。若汗出而喘，無大熱者，可與此湯。

大青龍湯三

此合麻黃桂枝越婢三方為一方而無芍藥

麻黃六兩 桂枝二兩 甘草二兩

杏仁四十枚 生薑切三兩

大棗十二枚

石膏碎如雞子

右七味以水九升

先煮麻黃減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升。取微似汗，汗出多者，溫粉撲之。此外治之法，論中無

溫粉方明理論載白朮、藁本、川芎、白芷各等分入米粉和勻撲之，無藁本亦得。後人用牡蠣、麻黃根、鉛粉、龍骨亦可。

不得眠也。

太陽中風脉浮緊。

緊為陰脉，故發熱惡寒。非惡風，身疼痛，不汗出而煩躁者，柳深。大青龍湯主之。若脉微弱，汗出惡風者，不可服之。則厥逆筋惕肉瞤，此為逆也。矣。立此方，即垂此戒。聖人之意深矣。按此方合

麻桂而用石羔，何以發汗如是之烈？蓋麻黃湯麻黃用二兩，而此用六兩，越婢湯石羔用半兩，而此用雞子大一塊，一劑之藥除大棗約共十六兩，以今秤計之，亦重三兩有餘，則發汗之重劑矣。雖少加石羔，終

不足以相制也。少陰篇云脉陰陽俱緊，反汗出者，亡陽也。傷寒脉浮緩，身不疼，但重，乍有輕時，無少陰症者，大青龍湯主之。脉不

身有輕時為無少陰外症，不厥利吐逆為無少陰裏症。此邪氣俱在外也。故以大青龍發其汗。按此條必有誤，脉浮緩和輕易散身不疼外邪已退，乍有輕時，病未入陰，又別無少陰等症。此病之最輕者，何必

投以青龍險峻之劑，此必有主方而誤以大青龍當之者也。

小青龍湯四

麻黃去節 芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝去皮各

五味子半兩

半夏半升

右八味以

水一斗，先煮麻黃減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升。若微利者，去麻黃，加薤花如雞

子大，熬令赤。利屬下焦，陰分不可更發其陽。薤花明理論作芫花，恐誤本草。薤花芫花，其皆有去水之功也。若渴者，去

葉相近而薤花不常用，當時已不可得，故改用芫花。

半夏加括裏根三兩。本草括裏根主消渴若噎者汗古作鉤論云寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令

呃逆之去麻黃加附子一枚炮子溫中。若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩則水不在上而在下

按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源和茯苓若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖。杏仁見前按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源和

此方無微不至真神劑也

傷寒表不解發汗未透心下有水氣即未出之汗乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青

龍湯主之。以上皆水停心下現症其每症治法皆在加減中傷寒心下有水氣效而微喘發熱不渴凡水停心下服湯已即小

也渴者此寒氣欲解也寒飲去小青龍湯主之謂欲解之後更服小青龍湯也

麻黃附子細辛湯五

麻黃去節二兩細辛二兩附子一枚右三味先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服三升日

少陰病始得之反發熱脈沉者此湯主之。少陰病三字所該者廣必從少陰諸現症細細詳審然後反發

必候其脈象之沈然後蓋知其為少陰無疑也凡審症皆當如此附子細辛為少陰溫經之藥夫人知

之用麻黃者以其發熱則邪猶連太陽未盡入陰猶可引之外達不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表裏通

用亦能溫裏故陰經諸藥皆用之麻黃則專於發表今欲散少陰始入之邪非麻黃不可况已有附子足以溫少陰之經矣

麻黃附子甘草湯六  
麻黃去節二兩甘草二兩附子一枚右三味以水七升先煮麻黃一兩沸此篇去上沫納諸藥煮取三升

去渣溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也。三陰經惟少陰與太陽為表裏而位最近故猶有汗

傷寒論類方 葛根湯 六



解之理况二三日而無裏症則其邪未深入此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏症也

### 葛根湯類二

葛根湯一

此即桂枝湯加麻黃三兩葛根四兩

葛根

四兩

麻黃三兩去節芍藥二兩

生薑切二兩

甘草二兩

桂枝去皮二兩

大棗枚十二

右七味以水一斗先煮麻

黃葛根

二味

去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥汗能發餘如藥先煮減二升

桂枝法將息及禁忌

大陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

前桂枝加葛根湯一條其現症亦同但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故加麻黃也陽明症汗出而惡熱今無汗而

惡風則未全入陽明故曰太陽病按葛根本草治身大熱大熱乃陽明之症也以太陽將入陽明之經故加此藥

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之也

合病全在下利一症上審出蓋風邪入胃則下利矣

葛根黃芩黃連湯二

葛根半劬

甘草二兩

黃芩三兩

黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去

渣分溫再服

太陽病桂枝症

桂枝症即太陽傷風之正病也醫反下之誤利遂不止邪下陷則利無止時脈促者表未解也促有數意邪猶在外

沈微等象故不用理中等法喘而汗出者此湯主之因表未解故用葛根因喘汗而利故用芩連之

葛根加半夏湯三

葛根湯原方加半夏半斤先煎服法同

大陽與陽明合病不下利

前條因下利而如太陽陽明合病今既不下利則合病何從而嘔者葛根加