

精校

脈

因

證

治

江左書林印

朱丹溪先生著

脈因證治

許松如署

12241

江左
書林
印行

余自歸里後杜門不與世事接先太宜人病痰飲延葉眉壽治歷四年弗痊而眉壽謂為痼疾難效因徧覽方書頗會其旨揀方以治不一年而瘳後遂旁搜博採窮極幽渺而於長沙河間東垣子和丹溪諸書尤三致意焉竊嘗謂醫之有長沙時中之聖也而四家並峙猶清任和之各成其聖偏焉而至者也學不從此參究猶航斷港絕潢以望至於海也其能之乎但四家自河間東垣而外子和文多缺略未為全書丹溪著作類出門人記載惟聞脈因證治一書簡而該約而盡學者循是而窺長沙如得其船與楫沿而不止固自不可量也而流傳絕少歷三十年未獲一觀心常怏怏歲乙未客有持來示余欲廣諸同好亟請付梓不禁欣感交集以為一綫靈光忽然湧現真為桑榆之幸因不辭而為之序以弁其首

時

乾隆乙未仲夏吳起繆遵義書於芝田山房

嘗讀丹溪朱震亨諸集如痰証卒中陰虛發熱等門竊歎其入理懸河之論幷懽後世之功不勝縷述至脈因證治二卷尤先生之卓見蓋醫者之於脈猶聽訟之於情訟得其情則刑不妄措醫得其脈則方不混施凡因之內外證之虛實治之緩急何獨非三指得之昌黎公所謂善醫者不視人之肥瘠惟察其脈之病否而已故必先求諸脉而因而證而治四者井然詎容廢一第脈理玄通在乎神取舌難掉其形似學者譬入蜀之鳥道羊腸往往望而裹足幾共視為天下之畏途遂致六部茫然適燕南指不過虛應故事以冀治之倖獲噫生民不幸莫此為甚先生蚤鑑於此而砥注透波特以脈字領頭治字煞尾喚醒後之業是道者必當於指下猛透一鍼庶不致心聲而受天人之交謫推是書也直與日月俱明鬼神爭奧誠片箋片玉足為萬世之法程而一日不可離一字不可搖者也向非先生能具隻眼至若是哉脫起張劉李於當時諒必如晦翁云吾且當避此老三舍耳予家什襲已久先君子願公梨棗顧有志未逮不肖望續成之自梓以還將見岐伯重興而先生且不死矣未必非吾

聖天子化日光天之一助云

乾隆四十年歲次乙未孟秋日語溪後學湯望久來蘇氏謹識

丹溪朱氏脈因證治目錄

上卷

一 卒尸

十四 熱

二 痺

十五 吐衄下血

三 瘥

十六 下痢

四 痿

十七 泄

五 厥

十八 自汗頭汗

六 傷寒

十九 淋附小便不禁腎臟風

七 大頭腫痛

附蝦蟇瘟

二十 頭目痛附腦痛肩骨痛

八 霍亂

二十一 眩運

九 瘟病

二十二 心腹痛

十 傷暑

二十三 腰痛附腰胯腫痛腰軟

十一 瘡

二十四 肩背痛附腰脾痛

十二 疸

二十五 脇痛附身體痛

十三 勞勞極熱勞瘵

二十六 逆痰嗽

丹溪朱氏脈因證治卷上

一卒尸

脈寸口沈大而滑沈則為實滑則為氣實氣相搏厥氣入臟則死入腑則愈若身冷為入臟死身和汗自出為入腑則愈緊而急者為遁尸少陰不至腎氣衰少精血為尸厥跌陽脈不出脾不上下身冷硬呼之不應脈絕者死脈當大反小者死證治在外者可治入裏者死血氣並走於上則為厥暴死素有痼疾新加卒病先治卒病尸厥者昏不知人脈動如故開上焦心肺之陽自愈尸厥脈動無氣氣閉靜而死也以菖蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑放舌下又方別取左角髮方寸燒末酒和灌入喉立起救卒死身熱者驗方礬石半斤以水一斗五升煮浸脚令沒踝蓋取礬性收瀋而斂其厥逆之氣

還魂湯

治卒死客忤死

麻黃

三兩去節

杏仁

八十箇去皮尖

炙甘草

一兩

三味水八升

煮取三升去渣入薑汁少許令咽之蓋取辛甘通陽氣發越邪氣故也

救卒死目閉方

搗薤汁灌耳中妙或吹皂莢末於鼻中立效薤汁辟邪安魂皂莢末取

嚏開竅

救卒死張口反折方

炙手足兩爪後一十四壯飲以五毒諸膏散

外有中惡中氣中食等狀與卒尸相類須詳諦脈證而投之慎勿泛視誤人倉卒變通

在神法難畢述

二痺

脈寸口喘而堅痺在心 喘而浮痺在肺 長而左右彈痺在肝 大而虛痺在脾 堅而失痺在腎

因風氣為行痺風性善行 寒寒為痛痺寒主收引 濕濕為着痺濕本重滯 三氣致痺之原或外兼他患有之若舍此而能痺無有也

證其合而為痺也以冬過者骨痺春過者筋痺夏過者脈痺長夏過者肌痺秋過者皮痺久而不去內舍五臟之合待舍其合難治矣 痺論中議痺乃三氣皆可客於五臟其風寒濕乘虛而客之故也筋痺不去內舍於肝皮痺不去內舍於肺肌痺不去內舍於脾脈痺不去內舍於心骨痺不去內舍於腎其客於心則煩心上氣喘乾恐噫厥脹是也 其客於肺使人煩滿而喘吐 其客於肝多飲數洩小腹痛如懷妊夜卧則驚 其客於脾四肢懈惰發渴嘔沫上為大塞 其客於腎善脹尻以代踵脊以代頭 其客於腸數飲而小便不得中氣喘爭時發殄洩夫大腸乃傳道之官為沖和之氣三氣乘虛客之而和氣閉矣水道不通使糟粕不化故喘爭殄洩也 其客於胞小腹膀胱按之內痛若沃以湯小便澀上為清涕夫三氣客於胞中則氣不能化出故胞滿而水

道不通隨經出鼻竅 其客於血脈隨脈流通上下升降一身謂之周痺

華佗論痺乃邪氣合四時不正之氣感於臟腑所為有氣血筋肉骨之分 其氣痺者愁思喜怒過則氣結於上久而不消則傷肺正氣衰邪氣勝留於上則胸腹痛而不能食注於下則腰脚重而不能行貫於舌而不言遺於腹則不溺墜則痛流則麻右寸脈沈而遲濡者是也 其血痺者飲酒過多懷熱太甚或寒折於經絡或濕犯於營衛因而血搏漸成枯削失血之證左寸脈結而不流利是也 其肉痺者飲食不節肥美之為肉不榮膚不澤則紋理疎三氣入之則四肢緩而不收持右關脈舉按無力而澀也其筋痺者由叫怒無時行步奔急淫邪傷肝肝失其氣寒熱客之流入筋會使筋急而不舒左關脈弦急而數浮沈有力是也 其骨痺者乃嗜欲傷於腎氣內消而不能閉禁邪氣妄入脈遲則寒數則熱浮則風濡則濕滑則虛治法各隨其宜麻木餘辨 是風濕熱下陷入血分陰中陽氣不行其證合目則渾身麻亦有痰在血分痺者血不營肌膚

治附子湯

治風寒濕痺

桂枝

附子

炮去
皮臍

白芍

甘草

茯苓

人參

各三錢

木一兩

行痺加麻黃桂湯

痛痺加附子薑茯苓湯

胞痺加四苓

腸痺加平胃茱萸草肉豆

蔻等

戴人法苦薊湧寒痰次與痰劑使

白木陰
濕

茯苓養胃
水

桂枝養胃
水

菟等

戴人法苦薊湧寒痰次與痰劑使

白木陰
濕

茯苓養胃
水

桂枝養胃
水

薑附寒勝

木陰
濕

茯苓養胃
水

桂枝養胃
水

麻木方

參

助陽通歸行陰

生甘草

去熱

蒼

藥

白朮

苓

附濕熱

升麻

柴胡

白

芍

痰加二陳

忍冬藤膏

治五痺拘攣

三瘕

即瘕也

脈太陽發熱脈反沈細難愈

太陽症備脈沈遲此為瘕

寸口脈直上下行伏緊如

弦

沈弦沈緊

少陰脈緊

暴微者欲解

因血氣內虛四氣外襲

因濕諸瘕項強皆屬於濕

寒濕同性故濕可傷太陽

二因論狀身熱足寒頭強項急惡寒時頭熱面赤目赤脈獨頭搖動卒噤角弓反張皆因

血虛筋無所養邪因入之故寒則緊縮熱則弛張風則弦急濕則脹緩

又有因瘡口未合風入之為破傷風濕入之為破傷濕與瘕同但少頭項急餘並相如

又有因汗下過多

又有產後怒氣致此病者

項強亦有瘕者

證有汗而不惡寒名柔瘕

無汗口噤腳攣名剛瘕

治宜流濕祛風緩表而安

詳有無汗而藥之

柔瘕葛根加桂湯

剛瘕大承氣湯

葛根湯汗之有表證可用

大承氣下之有裏證可用

四瘕

脈浮而大浮虛大熱

滑而大滑瘕大虛

洪而緩洪熱緩虛

因腎水不能勝心火火上燦肺金六葉皆焦皮毛虛弱急而薄着者則生痿躄皆因貪慾好色之故濕痰亦能為之

經論有由悲哀太甚陽氣內動數澁血大經空虛熱起於心病則樞紐如折不相提挈名曰脈痿有思想無窮入房太甚宗筋弛縱熱入於肝病則筋急而爪枯名曰筋痿有由濕地以水為事熱生於脾病則胃乾而渴肌肉不仁名曰肉痿有因遠行勞倦過大熱而渴陽氣內乏熱舍於腎病則腰脊不舉骨枯而髓減名曰骨痿然此皆熱薰於肺之為也火上炎肺治節不行而痿躄矣

證面黃身熱肌瘦往來寒熱涎嗽喘滿面浮弱而不用者為痿外有痿即軟風也

柔風腳弱病同而證各異

治法獨取陽明陽明者胃脈也五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也故陽明虛而然張以黃連解毒湯加歸等劑治之李以甘寒瀉火苦寒瀉濕熱四君子補陽明虛清暑益氣治之濕痿之為病宜二陳湯加朮苓藥治之

清暑益氣湯 治熱傷肺氣虛成痿 芪一錢 汗少減半 暑邪干參 救火木各半 蒼朮

除濕甘草 益氣歸三錢 升麻一錢 酒潤甘平 葛二錢 陳皮半錢 澤瀉半錢 曲半錢 五苓

酸寒收 暑傷金 麥門冬 錢三 青皮半錢 藥三錢 補水 濕熱 或加知母黃芩 健步丸 治濕熱成痿 羌

活 防風 柴胡

滑石 炙甘草

薑

酒洗各半兩

澤瀉

五錢

防己

酒製一兩

川烏

苦參

酒洗

肉桂錢愈風湯下

秘方氣虛四君子加蒼白朮苓藥

痰加竹瀝血虛四物湯

濕

痰二陳湯加蒼白朮苓藥竹瀝下補陰丸

一論瘡癰乃腎虛也舌不語腎脈夾舌本腎氣厥不至是不行腎氣不順

五厥

脈沈微而不數謂之寒厥 沈伏而數謂之熱厥

因虛 因痰 因熱 因寒

證厥當分二種次分五臟

寒厥為手足寒也陰氣勝則寒其由乃恃壯縱慾於秋冬之間則陽奪於內精氣下溢邪氣上行陽衰精竭陰獨行故為寒厥 熱厥為手足熱也

陽氣盛則熱其由乃醉飽入房氣聚於脾胃陰虛陽氣入則胃不和胃不和則精竭精

竭則四肢不榮酒氣與穀氣相搏則內熱而溺赤腎氣衰陽獨勝故為熱厥 五心煩

熱 有小腸熱者 有心虛而熱者 厥亦有腹暴滿不知人者 或一二日稍知人

者 或卒然衰亂者 皆因邪氣亂陽氣逆是少陰腎脈不至也腎氣衰少精氣奔逸

使風促迫上入胃膈宗氣反結心下陽氣退下熱歸股腹與陰相助令人不仁又五絡

皆會於身五絡俱絕則令人身脈俱動而形體皆無所知其狀如尸故曰尸厥正由臟

皆會於身五絡俱絕則令人身脈俱動而形體皆無所知其狀如尸故曰尸厥正由臟

氣相形或與外邪相忤則氣鬱不行閉於經絡諸脈伏匿昏不知人厥有痰如曳鋸聲在咽中為痰厥骨枯爪痛為骨厥身直如椽為筋厥因醉而得為酒厥暴怒而得為氣厥手足搖擗為風厥喘而狂走為陽明厥此皆氣逆之所為也治李法痰用白朮竹瀝熱用承氣下之氣虛補氣四君子血虛補血四物張法降心火益腎水通血和氣必先涌之

六傷寒

脈陽浮而陰弱謂之傷風邪在六經俱強加之風傷陽故浮虛陽浮衛中風也陰弱營氣弱也浮緊而無汗謂之傷寒寒傷營實則衛虛寒傷陰故堅牢陽緊邪在上焦主欲嘔陰緊邪在下焦必欲利脈浮頭項痛腰脊強病在太陽脈長身熱目痛鼻乾痛在陽明脈弦胸脇痛而耳聾病在少陽脈俱沈口燥舌乾邪在少陰脈俱微緩煩滿囊縮邪在厥陰脈俱沈細噤乾腹滿邪在太陰脈陰陽俱盛重感於寒而緊瀋變為溫瘧陰陽俱盛傷寒之脈前病熱未已後寒復盛也脈陽浮滑陰濡弱更過於風乘變為風溫陽浮而滑陰濡而弱皆風脈也前熱未歇風來乘熱脈陽洪數陰實大過濕熱兩合變為溫毒洪數實大皆兩熱脈陽濡陰弱而陰弦緊更過溫氣變為溫疫病發熱脈沈而細表得太陽名曰瘧病太陽身熱疼脈微弱弦芤名曰中

喝 病若發汗已身灼然熱名曰風濕風溫為病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡新
語難以小便利更被其下若被火者微發黃色劇者則驚癇時瘳癰若火薰則死矣
病太陽關節疼痛而煩脈沈細名曰濕痺 脈沈細而疾身冷則四肢冷煩躁不欲飲
水狂悶名曰陽厥 脈當有神不問數極遲敗當中有力即有神焉神者血氣之先
傷寒熱甚脈浮大者生沉小者死已汗沈小者生浮大者死 溫病三二日體熱腹滿
頭痛飲食如故脈直而疾者八日死 溫病八九日頭身不痛目不赤色不變而反利
脈來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死溫病四五日頭痛腹滿而吐脈來細強
十二日死 溫病汗不出出不至者死 厥汗出腎脈強急者生虛緩者死 溫病
下利腹中痛者死 熱病七八日不汗躁狂口舌暴燥焦黑脈反細弱或代者死 八
日以上反大熱死邪勝故也 熱病七八日當汗反下脈絕者死 熱病得汗脈躁者
死脈轉大者死 厥逆呼之不應脈絕者死 陽厥有力者生陰厥按之大者生 熱
病七八日脈不躁喘不數後三日中有汗不汗者四日死 熱病脈濡小疾腹滿膜脹
身熱不得大小便死 熱病脈浮大絕喘而短氣大衄不止腹中疼死 熱病脈浮洪
腸鳴腹滿四肢清注泄者死 熱病脈絕動疾便血奪形肉身熱者死 熱病脈小疾
咳喘眩悸奪形肉身熱死 熱病腹脹便血脈大時時小絕汗出而喘口乾視不見者

死 熱病脈轉小身熱甚死 熱病脈轉小身熱甚效而使血目陷妄言循衣縫躁擾
不卧死 熱病嘔血咳煩滿身黃腹鼓脹洩不止脈絕死 熱病癰痲狂走不能食
腹滿胸痛引腰脊嘔血死 脈浮而洪邪氣勝也身體如油正氣脫也 喘而不休水
漿不下胃氣盡也 體麻不仁營衛不行乍靜乍亂正邪爭也故為命絕也 熱病喘
效唾血手足腹腫面黃振慄不言名肺絕死丁日死後倣此 熱病頭痛嘔宿汁溫逆
吐血水漿不入口狂妄腹大滿名脾絕死 熱病煩滿骨痛噤腫不可咽欲咳不能效
歌笑而哭名心絕死 熱病僵卧足不安地嘔血血妄行遺尿溺名肝絕死 熱病喘
悸吐逆骨痛短氣目視不明汗如珠名腎絕死 太陽病脈反躁盛是陰陽交死得汗
脈靜者生 少陰病惡寒而踰下利手足逆者死又吐利躁逆者死 少陰病四逆惡
寒而踰其脈不至不煩而躁者死 少陰病下利止而頭眩時時自冒者死 又七八
日息高者死 少陰病脈微沈細但欲卧汗出不煩自欲吐五六日自利煩躁不得卧
寐者死 若利止惡寒而踰手足溫者可活少陰病下利止厥逆無脈不煩服湯藥其
脈暴出者死微續者生 傷寒下利厥逆躁不得卧者死下利至厥不止者死 傷寒
厥逆六七日不利便發熱而利者生 汗出利不止者死有陰無陽故也 傷寒五六
日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下下之亡血死 熱病不知所痛不能自收口乾陽

熱甚陰頗有寒者死 熱病在腎渴口乾舌燥黃赤日夜飲水不知腹大脹尚飲目無精光者死 傷寒下利日十餘行脈反實者死 病者脇下素有痞而下至於臍旁痛引小腹入陰夾筋為臟結者死 結胸證參具而躁者死 直視譫語喘滿者死 若下利亦死

因房勞辛苦之過腠理開洩少陰不藏觸冒冬時被厲之氣嚴寒之毒中而即病曰傷寒不即病寒毒藏於肌膚之間至春變為溫至夏變為熱病皆腎水涸春無以發生故也皆熱不得發洩鬱於內遇感而發雖曰傷寒實為熱病春病溫疫夏為熱病及殮洩秋發痲瘧冬生咳嗽皆因感四時不正之氣總名之曰傷寒

證治自外而入內傳經絡 太陽證頭疼發熱惡寒腰脊強脈浮而緊無汗謂之傷寒可汗宜麻黃湯 脈緩自汗謂之傷風宜桂枝湯忌利小便重汗下大便 陽明證身熱目疼鼻乾不得卧不惡風寒而自汗尺寸脈俱長宜白虎湯 浮沈按之有力宜大承氣湯胃熱也不生汗忌汗利小便 少陽證往來寒熱胸脇痛而嘔耳聾脈弦宜和解之小柴胡湯 膽無出入水火之間下犯太陽汗下利皆不可忌利小便忌汗忌利大便 太陰證腹滿咽乾手足自溫自利不渴時腹痛脈沈細其藏寒宜四逆湯 脈浮可汗宜桂枝湯又大實痛可下用詳 忌三法宜三法用詳 少陰證口噤舌乾而