



光緒三年仲夏新鐫

# 切總傷寒

興發堂刊

藏書章

1906年5月16日

序

傷寒四字經原吾師汪百川所傳也人雖有之秘而不見  
予思利世救民醫者之責何敢私而不公今出其書而刊  
刻之以便仁人之檢用內有捷徑傷寒條字句錯訛故爲  
易之有傷寒湯亦未附齊更採諸書而爲補之又摘入說  
約歌括四十餘首名曰切總切者摘其要總者約其全爾

傷寒四字經

脈在浮分

太陽初經

惡寒發熱

牙痛頭疼

無汗惡寒

脈浮緊硬

麻黃發表

汗出即應

有汗傷風

桂枝湯進

脈浮軟緩

止汗自靈

膀胱是腑

渴熱邪臨

大便泄瀉

小便滯凝

五苓散服

渴止便平

風寒互見

各半湯承

麻黃桂枝

各宜而進

若有煩燥

大青龍靈

九味羌活

總可代行

脈入中分

陽明少陽

陽明之症

中分而長

病有經腑

淺深要明

經病目痛

鼻乾不眠

紫葛解肌

加減湯進

邪深入腑

胃裏熱炎

汗渴班譴

白虎湯先

叫走狂越

三黃巨盛

表邪未罷

大柴胡進

中分脈弦

少陽之症

胆無去路

只有經病

寒熱嘔吐

耳聾脇痛

小柴胡湯

合宜而行

脈入沉分

審察三陰

陽初入陰

太陰先成

腹滿自痢

咽不到津

小柴加桂

只朴消凝

亦有腹痛

胃熱邪臨

桂枝大黃

下而後平

舌乾口燥

少陰之症

尺寸俱沉

津不到咽

狀水益火

家藏秘經

陰陽兩厥

疑似難明

陽厥沉實

始因便閉

陽厥宜下

六一順氣

陰厥沉細

小柴

加桂

初宜利過

陰症宜溫

四逆理中

未厥

煎熱

後厥日應

厥痢不食

反食除中

四逆

加曲

知戒不終

四逆名散

和解而愈

煩滿

囊縮

厥陰之症

逆騰陰氣

小腹先疼

頭痛

脈浮

四生湯應

四時感冒

各有殊形

先看

兩尺

次察人迎

兩尺有力

人迎浮緊

此即

外感

發散先行

重則菴活

輕則十神

人參

敗毒

各宜而進

但凡身熱

俱有頭疼

忽概

為表

虛實要明

陰虛陽症

分別要真

頭痛

如劈

熱似火焚

煩渴悶亂

身汗昏沉

寸關

浮大

按指空虛

兩尺畧勝

陽虛可憑

補中

益氣

加減而應

熱甚面赤

口渴煩悶

脈微

而數

兩尺微甚

時輕時重

潮熱勿論

兩尺

沉散

寸關微數

夜重日輕

狀水爲主

燒尖

自平

陰陽虛實

依此準繩

更有鬱熱

亦當

變論

鬱症有五

木鬱爲尊

此病一作

似實

似虛

庸醫彷彿

臨藥無憑

脈似陰虛

兩尺

有神

似乎陽虛

寸關微洪

咽乾口苦

心脇

微痛

午後病重

夜後病輕

木鬱宜達

消滯

故真

以上緊要

大畧而論

餘難盡述

另

酌定

學者細心

勿忘是經

禮記

卷之

四

祭義

四

六經傳變歌

傷寒一日二日 間發熱頭痛及惡寒腰痛脉浮緩緊別此

脉從頭連腰 還無汗麻黃湯發散有汗傷風桂枝攢大

青龍湯表裏 實此屬太陽膀胱間

傷寒二日三日 內目痛身熱加一不鼻乾不睡脉來長此

脉往來洪者 是無汗惡寒用葛根有汗桂枝湯一劑便

實惡寒大柴 胡此屬陽明胃經內

二日四日病轉 深耳聾胸脇痛如針寒熱嘔逆口乾苦此

脉循脇絡耳 真中弦之脉真可見小柴胡湯可煎吞似

瘧婦人血結 類此屬少陽腑經尋

病轉四日及五日腹痛咽乾自溫的自利而渴脉微沉脉  
布脾胃絡咽噎四逆理中治臟寒腹滿脉浮桂枝人腦  
滿痰多爪疔之此屬太陰脾經脉

傷寒五日六日揆多眼口燥舌乾哉此脉絡肺繫舌本指  
下脉沉貫腎來舌乾須用小承氣不渴不乾四逆差汗  
出傷陽諸膚屬此屬少陰腎經排

傷寒六日七日到裏縮脉微煩滿貌筋急唇青四體疼脉  
尋陰氣絡肝道脉若不浮小建中浮緩如瘧各半妙囊  
縮陽毒承氣加此屬厥陰肝經與

六紅正病歌

大陽頭痛身熱脊強陽明日痛鼻乾不眠少陽耳聾

脇痛寒熱嘔而口爲之苦太陰腹滿自利尺寸沉而

津不到咽少陰則舌乾口燥厥陰則煩囊拳

一日二日可發表而散三日四日宜和解而痊五六日便

實方可議下七八日不愈又復再傳日傳二經名爲兩

感經傳六日應無一痊

大陽無汗麻黃爲最太陽有汗桂枝可先小柴胡爲少陽

之要領大柴胡行陽明之秘堅至三陰則難判定法或

可溫而或可下宜數變以曲全生意或可方而或可圓

傷寒表半裏三症用藥歌

傷寒表症是如何無汗惡寒身熱多頭痛脊強脉浮緊寸  
神湯劑汗之瘥

傷寒半表半裏詳往來寒熱脉弦長口苦耳聾兼脇痛小  
柴胡湯和之良

傷寒裏症腹心膨不惡寒來惡熱蒸其脉沉實大便結大  
柴胡湯下之生

陽症陰症

陽症身熱頭疼痛口燥咽乾常自動譫語循衣脉弦洪大  
承氣湯宜所用

陰症身涼二便清病初自汗少頭疼也無燥渴脉沉細對

子理中急須尋

陽症似陰陰症似陽

陽症身涼冷四肢小便赤少大便稀心煩口燥脉沉數白

虎湯兼竹葉奇

陰症如陽面色紅小便清消大便通渾身微熱沉遲脉真

武湯兼用理中

陽厥陰厥

陽厥時時指爪溫心煩便秘口乾論脉來沉細中還疾承

氣柴胡可煎石

陰症身涼冷四支二便通滑夜煩時脉來沉細知端的真

子理中急須尋

武湯兼四逆宜

血脈

面黃恰似烟熏色小便自利大便黑唇焦漱水血家黃桃  
仁戒氣湯堪擇

淫症黃

發黃渾似橘皮明小便不利大便行淫熱相蒸名曰疸  
陳湯共五苓平

柔瘧剛瘧

尤來瘧病屬膀胱口噤如癰身反張此是傷風感寒  
公兩瘧有柔剛

無汗爲剛須易識惟有葛根湯第一有汗爲柔端約註  
校葛根湯救急

三症皆宜續命湯剛症去桂用麻黃柔症去麻當用桂  
因此法最爲良

### 傷寒有四症相類

食積寒痰并脚氣更兼亦有患勞煩要識四般相類症不  
與傷寒一例看

### 傷寒至捷法歌

發熱憎寒體痛時脉浮無汗却急醫十神五積香薷散有

汗傷風用桂枝

汗後依前病不除二朝四日莫躊躇或用參朮或敗毒加  
些三良劑病當舒

病傳入裏腹脹滿口乾熱盛小柴管病若仍前熱泄多員  
用柴苓湯一碗

六日七日病轉熱前後不通好飲啜或有亂語及循衣大  
柴承氣可通別

下後仍前病不休黃連順芩免人憂病後虛煩熱已靜白  
虎竹葉石膏投

陽厥還須用大柴不然承氣也通揆陰厥四逆并真武二  
建加之四寸哉