

卷三湯方目

聖藥金鑑

桂枝湯

麻黃湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝加葛根

湯

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

桂枝加芍藥湯

大青龍湯

桂枝加桂湯

小柴胡湯

大柴胡湯

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承

氣湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白虎湯

麻黃附子細辛湯

四逆

散

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通

豚四逆加豬胆汁湯

當歸四逆湯

理中丸及湯

附子瀉心湯

梔子豉湯

真武湯

大黃黃連瀉心

湯 白通湯

白通加豬胆汁方

豬膚湯

甘草

湯 甘桔湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

旋復代赭

湯 苦酒湯

枳實梔子豉湯

竹葉石膏湯

燒

視散

豬胆導法

蜜煎導法

治男子新病起房內

復者方

治交接勞復陰卵腫縮入腹絞痛便欲死方

竹皮湯

療食勞方

治結胸灸法

鵲石散

驚

甲散

升麻驚甲湯

升麻驚甲去雄黃蜀椒方

梔

子仁湯

還陽湯

萎蕤湯

白虎加蒼朮湯

黑

膏以上傷寒 百合知母湯 滑石代赭湯 百合雞子湯

百合地黄湯 百合洗方 栝蘘牡蠣散 百合滑石

散以上百合 九味羌活湯 敗毒散 參蘇飲以上感冒 四時加減

柴胡方 天行熱病方 苦參湯 凝雪湯 大黃

湯 薰身法以上寒熱 五苓散 理中丸 霍亂轉筋入腹

又方 又方 廣濟高良薑湯 霍亂轉筋入腹

方 茱萸湯 灸法以上霍亂 栝蘘桂枝湯 麻黃加獨活

防風湯以上症 栝蘘瞿麥圓 滑石白魚散 茯苓戔鹽湯

豬苓湯 治諸種淋方 石葦散 胞轉方 療

小便難方

石葦散

蘇蜜煎

治石淋方

治熱

淋方

四汁飲

牛膝膏

八正散

家韭子丸

治小便失禁方

夜多小便方

豬肚丸

縮泉丸

治尿床

以上癰
閉利淋

蘭臺軌範卷三

吳江徐靈胎洄溪著

男

熾鼎和校

傷寒

素問

素熱論篇帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣也人之傷於寒也則爲病熱熱雖盛不死其兩感於寒而病者必不免於死帝曰願聞其故岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽

明主肉其脉俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也。三日少陽受之少陽主胆其脉循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟者故可汗而已。四日太陰受之太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而噎乾。五日少陰受之少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五臟不通則死矣。陰脉皆連五臟故曰入臟非風寒直入臟中也其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈。八日陽明病衰身熱少愈。九日少陽病衰耳聾微聞。十日太陰病衰腹減如故則思飲食。十一日少陰病衰渴止不滿。

舌乾已而噍十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已
矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其臟脉病日衰已矣其未滿
三日者可汗而已其滿三日者可泄而已 水熱穴論帝曰人傷
於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒甚則生熱也

兩感 素熱論帝曰其病兩感於寒者其脉應與其病形何如岐
伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩
滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫言三日則少
陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死帝曰
五臟已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰

陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣盡故死

兩感則表裏同病

溫病暑病

素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後

夏至日者爲病暑暑當與汗皆出勿止

陰陽交

素評熱病論帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾

不爲汗衰狂言不能食病爲何岐伯曰病名陰陽交交者死也帝

曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣

交爭於骨肉而得汗者是邪卻而精勝也精勝則當能食而不復

熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也

不能食者精無俾也。病而留者其壽可立而傾也。且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應此不勝其病也。其死明矣。狂言者是失志。失志者死。今見三死不見一生。雖愈必死也。

遺證 素熱論帝曰熱病已愈時有所遺者何也。岐伯曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也。若此者皆病已衰而熱有所藏。因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也。帝曰善治遺奈何。岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣。帝曰病熱當何禁之。岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也。

難經

傷寒有幾其脉有變不然傷寒有五有中風有傷寒有溼溫有熱
病有溫病其所苦各不同中風之脉陽浮而滑陰濡而弱溼溫之
脉陽濡而弱陰小而急傷寒之脉陰陽俱盛而緊瀉熱病之脉陰
陽俱浮浮之而滑沉之散瀉溫病之脉行在諸經不知何經之動
也各隨其經所在而取之傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出
而死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰
虛汗出而死下之而愈陽虛陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內
而未出也陽盛陰虛者身熱汗閉燥火內
結津液乾枯陰氣欲竭也此
以有邪處爲虛無邪處爲盛

傷寒論六經脉症

太陽病脉浮頭項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受病也其脉

上連風府故頭項痛腰脊強 發熱汗出惡風脉緩者名曰中風

惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒 發熱惡寒者發於

陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈

以陽數七陰數六也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊惡寒未離太陽陽明

病若能食名中風不能食名中寒 尺寸俱長者陽明受病也其

脉俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不能卧 陽明外証身熱汗自

出不惡寒反惡熱也邪氣已離太陽故不惡寒陽明脉大以上皆陽明之經病有太陽陽

明有正陽陽明有少陽陽明

此三條皆傳腑之症

太陽陽明者脾約是也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便秘難是也

陽明之

為病胃家實也

此正陽陽明

陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖

惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也

尺寸俱弦者少陽受病也其脉

循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾

少陽中風兩耳無所聞目赤胸

中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

傷寒脉弦細頭痛發熱

者屬少陽

頭痛發熱與太陽同而脉之弦細獨異

三陽合病脉浮大上關上但欲眠

睡目合則汗已

內熱極

傷寒六七日無大熱

外熱輕則內熱重

其人躁煩者此

為陽去人陰也

若熱輕而不煩躁則病欲退矣

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪

其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛尺寸俱沉

細者太陰受病也其脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾傷寒脉

浮而緩手足自溫者繫在太陰

同一太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉細乃太陰病脉浮緩乃太陰

本脉也

自利不渴者屬太陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩陰少

自利而渴熱入下焦也此自利而不渴寒入中焦也

少陰之為病脉微細但欲寐也

衛氣行於陽則寤行於陰則寐

少陰病欲吐不吐

心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也

尺寸俱沉者少陰

受病也。以其脉貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。

厥陰之爲病，消渴，氣上撞心，心中疼熱，飢而不欲食，食則吐衄，下之利不止。尺寸俱微緩者，厥陰受病也。以其脉循陰器，絡於肝，故煩滿而囊縮。厥陰中風，脉微浮爲欲愈，不浮爲未愈。

傷寒傳足不傳手經脉

此本陶節庵最爲明晰

足太陽脉起於目內眥，從頸下後項，連風府，行身之後，終於足。其外症頭疼項強，腰脊痛，骨節痛，惡心發熱，惡寒，標病宜發汗。但太多則亡陽，筋惕肉瞤，小便不利者，當利。自利者，不可利。利之引熱入膀胱，其人如狂，不可下。下之爲結胸。

足陽明脉起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之厲兌穴故其症目痛鼻乾不得眠頭頰痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便秘腹滿此正陽明胃腑病也宜下之

足少陽脉起於目銳眥上抵頭循角絡耳中循胸脇行身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯和解隨症加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之犯少陰脉弦數者是本經症

足太陰爲三陰經首其脉始於足大指上行至腹絡於喉連舌本
行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪入脾也嘔吐脾氣不
和也自利挾熱下利也咽乾脾脉連喉也頭不疼陰脉至頸而還
也身微熱手足溫表邪解而傳入裏也身目俱黃標病宜平熱腹
滿硬痛渴而喉乾小便赤大便難本病雖宜下然當分寒熱施治
足少陰脉始於足心上行貫脊循喉絡舌本下注心胸行身之後
也其病手足乍冷乍溫身不熱者標病二便不通舌乾口燥者本
病此經本熱而標寒也宜急下以存腎水雖自利此是飲湯水所
致不可疑爲寒也初病大熱至此變爲厥冷者是熱深厥亦深也