

許氏醫書五種

傷寒論方合解目錄

卷首

張仲景原序

許星東自序

許綏之序

凡例 二十八條

有關傷寒論雜說 五則

卷一

辨太陽病脈證 四十一條二十方

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

卷二

辨太陽病脈證

八十一條二十七方

桂枝加厚樸杏仁湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚樸生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚樸湯

梔子乾薑湯

真武湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

桃仁承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

卷三

辨太陽病脈證

五十九條二十七方

抵當湯

抵當丸

大陷胸丸

大陷胸湯

小陷胸湯

蚊蛤散

白散

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯 黃連湯

桂枝附子湯 桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯 白虎湯

炙甘草湯

卷四

辨陽明病脈證 八十二條十方

大承氣湯 小承氣湯

猪苓湯 蜜煎導法

土瓜根猪膽汁導法 茵陳嵩湯

吳茱萸湯 麻仁丸

梔子蘖皮湯

麻黃連軹赤小豆湯

卷五

辨少陽病脈證 十條

辨太陰病脈證 八條二方

桂枝加芍藥湯 桂枝加大黃湯

辨少陰病脈證 四十五條十四方

麻黃附子細辛湯 麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯 附子湯

桃花湯 猪膚湯

甘草湯 桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

通脈四逆湯

四逆散

卷六

辨厥陰病脈證

五十五條六方

烏梅丸

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人參湯

白頭翁湯

辨霍亂病脈證

十一條三方

四逆加人參湯

理中丸

通脈四逆加猪膽汁湯

辨陰陽易差後勞復病脈證

七條四方

燒裨散

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

辨痙溼暍病脈證

十六條按此篇非傷寒之正論以其與傷寒相似故仲師附於

篇末後賢疑是王叔和從金匱移入於此誤也

張仲景傷寒論方卷二

蜀北射洪許宗正星東合解

堂叔大履綏之校正

辨太陽病脈證篇

太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解宜桂枝湯

凡太陽之爲病外證未解者當以汗出而解然有輕重之不同宜於脈上分別若脈浮而弱知邪輕不能與正相搏也宜桂枝湯若脈緊數旣成則非桂枝湯所宜必用麻黃輩乃能了事按當以汗解四字宜在脈浮弱者之上漢文多有此等倒置句

法不可不知

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚樸杏仁湯主之

太陽病當以汗解者醫誤下之則太陽之邪陷入胸中阻呼吸而作微喘此由表邪未解而誤下之故也宜桂枝湯甘溫解表加厚樸苦溫以驅內陷之邪杏仁宣通肺氣以降逆也

桂枝加厚樸杏仁湯方

卽桂枝原方加杏仁

五十枚

厚樸

二兩炙去皮後同

右七味以水七升微火煮取三升去渣溫服一升

覆取微似汗

歌曰桂枝加樸杏仁湯一料桂枝二樸量五十杏仁

將水煮外邪內陷喘家良

太陽病外證未解不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯

太陽病外證未解者不可下也若誤下之雖無氣上衝脈促胸滿利遂不止微喘諸證然總爲醫治逆也審其邪欲從外解者仍宜桂枝湯按仲師或言表證或言外證者是因其詞句之順而卽言之非有二義也前賢誤會其理謂皮膚爲表肌腠爲

外紛紛論是一盲引眾盲也

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯

太陽病先發其汗頭項強痛惡寒不解當用復汗之法以解之粗工不審其不解之由又不知先師有復汗之義而復竟用承氣等下之診其脈得太陽之浮者知下之病必不愈何也脈浮爲病在肌表之外而反下之以攻其裏故令病不能愈今既下之其脈仍浮故知病猶在外當須解其外邪則

愈宜桂枝湯以復取汗
太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證
仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者
必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

太陽寒邪與正氣相搏則脈浮而緊寒束皮毛則
無汗太陽標陽不通則發熱寒傷經氣則身疼痛
病勢至此用麻黃湯可愈也醫不用麻黃湯延至
八九日不解太陽表症仍在此雖日久亦當用麻黃
湯發其汗今服湯藥已汗出表證微除然發熱已
久陰液耗傷汗爲心液取汗則心液愈傷故其人

即發煩陰枯不榮於目故目欲瞑劇甚也其陰傷甚者必為熱逼經絡之血由鼻而出曰衄衄汗同源今汗竭而衄出則經絡之邪隨衄出乃解所以然者因太陽陽氣久鬱不得由汗而通日銷陰液陰液消則陽氣愈重故有此證也此言早用麻黃湯則免於此症非謂衄後已解猶可復用麻黃湯也

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

太陽邪盛則脈浮緊陽盛陰弱則發熱而不惡寒邪鬱不宣故身無汗此證本當汗出而愈今未得

汗而衄自出此陰絡已通邪隨衄解故知不待汗出而必愈也按此可與熱結膀胱血自下者愈同
一例看

二陽併病太陽初得病時當發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣拂鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣拂鬱不得越當汗不汗其人煩躁不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇