

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣目錄

頭部

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

額疽

勇疽

鬢疽

天疽銳毒

耳後疽

耳發

耳根毒

玉枕疽

腦後發

腦鑠

油風

白屑風

禿瘡

螻蛄癬

髮際瘡

面部

顴瘍

顴疽

顴疔

面發毒

面遊風

疥腮

頰瘍

骨槽風

發頤

時毒

鳳眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎髭毒

燕窩瘡

雀斑

黑痣

黑黑肝黧

御纂醫宗金鑑卷六十三

編輯外科心法要訣

百會穴在頂中央自面側觀之正對耳尖



頭部

百會疽

百會疽在顛頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實清毒火平場陽虛溫補怯腫連耳項動痰聲七日不潰命必絕

註

此百會疽又名玉頂發生在顛頂正中屬督脈經百會穴由膏粱太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬如鐵高尖紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎

寒壯熱大渴隨一飲隨乾口苦唇焦便秘煩躁
脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒飲以
清毒火外敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬
響痛根散惡寒便瀉脈見細數者此屬陽虛
宜服十全大補湯以溫補之外敷回陽玉龍
膏若面赤過煩口乾不渴唇潤者此屬陽虛
浮泛宜服桂附地黃丸引火歸源更用生附
子餅置兩足心涌泉穴各灸五壯以洩其毒
初起貼琥珀膏已潰糝黃靈藥太乙膏蓋貼

腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如
拽鋸七日無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒飲

蘇木 二分

甘草 三分

陳皮 二分

桔梗 五分

黃芩 五分

黃蘗 五分

人參 三分

藁本 五分

防已 五分

防風 四分

知母 四分

羌活 一分

獨活 四分

連翹 四分

黃連 一錢

生地黃 四分

黃耆 二錢

澤瀉 二分

當歸尾 四分

水煎食遠溫服

方歌黃連消毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘

草陳皮桔苓蘘人參藁二防知母羌活獨活

等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後

最忌飲寒涼

冲和膏

回陽玉龍膏

俱見腫瘍門

生肌散

十全大補湯

黃靈藥

太乙膏

俱見潰瘍門

桂附地黃丸

附子餅


見前灸法

琥珀膏

見後髮際瘡

透腦疽侵腦疽圖

透腦疽生在百會穴前顙會穴前



侵腦疽生在透腦疽前側下五處穴

透腦疽

透腦疽生百會前形如鷄子痛而堅軟漫膿稀虛塌陷紅硬膿稠實腫尖

註

此證生於百會穴之前顙門之際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如鷄子堅硬疼痛瘡頂塌陷根脚漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂尖膿稠者屬實速潰者順遲潰透腦髓者逆其腫潰內外治法俱按百會疽

侵腦疽

癰疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順紫逆要審詳

註

此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠟者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根脚散大者屬氣血兩虛逆而難治初起宜服荆防敗毒散汗之次服內疎黃連湯下之將潰服托裏透膿湯已潰服托裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷冲和膏其餘內外治法俱按

癰疽潰瘍門

托裏透膿湯

人參

白朮
土炒

穿山甲

炒研

白芷
各一錢

升麻

甘草節
各五分

當歸
二錢

生黃耆
三錢

皂角刺
一錢五分

青皮
炒五分

水三鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後

熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中

部藥內兌酒半鍾熱服

方歌托裏透膿治癰疽已成未潰服之宜參朮甲

芷升麻草當歸黃耆刺青皮

荆防敗毒散

見項部腦疽

內疎黃連湯

冲和膏

俱見腫瘍門

托裏排膿湯

見項部魚尾毒

琥珀膏

見髮際瘡內