

慎柔五書卷五

石 震瑞章父訂正 瘦樵程永培校本

顧元交勇尹父編次 周學海健之評注

醫案第五

風例

金壇孝廉蔡長卿令堂年六十餘六脈俱數八至按之中沈則滑而實惟肝腎二脈洪大而虛經曰數則爲熱滑則氣有餘而血不足此陰虛陽陷菴極而暴亂者也外證則唇欠目劓手搐身搖面色紅白不時徧身熱火攻刺自言心中昏悶四肢浮腫硬堅此皆風火搖動之象陰虛陽亢之症正經所謂熱勝則腫風勝則動也宜滋陰抑陽用四

物湯以養血爲君。加山藥以扶中氣爲臣。佐山萸以助陰養肝。使黑柏二分以引經。陳皮理胃氣爲俾佐。服二劑。診之數脈退去一至。又服四劑。又退一至。而昔日之虛洪稍收斂有神矣。外證四肢腫硬漸平。攻刺亦無心中不言昏悶。又四劑。前之硬滑俱已空輒。數亦更減。然眞陽未復。邪火未盡退也。以六味丸料四兩作一劑。頓服之。腎經洪大脈全斂。而火退矣。復因夜閒取涼太過。至下午覺身寒。唇昏紫黑。此邪火退而陰陽俱虛。急用人參三錢。白朮一錢。甘草三分。白茯苓二錢。當歸二錢。附子一錢八分。官桂二分。服之一茶盞。前方已非全合此方更非針對其愈者倖也。本人體壯非藥之功。覺身大熱。口乾。時索水飲。發熱此眞氣

虛不相合和降不下故也至初更診之六脈俱細急短數略無和氣予甚危之至明日再診則有神氣尙有六至餘此陰陽未全克復元氣未充耳教以朝服六味一錢五分日服補中湯數十劑而愈

劉某夫人年及三十稟體元弱未病十日前身如舟中行後忽遍身痛臍下痛牙關緊不言目瞪汗出大小便不通身熱此下寒上衝血隨氣逆相搏而不得降也延予視之診其脈俱浮細來往不定一息十餘至重按則無退而思之外證皆屬陽虛脈又無神臍下痛甚目瞪至死而醒陽和之氣欲絕而胃氣虛升降失司故大小便不通且東垣云裏虛則急以此思之則內外俱虛宜先建中將四君去扶

卷五
荅加歸芪各二錢。熟附二分。午時服一貼。遍身痛稍緩。而小便溺矣。申時又進前劑。汗止。遍身痛已。大便亦通。但臍下痛不減。及兩脇痛。此陽虛也。寒甚也。又加附子五分。臍痛止矣。但大便了而不了。有欲出而不出之狀。正東垣所謂血虛加當歸身一貼而愈。

李子才年四十餘。素性暴。忽因怒卒暈倒。必怒未得泄脈浮

中無沈。按數六至此。陽虛陷入陰中之證。以補中益氣加六味丸料少許。四貼而愈。

一少年忽不思食。惡心。偶逢文期。强作文。一日晚。卽頭暈作嘔。余脈之二寸洪緩。以爲勞碌而動心火。遂以加味逍遙散二劑。嘔不食。病亦不減。其年正二三四月。淫

雨○此○溼○勝○而○然○也○

此溼從上受過其清陽

以○太○無○神○尤○散○一○劑○卽○

不○嘔○惡○第○頭○暈○未○除○二○寸○脈○猶○如○故○其○脈○狀○有○燄○燄○欲○
發○之○意○用○前○剂○加○紫○蘇○防○風○取○微○汗○頭○暈○除○脈○亦○退○第○
不○思○食○耳○六○君○子○一○剂○飲○食○如○常○

周○近○菴○令○愛○年○十○九○左○耳○下○紅○腫○發○熱○作○痛○脈○之○六○部○
俱○數○八○至○無○神○且○素○弱○經○水○不○調○予○曰○此○運○氣○病○也○以○
小○柴○胡○合○四○物○加○牛○蒡○子○內○黃○芩○用○酒○炒○四○剂○而○愈○
此病

曾治之輕者此方恰合

近○菴○令○子○室○年○二○十○餘○兩○耳○下○俱○紅○腫○痛○甚○發○熱○其○狀○
可○畏○醫○者○以○大○黃○行○數○次○又○用○敷○藥○反○覺○坐○臥○不○安○亦○
運○氣○病○也○診○之○六○脈○俱○細○數○少○力○惡○心○不○食○先○以○人○參○

敗毒散一劑以發之。又用甘桔加牛蒡射干陳皮半夏
含漱之。次將小柴胡湯內加牛蒡六劑而腫消。飲食猶
未貪。異功散加牛蒡四五劑。脾胃健而全愈。

馬山徐雲所六月受熱受勞。又飲酒。忽上膈不寬如刺
痛。頭暈且重。自以過食。曾以指探吐。卽枕不得。惟坐而
已。予診之。三寸俱洪。緩有力。關尺俱弱。帶絃。此溼熱上
干清陽之分。故頭暈重。胸膈痛。此時症耳。用平胃加半
夏黃芩紫蘇木香。取微汗。此症卽退。就枕平復。

淮安客年三旬外。季夏患瘧瘧。單熱不寒。連日發。於午
後熱躁譫語。至次日天明纔退。數日後忽腹痛。晝夜無
閒。勻水不進。呼號欲絕。遇瘧發時。卽厥去。延醫治之。投

藥皆不效。求余診脈。絃細而濡。余謂絃細爲虛。爲暑。而濡爲溼。蓋暑邪爲瘧。溼熱乘虛內陷。而腹痛。用酒炒白芍炙草五分。水煎。調下天水散五錢。服後腹痛如失。次日瘧亦不發。此案看似尋常。實非老手不辦。論證用藥。均極堅實。第痛厥皆屬血滯。似宜酌加桃仁丹

痢例

甲辰閏九月閒。天氣寒熱不時。痢者甚眾。予四弟永穆年二十七歲。忽患痢下紅。腹痛後重。已三日矣。來取藥。付以芍藥湯一貼。香連丸二服。不止。反增。心口如刀。剗當臍腹痛。肛門痛亦劇。聲撼四鄰。自分必死。告母決別。因整囊往鄉視之。晝夜不得臥。次數難定。日下紅血一

桶痛不可忍。發熱流汗不食。脈之六部皆豁大。浮中沈無力。四至。予曰。雖痛。雖發熱。脈無力。已虛寒矣。古人云。脫血益氣。此證正宜。遂用異功散。加升麻三分。木香五分。炒乾薑五分。一劑。去後覺疎。痛亦可忍。至五更。腹痛如前。予曰。此藥力盡也。急煎一劑與之。比前愈疎。痛亦減七八。卽酣睡。至日中方醒。云不甚好過。予又曰。此藥只能支持一覺。再煎與之。遂安寢。至晚痛止。後重亦可。還服前劑而愈。一二日後。因喫雞肉。仍前腹痛。肛腫。穢下不止。第三日。病勢篤極。復報予診之。脈三至。餘浮無。沈按之。則大。脾命脈微。與補中益氣湯不應。此虛脫之甚。加御米殼一錢。亦不應。下如洞泄。流汗發躁。尺脈漸

欲收斂。予亦慌急。令人二更後往城取參。至早歸。補中

益氣。加人參二錢服之。下咽覺憤。參能令人憤。淫熱內盛者尤甚。歷試驗之。

此正氣欲復。邪氣欲退也。頃之精神頓增。痢稍緩。恐再

作。又一劑下注。昏憤發熱躁。諸症漸緩。脈亦有神。短脈

退。尋思久之。古人云。久泄久痢。湯劑不如丸散。卽合參

苓白朮散。與服。覺疎下。至下午復躁熱。予再脈之。左尺

洪如火射狀。此陰虛火動之象。與加減八味丸至六十

丸。精神覺爽。頃之又下八九十九。睡至天明。病去十七

方。信立齋師加減八味丸治水涸之症。卽令朝暮服此

丸。復合參苓白朮散。漸愈。覺小便痛。想動色事故耳。服

以逍遙散。門冬五味子而平。此病動色而不死。必體實而邪氣仍非深重者。前敘

證似未協。細審尺脈收縮。當是血去痰生。痰伏下焦。尺脈洪射。當是下陽乍復。與痰相激也。

王春元二令郎年甫七歲。久患赤痢。消導削積之劑已服過多。後轉下白如涕。渾無糞。診之浮中沈六脈俱虛。無神。三五不調。外症手足俱冷且硬。面浮齒白。懶語。此陽氣虛寒之症。宜溫補脾胃以生肺金。用補中益氣加炮薑官桂各二分。其閒人參止用三分。且陳腐不堪。服四劑。手足略輒。言語亦健。第未溫耳。其下白仍不減。亦虛寒滑脫危症。宜補宜澁。宜溫。復用前藥。加好參五分。大附二分半。御米殼一分。服一劑。則足已溫。大便卽有糞。白退十八。自茲手足俱溫。輒泄自全止。還服前方。去御米殼。附子二味。予歸囑以如身中已溫暖。薑桂亦去。

後服參苓白朮散以培中氣。使來歲乙巳厥陰風木之氣不能制飲食尤宜慎之。

予友薛理還僕遠行忍飢。又相毆脫力。時五月初。遂發熱。詰語以補中益氣及五苓數劑不效。延予診之。六脈俱無。乍有則甚細。其外症則面赤。譫語口碎。一友曰。陽症見陰脈。證在死例。予曰。當以陽虛從脈捨症治之。遂下附子理中湯。冷服二貼。脈稍見。四貼則脈有神。而口碎愈矣。六貼則脈如常。但譫語未已。予曰。脈氣已完復而譫語不休者。胃有燥糞。宜以膽導導之。果下燥結。譫語遂平。

此證若大便滑易者。有瘀血也。以桃仁下黑糞。

馬見源精神素弱。且勞甚。餓時喫冷肉一塊。遂不快。發

熱譫語作狂。乃飲食勞倦之症。鄉醫先汗一次。不退。又

下三四次。便倦怠昏沈。不思飲食。吐痰。晝夜不寢。素無痰而

忽吐痰者。肺胃筋膜內傷也。多由飲食勞倦。宜堅筋以復其力。痰發於筋膜者也。筋膜傷而溼困之。則痰常多。

筋膜傷而火激之。則痰暴涌。凡治痰欲除根本。在補血養筋而堅之。筋力堅強。自液不外洩。下多亡

陰。中氣大虛之故。迎予診。六脈俱有四至。洪緩無力。缺

至半夜。反加吐痰不已。起復診之。六脈

俱細。此邪氣已去。真陰欲還。陽虛反發躁之象。急用六

君加薑桂各三分。服卽成寢。至明午方喚醒之。又一劑。

欲睡不醒。精神反覺懶怠。邪氣盡退。而正氣將復矣。至

下午喫米湯一鍾。口知穀味。再用補中加乾薑桂門冬

五味而瘳。

脾胃例

孝廉王於鑒父年六十餘。六脈俱絃牢。右三關浮中沈甚。豁大左三略差。外症晚則作飽。且大便秘利。此土受木制。脾胃不輸津液。中氣虧損之候也。宜補脾胃生肺金。乃用補中益氣湯加官桂以削木之剋制。炮乾薑以溫脾胃徹沈寒。山藥山萸佐當歸以養陰。麥冬五味驟收肺金以生新水。服二劑。覺胸中稍寬。身中反有眩意。此正氣欲復。而邪漸退。故瞑眩耳。又服數劑。復診之。則牢堅已去。第二尺俱洪。此真陰真陽並虛。當平補之用。八珍晚服六味丸。大腸漸潤。再數劑全愈。

邱生年十八歲。正月閒過食麪餅湯麪。遂不快。發熱頭

痛邀予診之。脈略緊。中沈洪滑。曰當先除去風寒。以九
味羌活湯一貼。寒熱頭痛悉失。但覺不快耳。予適他去。
彼延別醫。用柴平湯一貼。病不減。晚歸診之。脈洪汗出。
而腹痛甚。不可按。以元明粉泡湯下。導滯丸二錢。其痛
減半。尚有脹。再用前丸一劑。而飽脹如脫。但腹痛耳。復
增瘡狀。諸症皆胃中有死血也。何不重加桃仁於劑中。予又診之。六脈俱細。絃
此脾土受木乘。又被伐之過。宜用溫補。以理中湯二劑。
肚痛除。又以過食復飽。診之。絃細如前。仍以前湯。但溫
脾胃。而食自消。諸症去。

湯如玉母懷七月而生。後每大便甚艱。須二三時方安。
百治不效。予謂肺腸氣血不能吹送。欲來不來。乃脾虛。

也。脾主信。欲來不來。無信也。當補脾肺。使各施其令。而

吹噓之氣自如。調理數月而愈。

每見雞雛初生。當肛門內。猶一片色如卵黃。是

人物之生。以腸胃爲最後。七月而生。腸力未全。必有補血堅筋強力固腸之法。隨時進退。與之終身。

一婦年五旬。二寸浮洪。二尺小。右關弦。不思食。頭眩。余

曰。二寸浮洪。病主頭眩。亦主上膈不清。此陽氣虛而越上。不能歸根復元。以致丹田氣虛寒。不能養溫脾胃。是

以右關脈弦。飲食不消而少殮也。理宜斂陽氣歸於下

焦丹田之內。下焦溫暖。脾胃自健。水穀自化矣。用桂枝

白芍六分。五味子二分。白茯苓一錢。黑薑三分。人參五分。

杜仲一錢。破故紙五分。炙草四分。湯泡半夏一錢。加煨

姜十餘劑而愈。

蔣懷幼年六十素吐白沫已數十年矣忽喉中有噎意以白子曰此脾胃虛寒也宜用人參調補中氣彼辭以貧窶自將白糖薑汁熬化含吐及六七日則溏泄日五六次神亦勞倦食亦不貪延視之六脈皆二至來三五至則止如雀啄之狀此元氣大虛不能噓吸周迴耳用六君子加肉桂四分吳萸二分乾薑二分二劑則脈連續而不止又二劑反加浮洪粗大數七八至發熱口碎舌碎乃虛陽上越之證予思之脈已犯難治之例且吐沫不止腎水泛脾虛失統也用缺病亦稍退稍勞卽復服數劑復減再勞又如故至兩三月後藥亦不受亦不效五六日而歿先賢云粗大之脈難治書此以證之