

赤水玄珠

卷十三

赤水玄珠第十八卷目錄

痰證

傷食

虛煩

腳氣

傷寒用藥法則

六經用藥法

傷寒看證大畧

一提金脈要

截江綱論脈

傷寒撮要論脈

六經圖正治法

煎藥法

刲病法

製藥法

目錄終

赤水玄珠第十八卷

新安生生子孫一奎著輯

痰證

外證增寒壯熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息頭不疼項不強若涎多者亦隱隱頭疼脉有寸浮者亦有寸伏者以意參之柴胡半夏湯金沸草散大半夏湯氣上衝瓜蒂散吐之此亦風痰證也如食積痰虛損痰不用此藥

傷食

亦頭疼惡寒身熱但左手脉和平右手脉緊盛知爲食大橘皮二陳湯心腹滿脹大柴胡湯下之胸滿嘔吐者瓜蒂散吐之亦夾食傷寒也全傷食者恐不可用柴胡

虛煩

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不疼身不痛爲異耳
表既虛不可汗裏不實不可下叔和云虛煩有熱不可攻

腳氣

傷寒傳足不傳手所以寒濕之氣蒸于足發則類傷寒其
証頭疼身熱肢節痛大便閉或嘔但初病時起于脚膝
屈弱不能移動爲異耳感於寒所患必冷越婢小續命
湯入生姜汁最妙感于暑所患是熱小續命去附子減
桂一半脚腫木瓜散梔榔散大便秘脾約丸

論傷寒用藥法則

標本達從之既明五劑之藥須用識且如表汗用麻黃無
葛白不發吐痰用瓜蒂無豉不湧去實熱用大黃無枳
實不通溫經用附子無乾姜不熱甚則以泥清水加葛
白煎之竹瀝無姜汁不能行經絡蜜導無皂角不能通
秘結非半夏姜汁不能止嘔吐非人參竹葉不能止虛
煩非小柴胡不能和解表裡非五苓散不能通利小便
非天花粉乾葛不能消渴解肌非人參麥門冬五味不
能生脈補元非犀角地黃不能止上焦之吐衄非桃仁
承氣不能破下焦之瘀血非黃蓍桂枝不能實表間虛
汗非茯苓白朮不能去濕助脾非茵陳不能去黃疸非
承氣不能制定發狂非枳桔不能除痞滿非陷胸不能

開結胸非姜活不能治四時之感冒非人參敗毒不能
治春溫非四逆不能治陰厥非人參白虎不能化斑非
理中烏梅不能治蠉厥非桂枝麻黃不能除冬月之惡
寒熱隨汗解非姜附湯不能止陰寒之泄利非大柴胡
不能去實熱之妄言陰陽咳嗽上氣喘息用加減小青
龍分表裡而可汗下此傷寒用藥之大法也

陰經用藥格法

太陰脾土性惡寒濕非乾姜白朮不能燥濕也
少陰腎水性惡寒燥非附子不能溫潤

厥陰肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此經常之道

治傷寒看證大畧

凡證有頭疼惡寒皆是傷寒無則皆否也何則蓋傷寒則惡寒傷食則惡食理固然也但風從上來脉先受之寒從下來陰先受之風與寒常相因感冒之時則又不同及其証之外見者則一也

一提金脈要

人之陰陽即爲先天人之氣血即爲後天脉者非血非氣乃血氣之先跡營行之道路又問曰既知先後天之脉理須明持脉之要曰舉曰按曰尋三字若此不明即陰陽表裡虛實何以別之持脉者輕手循之曰舉重手取之曰按不輕不重委曲求之曰尋

截江綱論脉

雜病以絃爲陽傷寒以絃爲陰雜病以緩爲弱傷寒以緩爲和兩手無脉曰雙伏一手無脉曰單伏必有正汗也寸口陽脉中或見沉細者但無力者爲陽中伏陰尺部陰脉中或見沉數者爲陰中伏陽寸口數大有力爲重陽尺部沉細無力爲重陰寸脉浮而有力主寒邪表實宜汗浮而無力主風邪表虛宜實尺脉沉而有力主陽邪在裡爲實宜下無力主陰邪在裡爲虛宜溫寸脉弱而無力切忌發吐尺脉弱而無力切忌汗下初按來疾去遲名曰內虛外實去疾來遲名曰內實外虛尺寸俱同名曰緩緩者和而生也汗下後脉靜者生躁亂身熱者死乃邪氣勝也溫之後脉來歇至者正氣脫而不復

生也純絃之脉名曰負負者死按之解索名曰陰陽離
離者死陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

傷寒撮要論脉

左右手脉俱急緊感是夾食傷寒右手脉來空虛左手脉
來緊感是勞力傷寒左手脉來緊右手洪滑或寸脉沉
伏身熱惡寒隱隱頭痛喘咳煩悶胸脇肺痛是夾痰傷
寒左手脉來緊濶右手脉沉數心胸脇下小腹有痛處
是血鬱內傷外感六經圖及傷寒撮要一提金六經正

治捷法

足太陽經委中穴在腘中央約紋動脈陷中腘中央即膝
後相對腿灣中也目內眞在面前眼內邊神庭在中間

額上額額角也

目内背

神庭

額

玉枕

風府

委中

至陰



此圖玉枕至陰二穴膀胱經穴也風府穴督脈穴也膀胱
與督脈會于頂顱連於風府太陽症項強故併及之
足太陽膀胱經圖頭爲諸陽之首故多傳變受病爲先也
其脈起於目內眞從頭下至項連風府行身之背終于
足也其証頭項痛項強腰疼骨節痛經曰太陽頭痛脉
浮項背強而惡寒嘔逆身疼或已發熱或未發熱者俱
宜發表不可輒下之表邪乘虛內陷傳變不可勝數又
不可利小便利之則引熱入裡其害不淺若本病煩熱
小便不利者乃利之則不禁如小便自利如常則不可
利也凡有汗不得再發汗汗多不得利小便

足太陽起于目內眞上額過神庭彎至玉枕過項夾背脊

由後廉而下至小趾外側至陰穴止

太陽經見證法

假如先起惡寒者本病已後發熱者標病若有一毫頭痛惡寒身熱不拘日數多少便宜發散自然熱退身涼有何變証

此處寒熱標本指病之先後言上文本病煩熱之本字指六經標本言不可混看

辯証法

表裏自汗者爲風傷衛氣宜實表裏實無汗者爲寒傷營

血宜發表

診脉法

診脈大凡皮膚之上輕手按之便得曰浮脉浮緊有力爲傷寒脉浮緩無力爲傷風

用藥法

冬月正傷寒用升陽發表湯即加減麻黃湯冬月傷風用
踈邪實表湯即加減桂枝湯春秋無汗用姜活沖和湯
發表有汗用加減冲和湯實表腹痛小建中湯痛甚桂
枝加大黃湯夏月無汗用神朮湯有汗用前加減冲和
湯

陽

足陽明經



梁丘穴在膝蓋骨上二寸

此圖神庭穴督脈穴也陽明經神庭過故載之
足陽明胃經圓乃兩陽合明于前也一曰府者居中土也
萬物所歸也其脉起于鼻額上頭額絡于目循于面行
身之前終于足也經曰傷寒二日陽明脉大又曰尺寸
俱長者陽明受病也

足陽明起于鼻兩傍上頭維從乳中近外傍而下前廉梁
丘穴至大趾次趾之端厲兑穴止

陽明經見証法

頭額痛目痛鼻乾不眠微惡寒是足陽明胃經受病假如
先起目痛惡寒身熱者陽明經本病已後潮熱自汗讝
語發渴大便實者正陽明胃府標病夫本宜解肌標宜