

傷寒撮要

影印古本醫學叢書之二
上海中醫書局發行

新出版中醫叢刊第一輯

秦伯未著 本書分三篇。上篇爲文字之攷訂。中篇爲訓詁之攷訂。下篇爲句逗之攷訂。繁微博引。透闢精純。讀內經者得之。真有撥雲霧而重見青天之象。

實中醫界最新之名著也。

◎內經類證 一冊定價六角

秦伯未著 本書集內經論病各文。分類編纂而成。凡五十篇。六百餘目。學者得此。即可知內經中有何種病。每病有者也。

◎難經註疏 一冊定價八角

日本玄醫著 本書博採難經學者之註釋。擇尤量編。後附作者學說。用意多發前人所未發。中國醫學院。曾經選用爲教材。本。實難經中之第一善本。而非吾國作家所能及也。

◎日本漢醫傷寒名著 一冊定價六角

日本栗園淺田著 本書係栗園淺田所著傷寒翼方等合刻本。從大處落筆。作傷寒論全書之烏瞰。語多扼要。方亦親切。成賦體。分門別類。爲初學者習誦之善本。研究仲景者不可不讀之奇書也。

◎溫病賦 一冊定價二角

姜子房著 本書根據吳氏溫病條辨。撰成。至造句流麗。對仗精巧。尤其餘事。

一冊定價六角

◎醫學筆麈

一冊定價四角

王肯堂著 本書係王氏鐵圓齋筆麈中選輯而成。筆塵一書。四庫全書會采藏之。

保嬰之常識。爲醫者得有幼科之經驗。上卷爲鞠養類。凡十五法。下卷爲胎疾類。凡六十七法。末附補遺。專載難證瘡瘍等。凡五十三法。真保嬰之指南也。

◎幼科易知錄 一冊定價五角

吳浴堂著 本書目的。在使家庭中得有保嬰之常識。爲醫者得有幼科之經驗。上卷爲鞠養類。凡十五法。下卷爲胎疾類。凡六十七法。末附補遺。專載難證瘡瘍等。凡五十三法。真保嬰之指南也。

◎傷科大成 一冊定價三角

趙竹泉著 本書專載傷科之經驗。分察吉凶法。接骨法。及傷科實驗祕方等。本。極不易見。得此可無憾矣。

◎膏方大全 一冊定價三角

秦伯未著 本書係秦氏十年來對於擬製膏方之結晶。上篇爲通論。分意義效力十項。下篇爲選方。有咳嗽吐血遺精瘕聚經帶求嗣等十六項。

◎怪疾奇方 一冊定價三角

費伯雄著 本書所載。病無不怪。方無不奇。足供一切醫書以外之參攷。凡一百四十七病。一百五十二方。實中醫界未有之秘笈也。

全書十冊有裝精緻四部定價每匣一元

上海東一路A號中醫書局印行

傷寒撮要卷三

目錄

發頤

自汗

盜汗

頭汗

手足腋下汗

畜血

衄血

吐血

便血

兼便膿

熱入血室

手足厥逆

藏厥

動氣

藏結

下利

協熱下利

小便不利

小便自利

小便數

渴證

嘔證

吐證

呃逆噦噫

喘急短氣

頭眩

咳嗽

煩躁懊憹

傷寒撮要卷三

蒲城王夢祖竹坪編輯並註

桂林張琮石鄰重鐫

發頤

謹按

醫宗金鑑。傷寒頤毒。皆因汗下失宜。熱毒挾少陽相火上攻而
成也。若其人陽氣素盛。則高腫焮紅疼痛。易於成膿。為順宜連
翹敗毒散。散之。或其人陽氣素虛。或服冷藥過多。遇鬱熱毒伏
藏在裏。內攻神昏。外毒漫腫。肉色不變。不疼不硬。則難治也。毒

伏未發之前。往往似三陰亡陽之證。脉隱不見。乘汗淋漓。肢冷若冰。但身輕目睛了了。煩渴不大便。指甲紅紫為異。此毒發始臨治不可忽也。

陳素中辨證曰。傷寒汗出不徹。熱遺少陽。結於耳後或耳下。其形鞭腫者。曰發頤。速宜消散。緩則成膿為害。頤屬陽明經部分。發於頤藥中。必加白芷葱白以通陽明之經。慎不可外敷寒涼藥。

連翹敗毒散

即局方涼膈散

方見兩感門

亦名清涼散。治實熱諸

證

自汗

李士材曰。自汗惡風寒者。桂枝湯。方見六經 惡寒自汗表虛。

證治門

也。小建中湯。方見頭痛門 或黃耆建中湯。方見背惡寒門

自汗不惡風寒。

表證罷裏證實也。承氣湯。方見六經

證治門

汗多小便利。必津液竭。

大便雖硬不可攻。宜蜜導。用蜜於銅器中微火熬。稍凝攏之。勿令焦。皂角末少許和入。乘熱捻作棗子樣。冷納谷道中。

自汗而渴。小便難。五苓散。

方見發熱門

汗多。

不止曰亡陽。桂枝附子湯。

方見身痛門

外用白朮藁本川芎白芷各一兩。牡蠣粉米粉各二兩。細

未紗囊周身撲之

謹按

醫宗金鑑。自汗在太陽。謂之風邪。桂枝證也。在陽明。謂之熱越。

白虎湯

方見兩

證也。若大熱蒸蒸汗出過多，則宜調胃承氣湯。

方見六經
證治門

經

急下其熱而救其津液也。設更兼發熱下利不休，內

外雨脫必凶

陳素中辨證曰。自汗者不因發散而自然汗出也。自汗出小便
難。脉沉者桂枝附子湯加茯苓。自利厥逆大汗出者四逆湯。

方見六經

溫熱病誤服表藥

大汗出煩渴不止

脈洪大者

白

證脈門

虎湯主之。若發熱而下利自汗不止者死。若大汗出其熱反盛。

狂言不食者死。汗出髮潤喘而不休者死。汗出如珠者死。

盜汗

張仲景論曰。微盜汗出反惡寒者。表未解也。宜小柴胡湯

方見

辨

陽明證脈浮者必盜汗出也。

門

陽明證身熱目疼鼻乾不眠。脉洪而長。若浮則盜汗出也。

當歸六黃湯

方見剛痽
柔痽門

主之

李士材曰。盜汗者邪在半表半裏。膽有熱也。

張景岳曰古法云自汗屬陽虛腠理不固衛氣之所司也人以
衛氣固其表衛氣不固則表虛自汗而津液為之發泄也治宜
實表補陽盜汗屬陰虛陰虛者陽必腠之陽蒸陰分則血熱血
熱則液泄而為盜汗也治宜清火補陰此其大法也然自汗亦
有陰虛盜汗亦多陽虛如遇煩勞大熱之類最多自汗或以飲
食之火起於胃或以勞倦之火起於脾或以酒色之火起於腎
皆能令人自汗若此者謂非陽盛陰虛而何又若人之寤寐總
由衛氣之出入衛氣者陽氣也人於寐時則衛氣入於陰分此

又曰汗發於陰而出於陽其根本則由陰中之榮氣其啟閉則

由陽中之衛氣。凡欲疏汗而不知榮衛之盛衰。禁汗而不知橐籥之牝牡。其猶盪舟於陸而駕車於海耳。

頭汗

謹按

醫宗金鑑頭汗出剝頸而還則為熱不得外越上蒸於首也或因黃鬱未發或因溼家誤下或因水結胸蒸或因火劫熱逼或因陽明蓄血或因熱入血室皆令成之分門施治可也

李士材曰陽氣上騰頭汗出譖語宜承氣湯

方見六經證治門

心下

滿頭汗出水結胸也小半夏茯苓湯

方見結胸門

頭汗出剝頸而

還小便不利而渴身必發黃也茵陳五苓散

陳素中辨證曰陽明病下血譖語此為熱入血室但頭汗出者

小柴胡湯

方見表裏辨門。加牡丹皮。

傷寒五六日已發汗而復下之。

胸膈滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往来寒熱。心煩及。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞭。

脉細結邪在表裏間。俱與小柴胡湯。中溼誤下。頭汗出。小便。

利者死。下後額上汗出而喘。小便反秘者死。關格不通。不。

得溺。頭無汗者生。有汗者死。元氣下脫。額上汗如珠者死。

茵陳五苓散

金匱

治頭汗出。發黃。秋疫癟。及黃疸。

茵陳三錢。五苓散二錢。每服二錢。米湯調服。

手足腋下汗

陳素中辨證曰傷寒潮熱手足心濺濺汗出陽明胃實也腋下濺濺汗出兼少陽膽實也大便秘鞶者以大柴胡湯方見發下熱門

方見發
熱門

之大便不鞶者。且與小柴胡湯。方見表裏辨門和之。病人手心汗出。

大便燥而譖語者調胃承氣湯方見六經證治門下之士材亦用大承氣湯陽

方見六經下之士材亦用
證治門大承氣湯

○ 陽

明病。發熱目痛。鼻乾不眠。中寒不能食。小便不利。水穀不分。手足汗出者。

發熱目痛

此欲作痼。大便必初鞶後溏不可下。宜厚樸生薑甘草半夏。

大瘕瘓

人參湯。方見腹滿門。理中湯。方見六經證治門。加木香檳榔。士材亦云宜理中湯。

湯方見腹滿門

方見六
證治門

加木香檳榔

士材亦云
宜理中湯

謹按

醫宗金鑑。胃主四肢為津液之主。今熱聚於胃。蒸其津液。旁達於四肢。故手足濺濺然汗出也。小便利。胃中津液必乾。大便必鞭。本當攻也。若中寒。胃陽土虛。脾不約束。津液橫溢四肢。猶如陰盛。淫雨滂沱。故汗出而冷也。陽虛失運。中寒不化。故小便不利。雖便鞭而手足汗出。非熱越者。比慎不可攻。攻之必變生瘡。瘕泄瀉澄清不止也。痼瘕冷積也。

畜血