

脉法 傷寒例 正方

傷寒續論 下卷二



脉法篇

問曰。脉有陰陽者。何謂也。答曰。凡脉大浮數動滑。此皆陽也。脉沉濇弱弦微。此名陰也。凡陰病見陽脉者。重陰病見陰脉者死。

按弦爲少陽脉。此以弦爲陰脉者。兼見沉濇微弱而言。陰病見陽脉者。生。陽氣內復。陰邪外出。欲汗而解也。如厥陰中風。脉浮爲欲愈。不浮爲未愈是也。陽病見陰脉者死。外顯陽證。內伏陰邪。正衰邪勝也。如讞言妄語。脉沉細者死是也。○又按微爲厥陰脉。而傳經熱邪。亦尺寸俱微。豈熱邪至極。而脉反微耶。殊不知傷寒之邪。傳至厥陰。正氣雖已大傷。而邪氣亦以向衰。所以不數實而反微也。

問曰。脉有陽結陰結者。何以別之。答曰。其脉浮而數。能食不

大便者。此爲實。名曰陽結也。期十七日當劇。其脈沉而遲。不能食。身體重。大便反鞭。名曰陰結也。期十四日當劇。

浮數陽脈也。陽病不大。便當不能食。今反能食。是陽氣結而陰不得和也。至十七日傳少陰水。水不勝火。故當劇。沉遲陰脈也。陰病當下利。今反大便鞭。是陰氣結而陽不得和也。至十四日傳陽明土。土不勝水。故當劇。

問曰。病有灑淅惡寒。而復發熱者何。答曰。陰脈不足。陽往從之。陽脈不足。陰往乘之。曰何謂陽不足。答曰。假令寸口脈微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則灑淅惡寒也。曰何謂陰不足。答曰。假令尺脈弱。名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。灑淅惡寒。而復發熱。脈寸微尺弱者。陽虛陰往從之也。少頃發熱。則脈必數盛矣。此勝復之常。內傷虛損多此。

陽脉浮陰脉弱者。則血虛。血虛則筋急也。

言寸口浮大。而尺內遲弱也。與太陽中風。陽浮陰弱。同脉異證。彼言風邪傷衛。營弱衛強。此言營血本虛。故其證自區別。然尺中遲弱者。汗下俱禁。究竟本虛也。

其脉沉者。營氣微也。其脉浮而汗出如流珠者。衛氣衰也。脉靄靄如車蓋者。名曰陽結也。脉累累如循長竿者。名曰陰結也。脉瞥瞥如羹上肥者。陽氣微也。脉縈縈如蜘蛛絲者。陽氣衰也。脉綿綿如瀉漆之絕者。亡其血也。

陽結靄靄如車蓋。形容浮大而虛。陰結累累如循長竿。體貼指下弦而強直。陽微瞥瞥如羹上肥。彷彿虛濡無力。陽衰縈縈如蜘蛛絲。譬擬沉細欲絕。亡血綿綿如瀉漆之絕。描寫前大後細之狀。皆歷歷如繪。○此陽結陰結。是言脉

法與前論病證不同。不可牽合。

脉來緩。時一止。復來者。名曰結。脉來數。時一止。復來者。名曰促。脉陽盛則促。陰盛則結。此皆病脉。脉按之來緩。而時一止。復來者。名曰結。又脉來動而中止。更來小數。中有還者。反動。名曰結陰也。脉來動而中止。不能自還。因而復動。名曰代陰也。得此脉者。必難治。

結促是有留滯於中。故脉見止歇。力能自還。代脉是陽氣衰微。不能自還。雜病見之。必死。惟傷寒有心悸。脉代者。寒飲停蓄故也。

問曰。翕奄沉。名曰滑。何謂也。師曰。沉爲純陰。翕爲正陽。陰陽和合。故令脉滑。關尺自平。陽明脉微沉。食飲自可。少陰脉微滑。滑者。緊之浮名也。此爲陰實。其人必股內汗出。陰下濕也。

翕。浮也。奄。忽也。言忽焉而浮。忽焉而沉。故爲滑也。滑本陽實。陰部見陽脉。爲陽邪乘陰。故股內汗出。

陰陽相搏。名曰動。陽動則汗出。陰動則發熱。形冷惡寒者。此三焦傷也。若數脉見於關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖者。名曰動也。

按脉之動者。皆緣陰陽不和。故不能貫通三部。而虛者受邪則動。所以動於寸口爲陽動。陽動則汗出。動於尺內爲陰動。陰動則發熱。如不汗出發熱。而反形冷惡寒。此三焦真火受傷也。蓋動脉雖多見於關上。然尺寸亦常見之。本文又言若數脉見於關上。若字甚活。是舉一隅爲例耳。今世以尺寸之動。強飾爲滑。殊不知動脉是陰陽相搏。虛者則動。故單見一部滑脉。是邪實有餘。多兼見二三部。或兩

手俱滑。以此辨之。則動滑之虛實判然矣。

陽脉浮大而濡。陰脉浮大而濡。陰脉與陽脉同等者。名曰緩也。

脉雖浮大而軟。按之仍不絕者爲緩。若按之卽無是虛脉。非緩脉也。

脉浮而緊者。名曰弦也。弦者。狀如弓弦。按之不移也。脉緊者。如轉索無常也。

浮緊而弦者。少陽脉也。若沉緊而弦。卽是裏寒陰脉矣。脉浮而數。浮爲風。數爲虛。風爲熱。虛爲寒。風虛相搏。則灑淅惡寒也。

脉浮而數。爲虛風發熱之候。證雖發熱。而本屬虛寒。是以仍灑淅惡寒。故言數爲虛。虛爲寒。明所以當用溫順散邪。

不可竟行表散也。

脉浮而滑。浮爲陽。滑爲實。陽實相搏。其脉數疾。衛氣失度。浮滑之脉。數疾發熱。汗出不解者。此爲難治。

浮滑爲表實。當汗出而解。今汗出不解。皆緣衛氣熱極。較常度行之過疾。所以脉反數疾不解。况旣汗出傷陰。則營亦受病。是知邪已入府。表裏俱熱。故難治也。

脉浮而遲。面熱赤而戰惕者。六七日當汗出而解。反發熱者。差遲。遲爲無陽。不能作汗。其身必癢也。

脉浮而遲。爲營氣不能外行於衛分。衛中陽虛不能作汗。而差遲。致汗濕留於肌表。而身癢作瘡也。

師持脉。病人欠者。無病也。脉之呻者。病也。言遲者。風也。搖頭言者。裏痛也。行遲者。表強也。坐而伏者。短氣也。坐而下一脚。

者。腰痛也。裏實護腹如懷卵物者。心痛也。

師曰呼吸者。脉之頭也。初持脉來疾去遲。此出疾入遲。名曰內虛外實也。初持脉來遲去疾。此出遲入疾。名曰內實外虛也。

初持脉來疾去遲。言自尺內至於寸口。爲心肺盛而肝腎虛。此出疾入遲。言自筋骨出於皮膚。以脉盛於表。故曰內虛外實。初持脉來遲去疾。言自寸口下於尺內。爲心肺虛而肝腎旺。此出遲入疾。言自皮膚入於筋骨。以脉盛於內。故曰內實外虛。

假令脉來微去大。病在裏也。脉來頭小本大。病在表也。上微頭小者。則汗出。下微本大者。則爲關格不通。不得尿。頭無汗者可治。有汗者死。

脉來微去大者。言浮取則微。沉取則大。爲病在裏也。脉來頭小本大者。言脉初來小。取之漸漸大。爲病在表也。上微頭小者。言浮取之微。而前小後大。爲表氣不固而自汗也。下微本大者。言沉取之微。而按久益大。爲裏邪拒悶而關格不通。頭無汗者。乃邪入膀胱。陽氣未脫。猶可治也。益傷寒暴病。非雜證。津液久虛之比。

假令下利。寸口關上尺中悉不見脉。然尺中時一小見。脉再舉頭者。腎氣也。若見損脉來至。爲難治。

三部俱伏。而尺中時見小滑一二至。此爲陰中伏陽也。若寸口畧見短小一二至。尺中絕不至者。爲損脉。見之必難治也。

問曰。曾爲人所難。緊脉從何而來。師曰。假令亡汗若吐。以肺

傷寒緒論 卷一
裏寒故令脉緊也。假令欬者坐飲冷水故令脉緊也。假令下利以胃中虛冷故令脉緊也。

緊脉皆爲寒。寒邪在表則浮緊。在裏則沉緊。此言吐下後脉緊爲肺胃受傷。若更兼欬及利。又爲水飲內伏之候。當以辛溫散水爲務也。

寸口脉浮爲在表。沉爲在裏。數爲在府。遲爲在藏。假令脉遲。此爲在藏也。

此以浮沉遲數定表裏藏府。而全重於遲爲在藏句。故重申以明之。設脉見浮遲。雖有表證。只宜小建中和之。終非麻黃青龍所宜。以藏氣本虛故也。○凡言寸口。統三部而言。鍼經以寸口人迎分別藏府也。

問曰。何以知乘府。何以知乘藏。師曰。諸陽浮數爲乘府。諸陰

遲瀯爲乘藏也。

寸口脉弱而遲。弱者衛氣微。遲者營中寒。營爲血。血寒則發熱。衛爲氣。氣微者心內饑。饑而虛滿不能食也。

寸口脉弱爲真陽氣微。則腎中陰火挾痰飲而聚於膈上。故心懸懸若饑狀。而虛滿不能食也。至於寸口遲爲營中寒。營爲血之本。血寒而反發熱。其義何居。蓋寸口脉遲。其陽必陷於陰分。尺中緊盛更不待言。所以爲發熱也。

寸口脉弱而緩。弱者陽氣不足。緩者胃氣有餘。噫而吞酸。食卒不下。氣填於膈上也。

噫而吞酸。是胃中虛火挾痰飲上逆。非墜痰降逆之藥。不足以鎮之。此言暴病。與老人之胃虛痰逆噫氣不同。

寸口脉微而瀯。微者衛氣不行。瀯者營氣不足。營衛不能相

將三焦無所仰。身體痺不仁。營氣不足。則煩疼口難言。衛氣虛則惡寒數欠。三焦不歸其部。上焦不歸者噫而酢吞。中焦不歸者不能消穀引食。下焦不歸者則遺溺。酢醋同三焦因營衛不行。無所依仰。故氣不歸其部。上焦不歸。則物不能傳化。故噫而酢吞。中焦不歸。則不能腐熟水穀。下焦不歸。則不能約制溲便也。

寸口脉微而瀦。微者衛氣衰。瀦者營氣不足。衛氣衰。面色黃。營氣不足。面色青。營爲根。衛爲葉。營衛俱微。則根葉枯槁。而寒慄欬逆。噦腥吐涎沫也。

欬逆而噦腥吐涎沫。陰虛火炎可知也。加以寒慄。則衛虛不能外護。又可知矣。以脉見寸口。故其證悉在上部耳。少陰脉弱而瀦。弱者微煩。瀦者厥逆。

氣虛則脉弱而煩。血虛則脉濇而厥。

趺陽脉浮而濇。少陰脉如經也。其病在脾。法當下利。何以知之。若脉浮大者。氣實血虛也。今趺陽脉浮而濇。故知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脉弦而浮。纔見此爲調脉。故稱如經也。若反滑而數者。故知當尿膿也。

趺陽脉浮濇。爲脾胃不足。故當下利。此易明也。至少陰脉弦而浮。稱爲調和如經之脉。此必有說焉。蓋傷寒熱傳少陰。仍得弦浮。陽脉爲輕。若見沉遲。則爲少陰病脉矣。夫所謂弦者。少陽生發之氣也。浮者。太陽表證之脉也。雖證見少陰。而少陰病脉不見。不失經常之度。故爲調脉。若見滑數。則爲邪熱內盛。必挾熱便膿血也。○凡言趺陽。皆當推之氣口。少陰皆當驗於尺部。若必候諸於足。在婦人殊爲

未便握手不及足之譏所不辭也。

趺陽脉遲而緩。胃氣如經也。趺陽脉浮而數。浮則傷胃。數則動脾。此非本病。醫誤下之所爲也。營衛內陷。其數先微。脉反但浮。其人必大便秘。氣噫而除。何以言之。本以數脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。大便秘。氣噫而除。今脉反浮。其數改微。邪氣獨留。心中則饑。邪熱不殺穀。潮熱發渴。數脉當遲緩。脉因前後度數如法。病者則飢。數脉不時而生惡瘡也。

趺陽胃脉以遲緩爲經常。不當浮數。若見浮數。知醫誤下而傷胃動脾也。營衛環轉之氣。以誤下而內陷。其數脉必先改爲微。而脾氣不治。大便秘。氣噫而除。此皆邪客於脾所致。邪熱獨留。心下雖飢。復不殺穀。抑言潮熱發渴。未有愈期。必數脉之先微者。仍遲緩如其經常。始飢而消穀也。

若數脉從前不改。則邪熱未陷於脾。但鬱於營衛。主生惡瘡而已。

諸脉浮數。當發熱而灑淅惡寒。若有痛處。飲食如常者。畜積有膿也。

脉浮數而惡寒。知表邪不散而爲熱。今飲食如常。爲裏邪已去。若有焮腫。爲熱壅經絡。若無腫處。必邪留藏府。隨內外而發癰膿也。

脉浮而大。浮爲風虛。大爲氣強。風氣相搏。必成癰瘡。身體爲癢。癢者名泄風。久久爲痂癬。

脉浮大。爲邪氣在表。表邪本當卽解。今相持不散。必是汗出泄風之故。當發癰瘡。身癢而生瘡疥也。

趺陽脉浮而芤。浮者衛氣衰。芤者營氣傷。其身體瘦。肌肉甲

錯。浮芤相搏。宗氣衰微。四屬斷絕。

身體瘦削。宗氣衰微。胃氣虛寒。不能榮養四末。可知。加以肌肉結韌。皮膚皴皸。故爲甲錯。必內有畜積。將發癰膿之兆也。

跌陽脉滑而緊。滑者胃氣實。緊者脾氣強。持實擊強。痛還自傷。以手把刃。坐作瘡也。

此言胃受有形而實。脾爲熱盛而強。藏府相併爲患而痛。故言以實擊強。治當量其虛實。虛則消導。實則攻下可也。跌陽脉大而緊者。當卽下利。爲難治。

跌陽脉緊。爲寒邪傷胃。故必下利。下利脉大爲邪盛。故難治也。

跌陽脉沉而數。沉爲實。數消穀。緊者病難治。